

104年第二次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段考試、
營養師、心理師、護理師、社會工作師考試、104年專門職業及技術
人員高等考試法醫師、語言治療師、聽力師、牙體技術師考試試題

代號：3102
頁次：8-1

等 別：高等考試

類 科：中醫師(二)

科 目：中醫臨床醫學(三) (包括中醫外科學、中醫傷科學、中醫五官科學)

考試時間：1 小時 30 分

座號：_____


※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共80題，每題1.25分，須用2B鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 1 《全生集》是清代中醫外科專書，其作者為何？
(A)高錦庭 (B)陳士鐸 (C)顧世澄 (D)王洪緒
- 2 有關腫瘍治療的敘述，下列何者錯誤？
(A)腫瘍如流注、附骨疽等，初宜溫經治療
(B)潰瘍日久，可用溫補法治療
(C)年高病人，患如腦疽、背疽而局部雖紅腫發熱，也可用溫托法治療
(D)腫瘍皮膚搔癢，日久不癒，體質屬陰虛，絕不可以溫補法治療
- 3 有關喉癰之敘述，下列何者錯誤？
(A)皆由天時寒暖失常，感受寒邪而成 (B)生於咽喉蒂丁兩旁
(C)膿熟剖刺之，並吹以冰硼散 (D)患處用刀宜慎，易招流血
- 4 下列何者不是疔之主因？
(A)四時不正之邪感染 (B)恣食油炸辛辣厚味之品
(C)誤食瘟病禽畜 (D)花柳、遺毒
- 5 大小腸癰若腹濡而痛，少腹急脹，時時下膿而毒未解也，最宜服下列何方？
(A)大黃湯 (B)薏苡附子湯 (C)八珍湯 (D)丹皮湯
- 6 臍癰生於臍中，病因為下列何者？
(A)脾火積毒 (B)肝膽怒火激結而成
(C)心經火毒，流入大小腸所致 (D)三陰虧損
- 7 關於疽之敘述，下列何者正確？
(A)因氣血為毒所阻，稽留不行，生熟肉腐而成
(B)其起如粟，堅硬有腳若釘
(C)屬鬱火為病者，其起無頭，附骨而生，病程長久
(D)生發於肌膚之間，所患浮淺，高腫而痛
- 8 有關中搭手的敘述，下列何者正確？
(A)亦名對臍發 (B)屬膀胱經 (C)位於盲門穴 (D)皆由氣血衰弱而發
- 9 有關面遊風的敘述，下列何者正確？
(A)因平素血燥，過食辛辣厚味，陽明胃經濕熱受風所致
(B)類似現代醫學的黃褐斑
(C)癢甚者宜用黃連消毒飲
(D)外以海艾湯洗之
- 10 一名國中生，幼時就有氣喘病史，近年反覆在兩腿彎及兩腳彎對稱出現形如風癬之病灶，其癢無度，搔破津水，又似濕癬，其最可能的診斷為何？
(A)白屑風 (B)四彎風 (C)白疔 (D)燕窩瘡
- 11 承上題，此病症類似現代醫學的何種疾病？
(A)異位性皮膚炎 (atopic dermatitis) (B)脂漏性皮膚炎 (seborrheic dermatitis)
(C)乾癬 (psoriasis) (D)蜂窩性組織炎 (cellulitis)

- 12 某高中生平日喜歡打籃球，容易出汗，在暑假期間發現頸部、胸部出現白色斑點，上覆有細細的脫屑，延蔓成片，不痛不癢。其最可能的診斷為下列何者？
(A)白屑風 (B)鈕扣風 (C)赤白遊風 (D)紫白癬風
- 13 有關白疔之敘述，下列何者正確？
(A)形如疹疥，色赤而癢，搔起白皮，日漸蔓延 (B)俗名風疔
(C)又名猴疔 (D)僅生於臀腿之間
- 14 有關奶癬之敘述，下列何者正確？
(A)俗稱肥瘡，生嬰兒頭項，或生眉端 (B)又名癩頭瘡，生嬰兒頭面或眉際
(C)皮膚易搔癢流水，久則亦能遍及全身 (D)治療以除濕殺蟲養血止癢為主
- 15 生於小兒臀腿之間，起因於久坐陰濕之地，以致皮膚發紅，作癢熾痛，下列診斷何者較適宜？
(A)胎風 (B)猴疔 (C)血風瘡 (D)葡萄疫
- 16 有關疔瘡的病因，下列何者錯誤？
(A)肺經積熱，受風邪凝結而成
(B)梅毒
(C)房術熱藥，塗抹玉莖
(D)淫火猖狂，未經發泄，以致敗精濁血，留滯中途結而為腫
- 17 臍腹隱痛，小便艱難，痛不可忍，小便色黃赤，如湯甌久受煎熬，底結白鹼，下列診斷何者比較正確？
(A)石淋 (B)血淋 (C)勞淋 (D)膏淋
- 18 中醫外科學對於瘡的分類和治療，下列何者錯誤？
(A)瘰癧由濕熱為病，治以利濕清瀉為主
(B)蜘蛛瘡屬瘡毒，治法以殺蟲為主
(C)黃水瘡由風毒為病，治宜祛風清熱
(D)風疹若屬內之因，感染毒氣而發，治宜解毒宣導為主
- 19 下列皆易發生於流痰，但何者除外？
(A)夜哭 (B)雞胸 (C)龜背 (D)甲疽
- 20 痰核，生於項間，初起結核，小者如梅，大者如李，推之移動，皮色如常，不痛。初起屬氣實者，宜服清肝解鬱湯加下列何藥物？
(A)防風 (B)人參 (C)瓜蒌 (D)黃耆
- 21 如圖，顯示疼痛之手腕動作，需列入考量之疾病可能是俗稱媽媽手，有關構造或敘述何者錯誤？



- (A)又稱 de Quervain 腱鞘炎 (B)外展拇長肌受侵犯
(C)伸拇短肌受侵犯 (D)尺側屈腕肌受侵犯

22 有關膝半月板的敘述，下列何者正確？

- (A)是位於股骨髁與脛骨平台之間的纖維軟骨
(B)外側半月板比內側半月板大
(C)周邊較薄，中央較厚
(D)內、外側半月板分別與內、外側副韌帶相連

23 如圖所示，造成此種傷害是下列何組織？



- (A)三角韌帶（deltoid ligament）
(B)前距腓韌帶（anterior talofibular ligament）
(C)後距腓韌帶（posterior talofibular ligament）
(D)腓骨短肌（peroneus brevis）

24 有關肩胛棘附近相關解剖之敘述，下列何者正確？

- (A)肩胛上肌與肩胛下肌為其分別附著之肌群
(B)棘上肌與棘下肌同為肩胛下神經支配
(C)棘上肌與棘下肌同為腋神經支配
(D)棘上肌與棘下肌同終於肱骨大結節附近

25 急性腰部韌帶損傷中，臨床上常見的韌帶損傷為何種韌帶，下列何者正確？①前縱韌帶 ②後縱韌帶 ③棘上韌帶 ④棘間韌帶 ⑤黃韌帶 ⑥髂腰韌帶

- (A)③④⑥ (B)①②⑤ (C)③④⑤ (D)②④⑥

26 有關腓腸肌損傷的敘述，下列何者錯誤？

- (A)腓腸肌起於股骨兩髁的後面，止於跟骨後結節處
(B)腓腸肌強力收縮可造成跟腱斷裂
(C)急性損傷一般有廣泛性皮下出血，可觸及到斷裂部失去聯繫的間隙
(D)腓腸肌由腓總神經支配

27 某 35 歲家庭主婦自訴經常出現腰痛，症狀時好時壞。半個月前腰部疼痛加重，並出現右下肢放射疼痛，大便、咳嗽時加劇，休息時減輕，坐姿比站立疼痛，經檢查直腿抬高試驗陽性。最可能的診斷為下列何者？

- (A)腰椎間盤突出症 (B)增生性脊柱炎 (C)骨質疏鬆 (D)腰部扭挫傷

28 有關膝關節側副韌帶損傷，下列敘述何者錯誤？

- (A)膝伸直時，膝或腿部外側受到暴力打擊或重物壓迫，迫使膝關節過度外翻（valgus），可以發生外側副韌帶損傷或斷裂
(B)單純的側副韌帶損傷較少見，多與膝關節囊、十字韌帶或半月板同時損傷
(C)可做側向試驗檢查
(D)患膝部位作 X 光檢查可發現韌帶損傷處關節間隙增寬

29 45 歲男性患者，右胸遭駕駛盤撞擊，局部瘀腫疼痛，說話、深呼吸、咳嗽都使疼痛加劇，胸部 X 光片出現右側第 4、5、6 肋骨明顯骨折線，下列觀察何者是釐清是否出現連枷胸（Flail chest）現象的要項？①用力吸氣時患區胸壁下陷 ②用力呼氣時患區胸壁膨出 ③用力吸氣時患區胸壁膨出 ④用力呼氣時患區胸壁下陷


- (A)①④ (B)①② (C)②③ (D)③④

30 將頭部轉向右側（患側），深呼吸並憋住氣，右脈搏減弱，下列敘述何者錯誤？


- (A)此為 Morley 測試 (B)可能伴隨臂神經叢壓迫症狀
(C)胸廓出口症候群可列入考量 (D)第一肋骨異常變大也可能造成

- 31 關於膝關節損傷，下列敘述何者錯誤？
(A)當暴力撞擊小腿上端的前方時，使脛骨向後移位，造成後十字韌帶損傷，可伴有膝後關節囊破裂、脛骨隆突撕脫骨折、外側半月板損傷
(B)前十字韌帶起於股骨髁間窩的內後部，向前外止於脛骨髁間隆突的前部，能限制脛骨向前移位
(C)當後十字韌帶斷裂或鬆弛時，患膝向後移動度明顯增大
(D)抽屜試驗在作檢查時請患者仰臥，屈膝 90°，足平放床上，檢查時施術者以一肘壓住患足背作固定，兩手環握小腿上段作向前拉及後推的動作
- 32 下列何者不是參與髖關節伸展運動之主要肌肉？
(A)半膜肌 (B)半腱肌 (C)股二頭肌 (D)闊筋膜張肌
- 33 有關膝關節囊腫的敘述，下列何者錯誤？
(A)屬腓鞘囊腫，內容物為膠狀黏液 (B)質地較軟，壓痛不明顯
(C)反覆按摩後其囊壁可變薄而軟 (D)囊腫位置很深
- 34 踝扭傷時，下列何韌帶最不易撕裂？
(A)三角韌帶 (deltoid ligament) (B)跟腓韌帶 (calcaneofibular ligament)
(C)前距腓韌帶 (anterior talofibular ligament) (D)後距腓韌帶 (posterior talofibular ligament)
- 35 承筋穴在下列那一塊肌肉的肌腹上？
(A)蹠肌 (plantaris) (B)股內側肌 (vastus medialis)
(C)脛前肌 (tibialis anterior) (D)腓腸肌 (gastrocnemius)
- 36 某 34 歲男性電腦工程師因長時間使用電腦導致右肩臂痠痛，理學檢查發現如圖一所示的動作困難，則該患者最可能損傷的肌肉為圖二中之何者？

圖一



圖二



- (A)①② (B)③④ (C)①③ (D)②④
- 37 下列何方劑便溏者應慎用？
(A)健步虎潛丸 (B)當歸拈痛湯 (C)獨活寄生湯 (D)正骨紫金丹
- 38 有關髕下脂肪墊損傷，下列敘述何者錯誤？
(A)多因膝關節反覆性損傷引起 (B)坐姿或膝關節曲屈會使疼痛症狀加重
(C)日久會有脂肪墊增厚、腫脹的現象 (D)女性多於男性
- 39 關於骨性關節炎 (osteoarthritis) 的敘述，下列何者錯誤？
(A)屬於退化性疾病，以女性較多
(B)遠端指間關節可出現包氏結節 (Bouchard's nodes)
(C)創傷、姿勢不良或肥胖可加重症狀
(D)特色為關節邊緣骨質增生及關節腔狹窄

- 40 有關梨狀肌症候群之診斷治療，下列何者錯誤？
(A)可能出現臀部酸脹、疼痛，及大腿後側與小腿外側放射性疼痛
(B)直腿抬高試驗抬高超過 70° 疼痛會加劇
(C)梨狀肌損傷腫脹可能波及坐骨神經
(D)可按壓梨狀肌肌部，並順肌纖維方向反覆撥動和按摩以放鬆肌肉
- 41 傷科內治法，其初期治法可分為攻下逐瘀法、行氣活血法、清熱涼血法、通竅開閉法，下列治法與方劑之配對，何者正確？
(A)攻下逐瘀法主要在攻逐瘀血，可用復元活血湯
(B)行氣活血法重在通行氣血，可選用養營湯
(C)清熱涼血法多用於感染發熱，可用桃仁承氣湯
(D)若昏迷不省人事則需用通竅開閉法，用犀角地黃湯
- 42 七厘散以何藥為君？
(A)牛黃 (B)琥珀 (C)麝香 (D)羚羊角
- 43 局部急救止血的原則下列何者錯誤？
(A)立即壓迫出血的血管或堵塞出血的傷口 (B)根據不同情況和解剖位置選擇止血的方法
(C)用手指壓迫傷口近側靜脈幹 (D)對四肢大量出血最有效的止血方法是採用止血帶
- 44 依《醫宗金鑑·正骨心法》記載，傷損之證，煩躁而面赤，口乾作渴，脈洪大按之如無者，宜用下列何方？
(A)十全大補湯 (B)當歸補血湯 (C)小柴胡湯 (D)加味逍遙散
- 45 「正骨科」首見於下列何朝代？
(A)漢代 (B)唐代 (C)元代 (D)明代
- 46 根據《醫宗金鑑·正骨心法》，周先生打完高爾夫球後覺脅肋脹痛，大便通利，喘咳吐痰。下列敘述何者正確？①肝經血滯證 ②肝火侮肺證 ③瘀血停滯證 ④四物湯加柴胡、山梔、桃仁、紅花治之 ⑤小柴胡湯加青皮、山梔治之 ⑥當歸導滯散治之
(A)①④ (B)②⑤ (C)③④ (D)③⑥
- 47 《醫宗金鑑·正骨心法》記載：「王好古云，登高墜下撞打等傷，心腹胸中停積瘀血不散者，則以上中下三焦分別部位，以施藥餌。」其瘀在上部者，宜治以下列何方？
(A)犀角地黃湯 (B)桃仁承氣湯 (C)抵當湯 (D)復元活血湯
- 48 16 歲男性患者，於體育課打籃球後覺胸脇脹痛，呼吸、咳嗽時均可牽制作痛。檢查發現胸部無腫脹，自覺疼痛範圍廣，且無明顯壓痛點。則下列病因何者最可能？
(A)血瘀 (B)氣虛 (C)血虛 (D)氣滯
- 49 20 歲男性準備入伍當兵，他長期抱怨腰背痛及臀部放射性疼痛，前屈活動較差，打球後較不舒服。來院看診 X 光檢查發現雙薦髂關節略呈絨毛霧狀改變，下列診斷何者最可能？
(A)椎間盤突出症 (B)退化性關節炎 (C)僵直性脊椎炎 (D)梨狀肌綜合症
- 50 依《醫宗金鑑·正骨心法》，張先生打籃球造成損傷而有胸腹悶痛之證，對於處方用藥下列敘述何者正確？
(A)胸腹悶痛喜手摸，用四物湯加柴胡、山梔
(B)胸腹悶痛畏手摸，用四君子湯加柴胡、山梔、桃仁、紅花
(C)胸脅悶痛，飲食少思，用四物湯加芎、歸、柴、梔、丹皮
(D)胸脅悶痛，發熱晡熱，用加味逍遙散

- 51 外傷性髕骨脫位，好發於下列何者？
(A)兒童 (B)青少年 (C)老人 (D)婦女
- 52 下列何者為肩關節脫位整復成功後，可於固定初期鼓勵患者進行的功能鍛鍊？
(A)抓空增力 (B)雙手托天 (C)小雲手 (D)手指爬牆
- 53 關於關節脫位之手法復位禁忌證，下列敘述有幾項正確？①60 歲以上、體衰、有心血管疾患如高血壓、心臟病等患者 ②關節脫位時間超過 3~6 個月，X 光顯示骨質疏鬆，已顯著脫鈣者 ③臨床檢查時，脫位的關節活動度極小且異常僵硬者 ④有嚴重的併發症，如骨折、神經損傷、血管損傷或感染者
(A) 4 (B) 3 (C) 2 (D) 1
- 54 關於足舟狀骨骨折之敘述，下列何者正確？
(A)舟骨結節部撕脫性骨折，常易致骨折塊發生缺血性壞死
(B)舟骨結節骨折復位後，將患足固定於外旋外翻背伸位
(C)前足遭受強烈蹠屈暴力，舟骨受到距骨頭和楔骨的擠夾，可使舟骨產生水平位和橫斷骨折
(D)舟骨結節骨折為脛後肌腱強力收縮牽拉而成撕脫骨折
- 55 正骨手法中，橫斷或鋸齒型骨折，用其他手法復位後，如斷端間可能仍有裂隙，為使骨折面緊密接觸，復位後位置相對更穩定，使骨折部緊密嵌插，可使用下列何種骨折復位手法？
(A)搖擺觸碰 (B)折頂回旋 (C)夾擠分骨 (D)按摩推拿
- 56 關於髕骨骨折之敘述，下列何者正確？
(A)邊緣骨折需與副髕骨鑒別，副髕骨多在髕骨的內下角，邊緣圓滑，且多為兩側對稱性
(B)骨折遠段伸展性不大，而骨折近端則附著有股四頭肌腱，伸展性較大，需利用近段斷端對遠段斷端，才能獲得復位
(C)因間接暴力所致的骨折，多為粉碎型或星狀骨折，間有縱裂成邊緣骨折
(D)骨折經整復後，置患膝屈曲 90 度於托板上
- 57 一位 65 歲婦人，主訴於 2 天前走路跌倒，右腕疼痛腫脹就診，如 X 光片顯示，下列敘述何者錯誤？



- (A)復位後夾板固定，掌側夾板和尺側夾板的下端應超過腕關節，而背側夾板和橈側夾板則不超過腕關節
(B)此為伸直型橈骨下端骨折
(C)正常人橈腕關節面向掌側傾斜約 10~15 度，向尺側傾斜約 20~25 度
(D)外觀為「餐叉樣」(silver fork)畸形
- 58 關於上肢脫位損傷，下列敘述何者正確？
(A)肘關節後脫位時，因鷹嘴突向上移位，致屈肘時，由肘後方觀察肱骨內上髁、外上髁及鷹嘴突呈現正三角形關係
(B)脫位常見的一般症狀為疼痛、壓痛、腫脹、功能障礙，而肢體縮短、關節盂空虛與彈性固定為其特有體徵
(C)臨床最常見肩脫位的型態為後脫位
(D)肩關節脫位，常出現「方肩」畸形外觀，肘關節屈曲，即便手臂貼及胸壁，手指不可觸摸到對側肩部

- 59 下列關節損傷何者在臨床上較容易併發骨化性肌炎？
(A)肩關節 (B)肘關節 (C)腕關節 (D)掌指關節
- 60 關於腕舟狀骨骨折的診斷，下列何者錯誤？
(A)傷後腕背側腫脹、疼痛，尤以陽谿穴部位為明顯，腕關節活動功能障礙
(B)第一次 X 光照片未發現骨折，而臨床表現仍有可疑時，可於 2~3 週後重複照片，此時因骨折端的骨質被吸收，而骨折線較容易顯露
(C)常被誤認為腕關節扭挫傷，容易誤診
(D)可見「餐叉樣」畸形
- 61 依據中醫眼科五輪學說，水輪疾病常責之於下列何臟腑？
(A)脾與胃 (B)腎與膀胱 (C)心與小腸 (D)肝與膽
- 62 中醫名稱「金井」相當於那個現代醫學名稱？
(A)臉裂 (B)鼻淚孔 (C)淚埠 (D)瞳孔
- 63 如圖，患者常臉澀難開，眼胞赤爛，則下列敘述何者錯誤？



- (A)乃因倒睫拳毛，內刺睛 (B)因皮緊弦鬆，眼癢而兼疼
(C)宜用細辛湯，內清邪熱，外散風邪 (D)此乃脾熱肝風，合邪上壅所致
- 64 關於流淚症，下列敘述何者錯誤？
(A)熱淚常指目無明顯赤痛翳障，而經常流淚者
(B)肝血不足，迎風流淚，治以四物湯加味
(C)氣血不足，收攝失司，當益氣養血，治以八珍湯加減
(D)肝腎兩虛，約束無權，以左歸飲養肝益腎
- 65 患者驟然發病，白睛紅赤腫痛，胞臉紅腫，眵多膠結，熱淚如湯，怕熱畏光，伴有口渴溺黃，苔黃脈數。其最有可能之診斷為何？
(A)流淚症 (B)暴風客熱 (C)風赤瘡癢 (D)漏睛瘡
- 66 近日眼科門診，出現大量眼睛紅腫疼痛的患者，患者通常全家均發病，眼臉腫脹，白睛紅，眼分泌物增加，且黑睛也有病症，下列相關敘述何者錯誤？
(A)感受疫厲之氣，上擾於目，肺火熾盛，氣血蒸騰，易相互感染造成流行
(B)本症除白睛外，容易黑睛星翳，故不可因為白睛赤疼病消而放鬆治療
(C)此乃心經之病，憂思勞怒，擾動心神，心火盛而刑金，上壅於目而致
(D)黑睛可為點狀星翳，視物不清，畏光流淚
- 67 關於椒瘡，下列敘述何者錯誤？
(A)通常無異常感覺，或微覺癢澀，病情嚴重時可導致黑睛星翳，視力減損
(B)嚴重者臉內癢痕，外急內弛，臉胞因疤痕導致無法閉合
(C)可能產生脾肉黏輪的後遺症，阻礙眼珠轉動
(D)重症可因邪毒久鬱，陰液耗損，目失濡養

- 68 王先生患聚星障，黑睛星翳反覆發作，纏綿不癒，頭重胸悶，溲黃便溏，口黏，舌紅苔黃膩，脈濡。治療服藥至何時可轉用退翳明目之劑？
- (A)溲清便實 (B)頭輕胸暢 (C)脈滑口爽 (D)舌苔退淨
- 69 47 歲女性患者自覺視物昏朦，眼前黑影游動如蚊蠅飛舞，伴隨頭重胸悶，心煩口苦，舌淡紅苔膩，脈濡而數。以下列何方劑治療較正確？
- (A)六君子湯 (B)杞菊地黃丸 (C)三仁湯 (D)丹梔逍遙散
- 70 下列那一本古籍最早記載燒灼治療咽喉疾病的方法？
- (A)《傷寒論》 (B)《金匱要略》 (C)《肘後備急方》 (D)《千金翼方》
- 71 理學檢查發現病人耳膜有裂縫狀或銳角狀不規則的穿孔，下列何者最可能為致病原因？
- (A)急性化膿性中耳炎 (B)慢性化膿性中耳炎 (C)慢性積液性中耳炎 (D)外傷
- 72 有關斷耳瘡症之敘述，下列何者錯誤？
- (A)由肝膽經火毒熱邪內熾，循經上犯而成 (B)風濕搏於血氣所生
(C)因濕盛則肉腐 (D)治宜清熱解毒去腐消腫
- 73 歷代文獻中關於耳膜穿孔、耳內流膿之病，下列敘述何者正確？
- (A)黃膿為纏耳 (B)紅膿為風耳 (C)青膿為聾耳 (D)白膿為震耳
- 74 鼻疳之病，若因脾胃失調，濕熱鬱蒸，內治宜草薢滲濕湯，若濕熱壅盛者，需加下列何藥以助之？
- (A)茯苓、薏苡仁 (B)荊芥、防風 (C)薏苡仁、檳榔 (D)黃連、苦參、土茯苓
- 75 鼻病滯留，症見鼻失濡養，津液乾涸，邪毒困結，鼻內肌膜乾枯萎縮，結痂。下列診斷何者較適宜？
- (A)肺陰虛 (B)肺氣虛 (C)肺陰實 (D)肺氣實
- 76 下列何者與過敏性鼻炎相似，並以突然和反覆發作的鼻癢、噴嚏、流清涕、鼻塞等為特徵？
- (A)傷風鼻塞 (B)鼻疳 (C)鼻鼈 (D)鼻塞
- 77 五臟六腑病變可反應於咽喉，依《血證論》卷六之記載，凡咽痛而飲食不利者屬下列何臟腑病證？
- (A)肺火 (B)胃火 (C)肝火 (D)腎火
- 78 咽喉病初起，咽喉紅、腫、疼痛，發熱惡寒，多屬下列何證？
- (A)熱毒壅盛 (B)風熱邪毒 (C)虛火上炎 (D)痰涎濕濁凝聚
- 79 牙齦癰如不急治可能轉變為下列何種症狀？
- (A)合架風 (B)角架風 (C)牙棋風 (D)骨槽風
- 80 口齒唇舌病的膿血辨證中，若患者出現膿稀無味或流膿日久滲滲而出，下列辨證何者最適當？
- (A)脾胃火熱蒸灼 (B)痰涎濕濁凝聚 (C)脾胃實熱 (D)脾腎虛損，氣血不足