

108年第一次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段
考試、營養師、心理師、護理師、社會工作師考試試題

代號：1102
頁次：6-1

等 別：高等考試
類 科：中醫師(二)
科 目：中醫臨床醫學(一)(包括傷寒論(學)、溫病學、金匱要略、中醫證治學、
中醫診斷學)

考試時間：1小時30分

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共80題，每題1.25分，須用2B鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 1 古醫書中有關傷寒的敘述，下列何者錯誤？
(A)《素問》提及：今夫熱病者，皆傷寒之類也
(B)《難經》提及：傷寒有五，有中風，有傷寒，有寒濕，有熱病，有溫病
(C)《傷寒論》提及：太陽病，或已發熱，或未發熱，必惡寒，體痛，嘔逆，脈陰陽俱緊者，名為傷寒
(D)《傷寒論》提及：傷寒一日，太陽受之，脈若靜者，為不傳
- 2 依《傷寒論》，有關「水結胸」的證治，下列選項何者正確？①表有大熱 ②裏有大熱 ③有結胸狀，但頭大汗出 ④主治以大陷胸湯瀉熱逐水破結
(A)僅③ (B)僅④ (C)僅③④ (D)①②③④
- 3 依《醫宗金鑑·訂正仲景全書傷寒論註》，大病差後，從腰以下有水氣者，下列何方治療最適當？
(A)五苓散 (B)越婢加朮湯 (C)腎氣丸 (D)牡蠣澤瀉散
- 4 依《醫宗金鑑·訂正仲景全書傷寒論註》，症見霍亂吐痢止，而身痛不休者，下列何方治療最適當？
(A)桂枝湯 (B)小柴胡湯 (C)理中丸 (D)吳茱萸湯
- 5 35歲張先生，因太陽表證由於發汗太過，出現漏汗不止、惡風、小便難、四肢微急，難以屈伸之現象。此治以下列何方最適當？
(A)桂枝人參湯 (B)桂枝加人參湯 (C)桂枝加附子湯 (D)桂枝附子湯
- 6 依《傷寒論》，下列敘述何者錯誤？
(A)太陽病，脈浮緊，發熱，身無汗，自衄者愈
(B)脈浮而數者，可發汗，宜麻黃湯
(C)太陽與陽明合病，喘而胸滿者，不可下，宜麻黃湯
(D)傷寒脈浮緩，不發汗，因致衄者，麻黃湯主之
- 7 依《傷寒論》，「傷寒發汗已解，半日許復煩，脈浮數者，可更發汗，宜桂枝湯」，其病因病機，下列何者最適當？
(A)舊邪去，新邪復乘 (B)表寒化熱，故心煩脈浮數
(C)汗後之虛煩 (D)餘邪在表未盡
- 8 依《傷寒論》，寒實結胸，治以下列何者最適當？
(A)貝母、巴豆、桔梗 (B)黃連、半夏、瓜蒌實
(C)大黃、芒硝、甘遂 (D)大黃、葶藶子、芒硝
- 9 依《傷寒論》，「大下後，六、七日不大便，煩不解，腹滿痛者，此有燥屎也……宜大承氣湯」，依仲景原意，其燥屎的成因為下列何者？
(A)瘀熱在裏 (B)必有蓄血 (C)其脾為約 (D)本有宿食
- 10 依《傷寒論》，「陽明證，其人喜忘者」，其原因為下列何者？
(A)熱入血室 (B)津液內竭 (C)表虛裡實 (D)必有蓄血
- 11 吳工程師於初夏時發病四五日，身熱大汗，口大渴，脈大，不頭痛，不譫語，若依《傷寒論》辨證，以下列何方劑治療最為適當？
(A)梔子豉湯 (B)白虎湯 (C)豬苓湯 (D)五苓散
- 12 依《傷寒論》，有關柴胡桂枝乾薑湯之敘述，下列選項何者最適當？①肝鬱氣滯，少陽樞機不利 ②柴胡桂枝乾薑湯組成：柴胡、桂枝、乾薑、枳實、芍藥、黃芩、牡蠣、炙甘草 ③胸脇滿微結之病機為三焦決瀆功能失常，水飲留結 ④陽鬱不得宣達全身，水道不暢
(A)①② (B)②③ (C)③④ (D)①③

- 13 依《傷寒論》，少陰病，六七日，腹脹，不大便者，治以下列何方最適當？
(A)調胃承氣湯 (B)大承氣湯 (C)桃核承氣湯 (D)小承氣湯
- 14 依《傷寒論》，有關大柴胡湯，下列敘述何者錯誤？
(A)傷寒十餘日，熱結在裏，復往來寒熱者，與大柴胡湯
(B)傷寒發熱，汗出不解，心中痞硬，嘔吐而下利者，大柴胡湯主之
(C)太陽病，過經十餘日，反二、三下之，後四、五日，柴胡證仍在者，先與小柴胡湯。嘔不止，心下急，鬱鬱微煩者，為未解也，與大柴胡湯下之則愈
(D)陽明病，發潮熱，大便溏，小便自可，胸脅滿不去者，與大柴胡湯
- 15 依《傷寒論》，關於厥陰病「厥熱勝復」，下列敘述何者錯誤？
(A)「傷寒，先厥，後發熱而利者，必自止」，利自止是因陽氣來復
(B)若厥與熱之日數同等，則病不進不退，不厥者自癒
(C)先厥後熱，利止復利是因陰寒復盛
(D)傷寒發熱四日，厥反三日，復熱四日，其為病進
- 16 依《傷寒論》，發汗後腹脹滿者，下列敘述何者最適當？
(A)乃陽明裡實之脹滿 (B)厚朴生薑半夏甘草人參湯主之
(C)桂枝加大黃湯主之 (D)乃太陰裡實之脹滿
- 17 暑熱病邪初起病變中心主要在於下列何者？
(A)太陰 (B)少陰 (C)太陽 (D)陽明
- 18 溫病兼夾痰飲，葉天士謂「舌絳望之若乾，手捫之若有津液」，其病機之演變，下列敘述何者最正確？
(A)此肺虛濕熱熏蒸，將成痰濁蒙閉心包 (B)此脾虛濕熱熏蒸，將成痰濁蒙閉心包
(C)此血虧濕熱熏蒸，將成痰濁蒙閉心包 (D)此津虧濕熱熏蒸，將成痰濁蒙閉心包
- 19 關於溫病「病因與發病」，下列敘述何者錯誤？
(A)病因除溫邪外，還須考量體質與自然、社會環境
(B)「伏寒化溫」的溫熱病邪亦屬溫病病因，病好發於冬季
(C)四時氣候不只影響機體防禦能力，尚有致病原及傳播媒介的生長繁殖
(D)以今日之觀點看待「六淫」應包括致病微生物在內
- 20 梔子豉湯加蔥白、薄荷、鮮生地、麥冬，最宜治療溫病勞復之何種證型？
(A)氣陰兩虛夾內熱 (B)腎陰虧虛 (C)陰虛又復感外邪 (D)表虛勞復
- 21 一患者手足蠕動或微有抽搐，時有驚跳，伴有低熱、消瘦、顴紅、精神萎頓，舌乾紅少津，脈虛數，下列診斷何項正確？
(A)熱盛動風證 (B)熱閉心包證 (C)熱盛動血證 (D)虛風內動證
- 22 驗齒是溫病診斷方法中的獨特內容，下列敘述何者錯誤？
(A)葉天士說：「齒為腎之餘，齦為肺之絡，熱邪不燥肺津，必耗腎液。」
(B)齒燥是由於津液不足或津液不能上布，牙齒失卻濡潤所致
(C)齒垢是由於熱入下焦，腎火蒸騰，胃中濁氣上升所結
(D)齒齲結瓣是由於熱盛動血，血溢凝結所致
- 23 王先生患風溫證，症見身熱、汗出、煩渴、咳喘、胸悶胸痛，舌紅苔黃，脈滑數，最宜用下列何方藥治療？
(A)黃連、栝蔞、枳實、半夏
(B)生石膏、生大黃、杏仁粉、栝蔞皮
(C)麻黃、杏仁、甘草、石膏
(D)大黃、芒硝、甘草、山梔子、薄荷、黃芩、連翹、淡竹葉
- 24 清宮湯組成中，下列何組藥物具有清心泄熱之功用？
(A)犀角、玄參心 (B)蓮子心、連心麥冬 (C)玄參心、連心麥冬 (D)竹葉卷心、連翹心
- 25 有關春溫和風溫的鑑別比較，下列敘述何者錯誤？
(A)兩者均發生於春季
(B)同屬於溫熱性質的溫病
(C)風溫是新感風熱病邪而致病，初起以邪在太陽之表熱證為主
(D)春溫是溫熱病邪伏裡外發，初起以裏熱傷陰證為主
- 26 春溫病程中出現少腹疼痛，小便自利，神志狂亂，脈沉實，選用下列何方最適宜？
(A)羚角鉤藤湯加黃連解毒湯 (B)參附湯送服至寶丹
(C)桃仁承氣湯 (D)清宮湯送服安宮牛黃丸

- 27 17 歲高中男生，在高熱太陽下的操場跑步 30 圈後，突然出現身熱、息高、心煩、溺黃、口渴、自汗、肢倦神疲，脈虛無力，其處方用藥應選擇下列何者最佳？
(A)麥冬、五味子、人參
(B)西洋參、石斛、麥冬、黃連、竹葉、荷梗、知母、甘草、粳米、西瓜翠衣
(C)人參、麥冬、石斛、木瓜、生甘草、生穀芽、鮮蓮子
(D)生石膏、知母、粳米、甘草
- 28 有關濕溫證的治則，下列敘述何者錯誤？
(A)初起衛氣同病，濕邪偏盛者，宜芳香透表裏之濕
(B)邪在中焦，濕濁偏盛，濕中蘊熱者，宜以淡滲利濕為治，盡速為濕邪尋求出路
(C)濕邪化熱，熱勢轉盛，成濕熱俱盛者，宜苦辛通降，化濕清熱並進
(D)熱熾於陽明氣分，當治以清熱生津
- 29 鑑別暑濕和濕溫的主要依據為下列何者？
(A)起病之緩急 (B)發病季節 (C)體質狀況 (D)是否出現白痞
- 30 濕溫病過程中出現濕從寒化，而見脘悶、便溏、腹脹、食少無味，苔白膩，脈緩，下列何方治療最適宜？
(A)附子理中湯 (B)二加減正氣散 (C)參附湯 (D)五加減正氣散
- 31 溫燥與涼燥的鑑別比較，下列敘述何者錯誤？
(A)溫燥鼻中有燥熱感；涼燥鼻鳴而塞，或流清涕
(B)溫燥痰多清稀，化熱後始變膠黏；涼燥咳嗽多稠而膠黏
(C)溫燥唇燥咽乾，心煩口渴；涼燥唇燥咽乾，口不作渴
(D)溫燥苔薄白而燥，舌邊尖紅赤；涼燥苔薄白而乾，舌質未有變化
- 32 34 歲男性，症見身熱，乾咳無痰，氣逆而喘，咽喉乾燥，鼻燥，胸滿脅痛，心煩，口渴，舌苔薄白而燥，舌質邊尖紅赤，下列何方藥治療最適宜？
(A)麻黃、杏仁、石膏、甘草、冬瓜仁、蘆根、桃仁
(B)石膏、杏仁、甘草、冬桑葉、人參、胡麻仁、阿膠、麥門冬、枇杷葉
(C)杏仁、甘草、冬桑葉、菊花、薄荷、蘆根、連翹、桔梗
(D)沙參、玉竹、生甘草、冬桑葉、麥門冬、生扁豆、花粉
- 33 依《金匱要略·百合狐惑陰陽毒》，有關百合病症狀與方劑之配對，下列敘述何者正確？
(A)百合病下之後者，栝蒌牡蠣散主之 (B)百合病發汗後者，百合雞子湯主之
(C)百合病吐之後者，百合知母湯主之 (D)百合病變發熱者，百合滑石散主之
- 34 依《金匱要略·百合狐惑陰陽毒》，有關狐惑釀膿過程，下列敘述何者正確？
(A)膿未成時，脈數身熱而煩 (B)膿未成時，大黃牡丹皮湯加黃連
(C)得之七八日，瘀血內積，目四眦黑 (D)膿已成者，赤小豆桃仁當歸散主之
- 35 依《金匱要略·肺痿肺癰欬嗽上氣》，有關「厚朴麻黃湯」與「澤漆湯」，下列敘述何者最適宜？
(A)厚朴麻黃湯證與澤漆湯證皆挾有熱
(B)厚朴麻黃湯證病勢偏於上焦，澤漆湯證病勢偏於下焦
(C)厚朴麻黃湯中用小麥之意猶如澤漆湯中加紅棗一樣
(D)厚朴麻黃湯證因寒欲入內而喘咳，澤漆湯證因留飲欲向外而喘咳
- 36 依《金匱要略》，下列選項何者最適宜？①邪在於絡，但臂不遂 ②邪入於臟，即不識人 ③邪在於經，即重不勝 ④邪入於腑，舌即難言，口吐涎
(A)僅③ (B)①② (C)②④ (D)③④
- 37 依《金匱要略》，「太陽病，無汗而小便反少，氣上衝胸，口噤不得語，欲作剛痙」，治以下列何方最適宜？
(A)栝蒌桂枝湯 (B)奔豚湯 (C)五苓散 (D)葛根湯
- 38 依《金匱要略·腹滿寒疝宿食》，「腹滿不減，減不足言，當須下之」，治以下列何方最適宜？
(A)大柴胡湯 (B)下瘀血湯 (C)甘遂半夏湯 (D)大承氣湯
- 39 依《金匱要略·痰飲咳嗽》，下列何者為己椒藶黃丸的病機？
(A)心下支飲 (B)痰飲水走腸間 (C)膈上伏飲 (D)脇下懸飲

- 40 依《醫宗金鑑·訂正仲景全書金匱要略註》，皮水為病，四肢腫，水氣在皮膚中，四肢聶聶動者，治以下列何方最適當？
(A)防己黃耆湯 (B)越婢湯 (C)防己茯苓湯 (D)越婢加朮湯
- 41 依《醫宗金鑑·訂正仲景全書金匱要略註》，有關婦人產後之敘述，下列何者最適當？
(A)新產婦人有三病：一者病瘧，二者病血暈，三者大便難
(B)新產血虛，多汗出，喜中風，故令病瘧
(C)亡血復汗，寒多，故令血暈
(D)亡血，腸燥，故大便難
- 42 依《醫宗金鑑·訂正仲景全書金匱要略註》，婦人腹中諸疾痛，下列何方劑治之最適當？
(A)當歸芍藥散 (B)四逆散 (C)紅藍花酒 (D)當歸生薑羊肉湯
- 43 依《金匱要略·嘔吐下痢》，「下痢，三部脈皆平，按之心下堅者」，治以下列何方最適當？
(A)三黃瀉心湯 (B)大承氣湯 (C)白頭翁湯 (D)桃花湯
- 44 依《金匱要略·婦人妊娠》，「妊娠，有水氣，身重，小便不利，瀝淅惡寒，起即頭眩」，治以下列何者最適當？
(A)白朮、蜀椒 (B)半夏、茯苓 (C)阿膠、艾葉 (D)葵子、茯苓
- 45 關於眩暈，下列敘述何者錯誤？
(A)本病多屬本虛標實，本虛多為肝腎陰虧，氣血不足，標實多為風、火、痰、瘀等
(B)不論高血壓或低血壓，只要臨床表現以眩暈為主症者，均可參照本病辨證論治
(C)若長期惱怒，氣鬱化火，使肝陰暗耗，常形成「肝火上炎」之眩暈證
(D)若脾胃失之健運，致水穀不化，聚濕生痰則易成「痰濕中阻」之眩暈證
- 46 黃疸之病因病機，下列敘述何者錯誤？
(A)黃疸的發生，主要是濕邪為患 (B)急黃之人在病機上有濕重於熱或熱重於濕之別
(C)陰黃之人是平素脾陽不足，濕從寒化而致 (D)陽黃之人是平素胃火偏旺，濕從熱化而致
- 47 邱爺爺腹脹，按之不堅，脅下脹滿或痛，食少易脹，噯氣不爽，小便短少，苔白膩，脈弦。根據辨證，下列何方最適宜？
(A)香砂六君子湯 (B)胃苓湯和柴胡疏肝散
(C)甘露消毒丹 (D)藿香正氣散
- 48 一失眠患者食慾不振，比較疲勞時更睡不著，看其面色少華，舌淡脈細，多夢易醒，下列辨證及治法何者最適當？
(A)證屬心膽氣虛，治以溫膽湯 (B)證屬心脾兩虛，治以歸脾湯
(C)證屬肝腎陰虛，治以黃連阿膠湯 (D)證屬痰熱內擾，治以酸棗仁湯
- 49 關於癲狂，下列敘述何者正確？
(A)棄衣而走、逾垣上屋為癲證特徵之一
(B)狂證多由痰氣鬱結，蒙蔽心竅所致
(C)狂證之治療，主於氣與痰；癲證之治療，主於血瘀與痰火，在臨床上兩者不能相互轉化
(D)癲證之治療，宜解鬱化痰，寧心安神，補養氣血
- 50 一患者癲癇發作日久，自覺記憶力差，頭暈腰痠，兩腿無力，五心煩熱，舌紅少苔，脈細數，大便乾。有關患者證型病機與治療，下列敘述何者正確？
(A)證型—氣虛血瘀 (B)病機—脾不健運，胃失和降
(C)治法—滌痰熄風，開竅定癇 (D)主方—大定風珠
- 51 清·唐容川《血證論·吐血》中指出吐血責之於胃，治療吐血提出四法為通治血證之大綱，下列四法何者不是唐容川所提出的四法？
(A)止血 (B)消瘀 (C)清熱 (D)補血
- 52 有關泄瀉，下列敘述何者錯誤？
(A)《內經》：「春傷於風，邪氣留連，乃為洞泄」
(B)《素問·金匱真言論》：「長夏善病，洞泄寒中」
(C)《臨證指南》：「陽明胃土已虛，厥陰肝風振動」
(D)《景岳全書·泄瀉》：「泄瀉之本，無不由於脾胃，泄瀉之因，惟木土二氣為最」
- 53 患者便血，大便不暢或稀溏，腹痛，口苦，舌紅苔黃膩，脈濡數，下列敘述何者最適宜？
(A)便血色紫暗 (B)宜益氣攝血 (C)治以地榆散 (D)腹隱痛喜按

- 54 下列何者為痰飲留於胃腸的症狀？
(A)胸脅支滿，心下痞 (B)水走腸間，漑漑有聲
(C)咳逆喘滿，痰吐白沫 (D)身體沉重，肢體水腫
- 55 喘證臨床症狀與體徵有虛實之分，關於實證辨證要點，下列敘述何者正確？
(A)喘而呼吸深長 (B)面色蒼白或青灰 (C)舌質淡苔白滑 (D)脈象微弱或中空
- 56 哮喘是一種突然發作，以呼吸急促、喉間哮鳴有聲為臨床特徵的疾病。自《內經》等典籍中並無此一病名，但有哮喘症狀、病因病機的記載。直到何本著作開始以哮喘作為獨立病名？
(A)漢·張仲景《傷寒論》 (B)隋·巢元方《諸病源候論》
(C)許叔微《普濟本事方》 (D)朱丹溪《丹溪心法》
- 57 60 歲女性患者，平時體弱多病，神疲善欠，近一週腰酸背痛，尿意難忍，夜間偶失禁，大便鬆散不成形，睡眠品質差，畏寒肢冷，少腹拘急，舌質胖淡，苔薄白，脈沉遲。下列治則何者最正確？
(A)健脾益氣 (B)溫補心腎 (C)溫補脾腎 (D)補血養肝
- 58 56 歲男性患者，因耳鳴前來求診，主訴有耳鳴時輕時重，休息暫減，煩勞則加，四肢困倦，勞怯神疲，昏憤食少，大便溏薄，脈細弱，舌苔薄白膩，其病機為下列何者？
(A)腎精虧虛 (B)清氣不升 (C)痰火鬱結 (D)風熱蒙遏清竅
- 59 有關淋證，下列敘述何者錯誤？
(A)亦名淋瀝、諸淋、五淋
(B)若起病急驟者，名曰卒淋，或稱暴淋
(C)淋之名稱，始見於《內經》
(D)《景岳全書》提出「凡熱者宜清，濕者宜利，下陷者宜升提」的論治原則
- 60 因風濕外襲，邪客玄府，肺失開合，通調失司，水溢肌膚所導致的水腫為下列何者？
(A)陽水 (B)石水 (C)陰水 (D)腎水
- 61 「關格」一詞，最早見於何書？
(A)《傷寒論》 (B)《難經》 (C)《金匱翼》 (D)《內經》
- 62 仲景論述瘧證，使用下列何方劑治療之法，為後世溫病學派治療「熱盛致瘧」的先導？
(A)白虎湯 (B)大承氣湯 (C)四逆散 (D)麻杏石甘湯
- 63 關於痿證，下列敘述何者正確？
(A)痿證是指肢體筋脈弛緩，手足痿軟疼痛的病證
(B)風藥、表藥為治痿常用藥物
(C)治痿獨取陽明的治則一直為歷代醫家所重視，所謂獨取陽明，一般指補益後天或清化陽明濕熱而言
(D)痿證因濕熱濡漬，氣血不運，宜用虎潛丸治療
- 64 關於痺證，下列敘述何者正確？
(A)痺之原義為臟腑虛弱邪入經絡
(B)痺證而用桃紅飲加黃耆桂枝治療當是熱痺
(C)痺證投與烏頭湯效佳，其鑑別診斷的關鍵處是疼痛較劇，得熱則緩
(D)行痺用藥僅用祛風藥即可，純粹祛風邪為目的
- 65 在中醫學史上，下列那位學者將複雜的問診內容歸納為《十問》，使後世醫者在臨症時易於掌握？
(A)張仲景 (B)張元素 (C)張錫純 (D)張景岳
- 66 人體臟腑和形體，體內和體表的聯絡路線為何？
(A)氣血 (B)經絡 (C)營衛 (D)津液
- 67 有關痰之敘述，下列組合何者正確？①痰黃黏稠，堅而成塊者，屬熱痰 ②痰白而清稀，或有灰黑點者，屬寒痰 ③痰清稀而多泡沫，多屬食積 ④痰白滑而量多，易咯出者，屬濕痰 ⑤痰少而黏，難於咯出者，屬燥痰，甚者乾咳無痰，或有少量泡沫痰，亦屬肺燥 ⑥痰中帶血，色鮮紅者，為熱傷肺絡，以陰虛火旺者為多見 ⑦若咳吐膿血腥臭痰，或吐膿痰如米粥者，屬肺痿 ⑧咳吐涎沫，口張氣短者，是肺癰
(A)④⑤⑧ (B)③⑥⑦ (C)①②⑤ (D)①④⑦

- 68 關於癰、疽、疔、癤之描述，下列組合何者正確？①紅腫高大，根盤緊束，伴有焮熱疼痛者 ②漫腫無頭，膚色不變，不熱少疼者 ③初起如粟如米，根腳堅硬較深，麻木或發癢，頂白而痛者 ④起於淺表，形小而圓，紅腫熱痛不甚，容易化膿，膿潰即癒 ⑤多由濕熱火毒內蘊，氣血瘀滯，熱盛肉腐而成 ⑥多由氣血虛而寒痰凝滯，或五臟風毒積熱，攻注於肌肉，內陷筋骨所致 ⑦多由暴氣毒邪，襲於皮膚，傳注經絡，以致陰陽二氣不得宣通，氣血凝結而成 ⑧多由暑濕阻於肌膚，或臟腑蘊積濕熱，向外發於肌膚，使氣血壅滯而成
(A)癰：①；疽：⑥；疔：②；癤：⑤ (B)癰：⑤；疽：②；疔：③；癤：⑧
(C)癰：②；疽：③；疔：④；癤：⑦ (D)癰：⑦；疽：④；疔：①；癤：⑥
- 69 若見患者舌腫脹，則下列何者非為其主要病機？
(A)血熱上壅 (B)酒毒衝逆 (C)中毒血瘀 (D)水濕上泛
- 70 某 50 歲婦人，平時易汗出，不喜吹風，活動及進食時易汗出身倦，眠時亦常汗出，醒時汗止，則下列辨證何者最適當？
(A)氣虛 (B)陽虛 (C)陰虛 (D)氣陰兩虛
- 71 外感發熱與內傷發熱的比較，下列敘述何者正確？
(A)外感發熱起病緩慢；內傷發熱起病迅速
(B)外感發熱惡寒與發熱間作；內傷發熱惡寒與發熱並作
(C)外感發熱雖加衣被仍惡寒；內傷發熱加衣被則惡寒減
(D)外感發熱胸部較熱；內傷發熱背部較熱
- 72 關於「鄭聲」，下列敘述何者錯誤？
(A)語言重複 (B)屬虛證
(C)語不成句或語言前後不相接續 (D)聲音洪亮
- 73 關於「遲脈」，下列敘述何者錯誤？
(A)遲脈相當於每分鐘脈搏 60 次以下
(B)正常人也可見遲而有力之脈
(C)遲而有力可能為寒積，或是邪熱結聚，阻滯血脈流行
(D)傷寒陽明病脈遲，為寒實之證，攻之宜慎
- 74 下列何者並非外感熱病「痰迷心竅」的表現？
(A)神志昏迷或似明似昧 (B)脈象滑數
(C)舌乾絳少苔 (D)熱不甚高或身熱不揚
- 75 臨床上若見病患在大量出血之後，出現面色㿔白、出冷汗、血壓下降、脈芤，甚至暈厥等現象，則其病機下列何者最適宜？
(A)氣不攝血 (B)氣隨血脫 (C)氣滯血停 (D)氣血兩虛
- 76 關於衛氣營血辨證的臨床可見症狀，下列敘述何者錯誤？
(A)衛分：發熱，微惡風寒 (B)氣分：發熱，不惡寒反惡熱
(C)營分：吐衄發斑 (D)血分：抽搐動風
- 77 就衛氣營血辨證而言，關於「血分證」，下列敘述何者最適宜？
(A)是溫病發展過程中正氣抗邪最盛的階段
(B)以肺、胃、大腸的出血、動血為主症，故主要病位在前述臟腑
(C)若為血分熱證則病位偏重於心、肝，常見神志異常及動血、動風之證候
(D)若為血分虛熱證，多由氣分熱邪直入血分演變而成
- 78 下列何者不是「小腸實熱證」常見的臨床症狀？
(A)尿赤澀 (B)尿道灼痛，尿血
(C)心煩口渴，口舌生瘡 (D)煩躁失眠，腰痛健忘
- 79 某 49 歲男性患者，有消化性潰瘍病史，胃幽門螺旋桿菌檢查為陽性反應。平時經常噁心嘔吐，合併有眩暈。朝食暮吐，嘔吐物多以清涎為主。診其舌苔薄白滑，舌淡紅，脈沉。依中醫辨證原則來分析本病，其病因病機以下列何者最適當？
(A)胃寒 (B)胃熱 (C)腸胃氣滯 (D)食滯
- 80 某 40 歲男性患者，最近一週來連續腹瀉，每天三至四次，食慾不振，心下與右上腹痞痛，腸鳴。自覺容易疲倦，同時顏面皮膚與眼結膜均發黃，皮膚搔癢。舌苔白滑，舌質淡紅，脈沉無力，右脈帶弦。生化檢查發現 SGOT/SGPT：583/1291 IU/dL；Bilirubin (total)：4.5 mg/dL。肝膽科醫師診斷為慢性肝炎急性發作，請問本病的病機以下列何者最適當？
(A)濕熱內蘊，濕重於熱 (B)濕熱內蘊，熱重於濕
(C)寒濕內阻 (D)瘀血停滯