

105年第一次專門職業及技術人員高等考試醫師牙醫師藥師考試分階段考試、藥師、醫事檢驗師、醫事放射師、助產師、物理治療師、職能治療師、呼吸治療師、獸醫師考試

代 號：4310

類科名稱：助產師

科目名稱：助產學（一）（包括助產學緒論、生殖系統的解剖與生理、產前護理、分娩期護理、產後護理、新生兒護理）

考試時間：1小時

座號：_____

※注意：本試題禁止使用電子計算器

- 有關孕產婦死亡率之敘述，下列何者正確？
 - 孕產婦死亡率是指在懷孕或懷孕終止30天內婦女之死亡數
 - 孕產婦死亡率為原因別死亡率（cause-specific death rate）一種
 - 自1990年來迄今臺灣孕產婦死亡率有逐年上升的趨勢
 - 孕產婦死亡率不是人口健康狀況的指標之一
- 在剖腹生產之前，醫師會向產婦及其家屬說明手術情形及一般步驟，此一措施是維護產婦的那一項權利？
 - 隱私權
 - 自主權
 - 知情同意權
 - 就醫權
- 下列何者不符合當代助產的變革與趨勢？
 - 生產方式多元，例如站姿生產
 - 以家庭為中心，例如準爸爸陪產
 - 生產地點有彈性，例如居家生產
 - 生產照顧醫療化，例如常規灌腸
- 有關荷爾蒙對懷孕婦女的影響，下列敘述何者錯誤？
 - 黃體素（progesterone）會增加母體腸道蠕動
 - 人類絨毛膜促性腺激素（hCG）易引發噁心、嘔吐
 - 動情素（estrogen）會增加水份的滯留
 - 人類胎盤泌乳激素（hPL）有抗胰島素作用
- 陰道分泌物呈E型黏液顯著增加時，是進入到月經週期的那一階段？
 - 月經期
 - 排卵前期
 - 排卵期
 - 排卵後期
- 精子構造中，攜帶染色體的部位為：
 - 頭部
 - 體部
 - 尾部
 - 背部
- 有關陰道的敘述，下列何者正確？
 - 陰道中1/3的血液循環是由膀胱下動脈供應
 - 陰道呈中性，其pH值變化約在6.3~7.4之間
 - 陰道上皮組織有腺體分布，可分泌體液，保持陰道濕潤
 - 大部分女性陰道前壁的長度大於陰道後壁的長度
- 有關男性內生殖分泌機轉的敘述，下列何者正確？
 - 腦下垂體前葉分泌的促性腺釋放素（gonadotropin releasing hormone）會刺激下視丘分泌濾泡刺激素（follicle stimulating hormone）與黃體生成素（luteinizing hormone）
 - 濾泡刺激素（follicle stimulating hormone）與黃體生成素（luteinizing hormone）會促進睪丸中精子的生成作用及副睪丸中睪固酮（testosterone）的分泌
 - 黃體生成素（luteinizing hormone）會刺激間質分泌細胞（或稱萊迪細胞）（Leydig cell）產生睪固酮（testosterone）
 - 濾泡刺激素（follicle stimulating hormone）會抑制史托利細胞（sertoli's cell）產生抑制素（inhibin），因而刺激精子產生
- 孕婦受鬆弛素（relaxin）影響，會使下列何項關節鬆脫與可動性增加？
 - 薦尾骨、恥骨

- B.胸骨、頸椎骨
C.鼻骨、薦腸骨
D.鎖骨、肋骨
- 10.有關預產期之估算方法，下列何者正確？
A.子宮底高度（公分） $\times 8/7$ ＝懷孕週數
B.初產婦預產期以胎動初覺日加 24 週
C.最後一次月經的第一天之日期的月數 + 7，日數 + 9
D.以性交日加280天
- 11.有關妊娠期常見的不適，下列敘述何者正確？
A.黃體素（progesterone）增加，易導致牙齦出血
B.鬆弛素（relaxin）濃度上升，使腸蠕動變慢
C.人類絨毛促性腺激素（hCG）增加，使乳房有脹痛感
D.動情素（estrogen）上升，易產生血管蜘蛛痣
- 12.王女士妊娠36週，孕期皆無併發症，因為感覺胎兒活動力降低，所以來做無壓力試驗（Nonstress test, NST），NST結果是反應性的。助產人員除了強化注意胎動次數外，還可以做下列何種處置？
A.告訴她以後不需要再做NST
B.請她2週後回來再進行NST
C.請她1週後回來再進行NST
D.請她馬上再進行催產素挑釁試驗
- 13.張太太懷孕初期因嚴重噁心嘔吐，導致進食量減少、體重下降，下列那一項建議最不合適？
A.清晨起床時先吃餅乾
B.吃餅乾後立即喝水
C.少量多餐
D.採高熱量高蛋白飲食
- 14.當婦女問到懷孕期間的每日營養攝取應注意那些項目時，下列回答何者最不適宜？
A.蛋白質每日宜攝取60 g
B.懷孕第二期後鐵質每日宜攝取30 mg
C.葉酸每日宜攝取200 μ g
D.維生素D每日宜攝取10 μ g
- 15.有關素食者懷孕後的主要飲食建議，下列那一項較不需要？
A.建議採蛋奶素
B.每日應攝取維生素B₁₂ 2 μ g
C.每日應攝取維生素E 10 μ g
D.應注重鐵質的攝取
- 16.有關婦女懷孕的徵候，下列敘述何者正確？
A.停經（amenorrhea）為可能徵候（probable sign）
B.胎動初覺（quickening）為疑似徵候（presumptive sign）
C.布雷希氏收縮（Braxton Hicks contraction）為確實徵候（positive sign）
D.測得胎心音為可能徵候（probable sign）
- 17.當發現懷孕婦女有水腫現象時，其最有可能缺乏的營養素是：
A.鐵質
B.蛋白質
C.鈉
D.葉酸
- 18.張女士主訴懷孕後，解便需要很用力，且需要很多次才能解完，下列指導何者不適宜？
A.養成固定的排便時間
B.教導使用小量甘油灌腸劑
C.規律的運動
D.一有便意就排便
- 19.張太太懷孕35週，經超音波檢查胎兒已2,900公克，母胎皆正常，但張太太希望以剖腹產方式即早分娩以免胎兒過重難生產，下列敘述何者最不恰當？
A.評估胎兒體重超過3,100公克即可分娩
B.應評估胎兒肺的成熟度
C.應考量胎兒自母體得到的抗體量
D.不應以剖腹產取代自然分娩過程

- 20.有關海軋氏徵象（Hegar's sign）的敘述，下列何者正確？
- A.受精卵植入部位不規則柔軟
 - B.子宮峽部變軟
 - C.子宮體充血量增加
 - D.子宮黏膜顏色為藍紫色
- 21.孕婦獲知懷孕後，會常常摸摸肚子且和寶寶說親密的話，並為他取暱名如「baby」，以Reva Rubin孕期母性任務解釋，此種行為顯示孕婦的何種母性任務？
- A.確保自己與胎兒安全
 - B.使重要家人接受胎兒
 - C.學習貢獻自己
 - D.與胎兒連成一體
- 22.下列何者為孕婦懷孕37週最可能的行為表現？
- A.對胎兒有不實際的美好幻想
 - B.對身體心像改變呈現正向反應
 - C.懷疑現在懷孕是否合適
 - D.害怕生產，但會積極準備生產
- 23.胎兒生理活動評估（biophysical profile）的評估項目不包括？
- A.肺成熟度
 - B.羊水量
 - C.胎兒張力
 - D.胎兒呼吸運動
- 24.使用超音波評估懷孕週數之敘述，下列何者正確？
- A.懷孕4～10週測頭臀長，12～15週時測雙頂徑
 - B.懷孕5～11週測頭臀長，13～17週時測雙頂徑
 - C.懷孕7～13週測頭臀長，16～20週時測雙頂徑
 - D.懷孕15～18週測頭臀長，20～24週時測雙頂徑
- 25.有關懷孕產生心灼熱感的指導措施，下列何者最適宜？
- A.一天吃三餐
 - B.可吃些少許產氣食物
 - C.少量多餐
 - D.一定要吃宵夜，避免空腹
- 26.懷孕早期，子宮體增大造成膀胱受壓，容易產生下列何種現象？
- A.尿失禁
 - B.尿瀦留
 - C.血尿
 - D.頻尿
- 27.有關分娩機轉的敘述，下列何者錯誤？
- A.頭盆傾度均勻是指胎頭的矢狀縫合位於薦骨岬與恥骨聯合的中點
 - B.正常發生內旋轉時，胎頭旋轉 45°～90°，矢狀縫合在骨盆前徑上
 - C.胎頭以最小的枕額徑通過骨盆
 - D.當雙頂徑進入骨盆入口時，即稱為固定
- 28.有關無痛性子宮收縮的敘述，下列何者正確？
- A.收縮造成破水現象
 - B.多發生於背部
 - C.不規則性收縮
 - D.子宮頸會變薄和擴張
- 29.有關生產重要因素的4個「P」是指：
- A.產道、子宮收縮力、胎兒、過去經驗
 - B.胎兒、胎產式、胎位、骨盆
 - C.產道、分娩力量、胎產式、產位
 - D.產道、胎兒、分娩力量、精神因素
- 30.有關硬膜外麻醉法常見的副作用，下列何者錯誤？
- A.低血壓
 - B.噁心、嘔吐
 - C.低血容性休克
 - D.頭痛

31. 正常足月兒的胎心率約多少？
A. 80~110 bpm
B. 120~160 bpm
C. 170~200 bpm
D. 210~240 bpm
32. 呼吸技巧可幫助產婦減輕疼痛，其衛教的方式何者正確？
A. 呼吸技巧的運用是讓產婦集中注意力在子宮收縮及放鬆的意念
B. 教導產婦腹式呼吸可減輕橫膈對宮底的干擾，減輕宮縮不適
C. 教導每次收縮開始和結束時深呼吸，可減少二氧化碳和增加氧氣
D. 呼吸對產婦來說是一種放鬆，故教導產婦當吐氣時開始集中注意力在子宮收縮
33. 生產準備課程中，助產人員會教導待產婦使用拉梅茲方法來緩解疼痛，此方法中若是針對產婦對生產的負向預想，經由教育形成新的對子宮收縮的因應方式，且不再懼怕，這機轉是屬於下列何種反應？
A. 壓力反應
B. 制約反應
C. 焦慮反應
D. 認知反應
34. 林太太，G₂P₁，足月妊娠，現子宮頸口開7公分，station:0，生命徵象皆正常。在評估其分娩狀況時，下列那一項為危險訊號？
A. 羊水量2,000 c.c.
B. 自發性破水
C. 現血量增加
D. 白血球25,000/mm³
35. 陳太太G₁P₀，懷孕39週，因宮縮不適由家屬陪同入產房待產。當為陳太太進行產程評估時，下列敘述何者正確？
A. 評估子宮收縮強度時，手應放陳太太的下腹部
B. 當陳太太的子宮頸擴張至5公分時，是處於潛伏期的狀態
C. 當陳太太進入活動期後，因疼痛常會要求使用藥物，且會顯得較依賴
D. 處在活動期的陳太太，其宮縮強度為重度，感覺約像在按壓臉頰
36. 有關生產婦女於第四產程的照護，下列何者護理措施不適當？
A. 給予產婦保暖
B. 持續的按摩子宮
C. 觀察會陰傷口有否血腫
D. 注意有否膀胱漲
37. 有關待產婦接受Demerol止痛的敘述，下列何者錯誤？
A. 有抑制待產婦呼吸的副作用
B. 可能會發生胎心率變異性下降
C. 肌肉注射50 mg，可持續作用約3小時
D. 拮抗劑為Narcan 0.1 mg/kg
38. 臨床上，以那一個指示點及縮寫代表顛頂產式？
A. 枕部，「O」
B. 額部，「F」
C. 枕部，「F」
D. 額部，「M」
39. 當子宮頸口擴張約8~9公分時，下列何者不是助產人員可觀察到的常見現象？
A. 產婦有便意感及不自主的用力
B. 現血量增加
C. 宮縮時可儘量維持身體不動，以維持控制
D. 口乾、疲倦
40. 執行陰道檢查時，若觸診到後凶門位於母親恥骨的正下方，則其胎位為：
A. 前位
B. 橫位
C. 後位
D. 側斜位
41. Bishop Score評估結果是用來做為何種醫療行為的參考依據？
A. 抗生素治療

- B.減痛分娩
 - C.剖腹產
 - D.引產
- 42.待產婦王女士，子宮頸口開到8公分，宮縮約每隔一分鐘有一次持續60～90秒，此時王女士有用力向下推的感覺，助產人員的指導，下列何者較適當？
- A.待產婦依口令「一」時吸氣，「ㄘ」時吐氣
 - B.待產婦依口令自鼻慢慢吸氣，由口慢慢吐氣
 - C.待產婦依口令吸一口氣，憋氣往下用力到不能再閉氣為止，然後吐氣
 - D.待產婦依口令採噤嘴式呼吸法，以短促呼吸方式呼出氣體
- 43.正常足月胎兒之胎心率的一般變異性約為：
- A.6～10次/分鐘
 - B.11～25次/分鐘
 - C.大於25次/分鐘
 - D.120～160次/分鐘
- 44.有關會陰部神經阻斷麻醉（pudendal block）的敘述，下列何者正確？
- A.一般只有麻醉醫師才能執行
 - B.可以提供陰道上2/3及整個會陰部之麻醉
 - C.最適當的時機是子宮擴張5公分進入分娩活動期給予
 - D.在麻醉劑注入之前不需反抽，因為此處不會有血管
- 45.陳女士待產中，現子宮頸口開7公分，抱怨臉、唇、手和腳均有刺痛麻木感，助產人員發現她有換氣過度現象，此時最合宜的護理措施為：
- A.教導產婦用力深呼吸
 - B.用紙袋罩住產婦口鼻呼吸
 - C.教導產婦採快且短促的呼吸
 - D.給予使用氧氣
- 46.若胎血酸鹼值為7.23，其所代表的意義為：
- A.正常
 - B.邊緣數值，可能有酸中毒
 - C.邊緣數值，可能有鹼中毒
 - D.酸中毒
- 47.有關理想的會陰切開傷口或是裂傷的修補術需注意的事項，下列何者錯誤？
- A.骨盆底肌肉組織的恢復，以支撐骨盆內器官
 - B.預防可能發生的婦科疾病，如膀胱或直腸脫垂
 - C.應用間斷性縫合法以減輕會陰疼痛
 - D.預防產婦日後在性行為上的不舒適
- 48.有關產後痛（afterpains）的敘述，下列何者正確？
- A.初產婦較明顯，因為子宮肌肉較無耐力
 - B.初產婦較明顯，因為陰道口較緊
 - C.經產婦較明顯，因為子宮肌肉較鬆軟
 - D.經產婦較明顯，因為陰道口較鬆弛
- 49.助產人員在為陳太太做下肢檢查時，發現霍曼氏徵象 (Homan's sign) 呈陽性反應，此表示是有：
- A.妊娠毒血症
 - B.血栓性靜脈炎
 - C.產後憂鬱症
 - D.產褥熱
- 50.助產人員協助產後第1天婦女施行子宮按摩，有關子宮按摩時手的位置，下列敘述何者最正確？
- A.一隻手放在恥骨聯合處，另一隻手放在子宮底的地方
 - B.一隻手放在子宮底的地方，另一隻手放在子宮體的地方
 - C.二隻手一起放在肚臍下之腹部
 - D.只需一隻手放在子宮底的地方
- 51.助產人員在提供產後住院期間的純母乳哺餵照護，發現下列那些情況時，則可能會有乳汁供應不足的情形發生？①乳汁變較濃稠 ②混合哺餵時配方奶量增加 ③母親顯得焦慮，主訴擔心寶寶吃不飽 ④寶寶每次用餐間隔約兩小時
- A.①②

- B.②③
- C.③④
- D.①④

52.有關產後運動之敘述，下列何者正確？

- A.適當的產後運動宜在產後24小時後開始
- B.凱格爾運動可以增強會陰部肌肉張力
- C.骨盆搖擺運動是促進子宮復舊
- D.腿部運動可以促進子宮復舊

53.嬰兒吸吮母乳時，不換邊直到嬰兒自動鬆口，其主要原因是：

- A.前奶後奶都有吃到
- B.換邊後嬰兒會拒吃
- C.中斷進食嬰兒會哭鬧
- D.嬰兒吃奶很專心不要吵他

54.于女士剖腹產後第1天，表示自上午5點至9點間尚未更換產墊，協助更換產墊，發現產墊上惡露量少，此時助產人員的判斷，下列何者最正確？

- A.正常現象，因為剖腹產時已將子宮內膜刮乾淨
- B.正常現象，因于女士臥床少活動，故惡露量排出較少
- C.異常現象，為子宮頸阻塞的徵象
- D.異常現象，為子宮收縮不良的徵象

55.有關產後的會陰傷口照護之敘述，下列何者錯誤？

- A.必要時行溫水坐浴，促進會陰傷口癒合
- B.多攝取高蛋白及維生素C的食物
- C.保持會陰處清潔
- D.潮濕的環境有利於會陰表皮快速癒合

56.容易造成產後婦女尿道感染的原因，下列何者錯誤？

- A.使用催產素（oxytocin）造成尿液過多而導致
- B.生產過程中使用麻醉劑，造成尿瀦留而導致
- C.膀胱在生產過程中受到某種程度的伸展和損傷而導致
- D.生產時胎兒壓迫膀胱過久或無菌技術沒有徹底執行而導致

57.口服避孕藥的開始服用時間，下列何者錯誤？

- A.月經來潮第5天
- B.人工流產當日
- C.單次配方的口服避孕藥，在性行為後12~24小時內服用第一劑
- D.產後哺乳第28天

58.下列何種避孕用品，可以重複使用？

- A.男用保險套
- B.女用保險套
- C.子宮隔膜
- D.銅T

59.王女士詢問：「產後何時可以開始恢復性生活？」此時助產人員的回應，下列何者最適當？

- A.「產後6週做完產後檢查，且醫生檢查沒問題時。」
- B.「會陰傷口癒合無疼痛現象，且夫妻都覺得準備好時。」
- C.「產後第1次月經來潮乾淨後。」
- D.「無限制，隨時皆可。」

60.王女士純餵母乳2個月後，將嬰兒交給褓母照顧，但褓母抱怨嬰兒都不吸奶瓶的母乳，此時助產人員的建議，下列何者最不適當？

- A.將奶瓶奶嘴放入嬰兒的嘴邊，讓他自己尋找奶嘴，主動含入嘴裏
- B.試著將奶嘴泡在冰水中，嬰兒會喜歡吸質地較硬的奶嘴
- C.用奶瓶餵食時，拿有王女士味道的衣服包裹著嬰兒
- D.在嬰兒還沒很餓之前先餵食

61.有關產後期子宮收縮所導致的影響，下列敘述何者正確？

- A.壓迫血管，減少出血量
- B.促進血管收縮，以利惡露排出
- C.增加催產素分泌，以利乳汁分泌
- D.促進子宮收縮，減少產後痛

62.造成子宮位置偏離腹部中線，最可能的原因為：

- A.膀胱漲滿
 - B.子宮收縮不佳
 - C.產婦睡覺喜歡側一邊
 - D.圓韌帶鬆弛
- 63.林女士陰道分娩後第一天，主訴：「生完小孩後小便次數變多，但是每次都只解一點點，好像沒有解乾淨。」助產人員判斷造成此現象，最可能的原因為：
- A.感染
 - B.利尿作用
 - C.尿液滯留
 - D.陰道血腫
- 64.在正常情況下，產後期脈搏心跳的變化，下列敘述何者正確？
- A.脈搏心跳會有減慢現象，因為心輸出量降低，體液容積過量
 - B.脈搏心跳會有減慢現象，因為心輸出量降低，體液容積下降
 - C.脈搏心跳會有加速現象，因為心輸出量增加，體液容積過量
 - D.脈搏心跳會有加速現象，因為心輸出量增加，體液容積下降
- 65.下列何者不是嬰兒正確吸奶的表現？
- A.嬰兒的下嘴唇呈外翻
 - B.嬰兒的下巴貼住母親的乳房
 - C.嬰兒的頭與身體是一直線，並面對母親乳房
 - D.嬰兒嘴巴上方的乳暈較下方露出的少
- 66.產婦主訴哺餵新生兒時乳頭疼痛，觀察其乳頭表皮完整並未紅腫，下列何項措施不恰當？
- A.觀察哺乳，再調整新生兒含乳姿勢，使其口部含住較多乳暈
 - B.餵奶後讓乳頭暴露在空氣中數分鐘
 - C.教導經常更換哺餵姿勢
 - D.建議產婦先停餵母乳，改餵配方奶
- 67.有關母乳的儲存，下列敘述何者錯誤？
- A.母乳應密封於乾淨或無菌容器保存
 - B.母乳在室溫25℃以下，可放4～6小時
 - C.10天內會喝完的母乳，冷藏即可
 - D.冷凍的母乳退冰後，不宜再冷凍
- 68.有關減輕乳房腫脹（engorgement）的方法，下列敘述何者正確？
- A.限制一天的液體攝入量
 - B.暫時服用退奶藥
 - C.穿緊一點的胸罩
 - D.餵奶後冷敷乳房
- 69.有關泌乳激素（prolactin）的敘述，下列何者正確？
- A.白天分泌比晚上多
 - B.是由腦下垂體後葉所分泌
 - C.可促進乳腺管收縮，使奶水移出
 - D.會延遲排卵的時間
- 70.下列何種方法最能促進產後婦女的膀胱功能的復舊？
- A.早期下床活動
 - B.床上使用便盆解尿
 - C.使用冷水會陰沖洗
 - D.每隔8～10小時解尿一次
- 71.張女士陰道生產後第一天，主訴：「你看我肚子還好大，好像還懷孕五個月大。」此時助產人員的回應，下列何者最適當？
- A.「不會啊！還有人肚子比你更大。」
 - B.「這是正常的產後變化，不用擔心。」
 - C.「對於這樣的變化，妳覺得怎樣？」
 - D.「的確是這樣，不過慢慢會變小的。」
- 72.黃太太G₁P₁，娩出一女嬰，體重3,200公克，產後15小時進行母乳哺餵時，發現寶寶由肛門解出青黑色柏油狀物質，此時助產人員的解釋，下列何者正確？
- A.此為寶寶在生產過程中受到驚嚇的正常反應
 - B.此為寶寶在母親懷孕時曾受到驚嚇的緣故
 - C.此為胎便，通常在出生後3～4天就會被過渡便所取代

- D.此為寶寶吸吮母乳後所排出的奶便
- 73.有關新生兒黃疸成因的敘述，下列何者正確？
- A.新生兒黃疸是因皮下組織中冀膽素原堆積所造成
 - B.黃疸發生的部位通常是由腹部開始，漸漸到頭部和四肢
 - C.增加餵食頻率可以促進直接性水溶性膽紅素排出，以加速黃疸的緩解
 - D.母乳性黃疸是造成核黃疸的最主要成因
- 74.助產人員為新生兒執行排泄評估時，下列敘述何者正確？
- A.新生兒第1次排出的糞便為墨綠色到黑色，具有臭味黏性的物質
 - B.約90%的新生兒會在24小時內排尿，如無排尿，水腫是新生兒未解尿的常見原因
 - C.在新生兒尿布上如有桃色的尿酸結晶，乃為正常的現象
 - D.哺餵母乳的嬰兒，其糞便為黃白色、較成形，其排便狀況比配方奶哺餵規律
- 75.有關正常的新生兒胸圍評估之敘述，下列何者正確？
- A.比頭圍小1~2公分，約31~33公分
 - B.與頭圍相當，約34公分
 - C.比頭圍大1~2公分，約33~35公分
 - D.比頭圍大2公分以上，約35~37公分
- 76.有關巴賓斯基反射（Babinski reflex），下列敘述何者錯誤？
- A.測試方法是手指自新生兒腳跟，沿外側往上朝大拇趾方向刺激足底
 - B.新生兒的正常反應為大拇趾向下翹（向足底），其他四趾呈扇形張開
 - C.此反射不會出現在正常成人
 - D.若是無法引發新生兒此反射，則宜稍候片刻後再次測試
- 77.有關新生兒首次呼吸，使胎兒循環轉變成新生兒循環之機轉，下列敘述何者錯誤？
- A.分娩過程對於胎兒胸部受壓及回彈，造成空氣的吸入
 - B.在出生後數小時後，當左心房壓力大於右心房壓力時，造成卵圓孔永久性關閉
 - C.當第一次呼吸發生時，肺動脈血管擴張，血氧分壓上升，使得動脈導管收縮而關閉
 - D.胎兒出生後，臍帶被夾住時，使得全身系統阻力增加
- 78.有關足月兒出生時肢體評估的敘述，下列何者錯誤？
- A.手指甲穩固、柔軟且已成形
 - B.當腿部伸展時，有很好的回縮能力
 - C.新生兒腿部膝關所形成的角度大於90度
 - D.足底已有抓握反射之表現
- 79.保溫箱使用前應事先溫熱並避免放置在牆邊，其目的是減少新生兒以何種形式喪失體溫？
- A.蒸發
 - B.對流
 - C.傳導
 - D.輻射
- 80.當嬰兒有尿布疹時的護理，下列何者不適當？
- A.勤換尿布
 - B.保持臀部清潔乾燥
 - C.可塗油膏後，以烤燈乾燥
 - D.選用材質柔軟，吸水性佳的尿布