

104年第一次專門職業及技術人員高等考試醫師中醫師考試分階段
考試、中醫師、營養師、心理師、護理師、社會工作師考試試題

代號：5105
頁次：8-1

等 別：高等考試

類 科：中醫師(二)、中醫師

科 目：中醫臨床醫學(二) (包括中醫內科學、中醫婦科學、中醫兒科學)

考試時間：1 小時 30 分

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 1 有關喘證的敘述，下列何者錯誤？
(A)病因常由於外感與內傷所引發呼吸困難，甚至張口抬肩，不能平臥
(B)辨證可分虛實，實喘主治臟腑在肺，虛喘主治臟腑在腎
(C)預防之道，應慎風寒，節飲食，戒菸酒，怡情悅志
(D)一般而言，實喘上氣，身熱不得臥，脈急數者，易治
- 2 85 歲患者有抽菸史合併慢性阻塞性肺病已多年，平日咳痰難出，咳逆喘促，就診近 1 週來被家屬發現其神智恍惚、嗜睡，見其肢體瞶動，舌質暗紅苔白膩，脈滑數。下列證型何者最適宜？
(A)痰熱鬱肺 (B)痰蒙神竅 (C)肝風內動 (D)肺腎陰虛
- 3 承上題，治以下列何方最適宜？
(A)鎮肝熄風湯 (B)定喘湯 (C)滌痰湯 (D)百合固金湯
- 4 吳先生罹患肺炎，若進入高原期，症見高燒、咳喘、痰黃稠、舌紅苔黃膩和脈滑數。試問最常見的證型為何？
(A)風熱犯肺 (B)痰濁壅肺 (C)上盛下虛 (D)痰熱鬱肺
- 5 72 歲廖先生抽菸近 40 年，長期咳嗽，咳吐出腥臭的濁痰，甚至挾有膿血，就診時身倦，面色蒼白，語音乏力，呼吸不暢，喘促，經醫師診脈後發現脈乏力，舌淡嫩。依中醫辨證，下列治則何者最適宜？
(A)清熱化痰，排膿解毒 (B)宣肺化痰，清熱涼血
(C)清熱化痰，寬胸宣肺 (D)大補氣血，托裏排膿
- 6 55 歲陳姓男患者，今晨起床後，出現頭身痠痛，汗出，輕微發熱惡寒，身體倦怠，聲音低微乏力，舌淡苔薄白，脈診浮而無力，治以下列何方最適宜？
(A)參蘇飲 (B)桂枝湯 (C)荊防敗毒散 (D)羌活勝濕湯
- 7 王小姐外感已近 2 個月而未癒，就診時不定時咳嗽，無噎咳，咽痰梗，少痰，語音乏力，口咽乾，納可，二便可，脈濡細，少苔、質嫩，治以下列何方最適宜？
(A)二陳湯 (B)止嗽散 (C)黛蛤散 (D)麥門冬湯
- 8 72 歲男性患者，主訴昨夜呼吸急促，今仍喉中哮鳴聲，症見胸悶，痰清稀、有泡沫，口不渴，畏寒，苔白滑、淡紅舌，脈浮緊。治以下列何方最適宜？
(A)蘇子降氣湯 (B)定喘湯 (C)三子養親湯 (D)小青龍湯
- 9 65 歲男性病患 3 個月前缺血性腦中風右邊半身不遂，目前神倦乏力心悸，氣短而動則益甚，舌色暗淡，脈緩而弱，血壓 102/66 毫米汞柱，心跳 58 次/分。下列證型何者最適宜？
(A)氣虛血瘀 (B)血瘀氣滯 (C)氣陰兩虛 (D)肝腎陰虛

- 10 62 歲男性患者，數月前因高血壓引起缺血性腦中風，偏癱恢復緩慢，行走困難，近日自覺眩暈耳鳴，心煩失眠，健忘，言語蹇澀，舌紅、少苔，脈弦細。下列證型何者最適宜？
(A)風痰阻絡 (B)腎精虧虛 (C)肝火上炎 (D)氣虛血瘀
- 11 承上題，治以下列何方最適宜？
(A)龍膽瀉肝湯 (B)地黃飲子 (C)滌痰湯 (D)補陽還五湯
- 12 60 歲男性患者，主訴胸悶痛近 3 日，斷續發作，動易喘促，心悸汗出，畏寒肢冷，面色蒼白，唇甲淡白，舌淡白嫩，脈沉微，下列證型何者最適宜？
(A)心腎陰虛 (B)氣陰兩虛 (C)心陽虛衰 (D)心血瘀阻
- 13 承上題，治以下列何方最適宜？
(A)左歸飲 (B)生脈散 (C)參附湯 (D)血府逐瘀湯
- 14 42 歲女性胃潰瘍患者，主述胃脘疼痛如針刺，痛有定處，按之痛甚，舌暗，脈澀。治以下列何方最適宜？
(A)柴胡疏肝散 (B)失笑散 (C)香砂六君子湯 (D)金鈴子散
- 15 患者胃痛隱隱，喜溫喜按，空腹痛甚，得食痛減，勞累或受涼後加重，大便溏薄。診其舌淡苔白，脈遲緩，治以下列何方最適宜？
(A)良附丸 (B)平胃散 (C)理中湯 (D)清胃散
- 16 有關嘔吐因外邪犯胃，濁氣上逆所致者，治以下列何方最適宜？
(A)藿香正氣散 (B)香砂六君子湯 (C)麥門冬湯 (D)參苓白朮散
- 17 痞滿的基本病機為下列何者？
(A)中焦氣機不利，脾胃升降失職 (B)食滯腸胃，痞塞不通
(C)外邪內陷，阻塞氣機 (D)肝氣鬱滯，橫逆犯脾
- 18 治療久瀉不止，不宜過用下列何法？
(A)健脾 (B)升提 (C)固澀 (D)分利
- 19 患者大便時瀉時瀉已數年，水穀不化，稍進油膩之物，則大便次數增多，飲食減少，食後脘悶不舒，面色萎黃，肢倦乏力，舌淡苔白，脈細弱，下列治法何者最適宜？
(A)健脾益胃 (B)溫腎健脾 (C)消食導滯 (D)固澀止瀉
- 20 有關黃疸治療之敘述，下列何者錯誤？
(A)熱重於濕者，以茵陳蒿湯為主方 (B)濕重於熱者，以甘露消毒丹為主方
(C)陰黃以茵陳朮附湯為主方 (D)《金匱要略》以硝石礬石散主治女勞疸
- 21 腎病症候群（Nephrotic Syndrome）就中醫的觀點，除與腎有關外，與下列何者的關係最為密切？
(A)肺、肝 (B)心、脾 (C)肺、脾 (D)心、肝
- 22 47 歲張先生，主訴小便有泡沫 8 年，症見神疲乏力，咽痛乾咳，心中煩熱，尿液檢查蛋白質 75 mg/dL，舌紅，苔薄白而乾，脈細。治以下列何方最適宜？
(A)萆薢分清飲 (B)大補陰丸 (C)補中益氣湯 (D)鹿茸補澀丸

- 23 70 歲女性，因敗血性休克合併急性腎衰竭，症見無尿，全身浮腫，有噁心感，面色白，四肢冰冷，舌苔黑，脈沉細欲絕，治以下列何方最適宜？
(A)實脾飲 (B)苓桂朮甘湯 (C)重用附子，配用人參 (D)金匱腎氣丸
- 24 張先生因小便熱赤帶血，尿色鮮紅就診，兼見心煩不寐，口舌生瘡，舌尖紅，脈數。治以下列何方最適宜？
(A)導赤散 (B)龍膽瀉肝湯 (C)八正散 (D)知柏地黃丸
- 25 12 歲女孩就診時症見氣喘，胸悶不舒，咳嗽，痰多色白，噁心嘔吐，胃口不好，口黏，口不渴，舌質淡紅，苔膩，脈滑，下列證型何者最適宜？
(A)風寒犯肺 (B)肺氣虛寒 (C)痰熱壅肺 (D)痰濁阻肺
- 26 18 歲女性，因關節痛 2 天前來求診，望診發現其滿面紅赤，紅斑紅疹，測得體溫 39℃，伴隨有咽乾，口渴喜冷飲，尿赤而少，不惡寒，舌紅苔黃，脈滑數或洪數，母親提到有西醫師認為是一種風濕免疫疾病，下列病名何者最適宜？
(A)類風濕性關節炎 (RA) (B)僵直性脊椎炎 (AS)
(C)乾燥症候群 (SS) (D)系統性紅斑性狼瘡 (SLE)
- 27 退化性關節炎之中醫病名與下列何者最不相關？
(A)歷節 (B)風痺 (C)骨痹 (D)著痹
- 28 25 歲男性患者下背關節疼痛已多年，脊椎 X 光檢查發現患者有「竹竿樣脊椎」(Bamboo spine)，患者肌膚麻木，肢體關節覺得沉重疼痛，遇風或天冷時症狀加劇。診其脈濡緩，舌質淡紅，苔白膩，則下列中西醫診斷何者最適宜？
(A)痛痹，椎間盤突出 (B)痛痹，僵直性脊椎炎
(C)著痹，椎間盤突出 (D)著痹，僵直性脊椎炎
- 29 承上題，治以下列何方最適宜？
(A)烏頭湯 (B)防風湯 (C)薏苡仁湯 (D)白虎桂枝湯
- 30 40 歲原發性甲狀腺機能亢進女性患者，經服用抗甲狀腺藥物效果不明顯。主訴近 3~4 個月壓力大，坐立不安，思慮勞心，心悸不寧。症見面紅，神情緊張，手足心熱，雙手平伸稍抖動，少寐多夢，頭暈目眩，腰痠耳鳴，進食速度快，食量增加體重卻略微下降，月經稍提前，經血量減，色紅稍暗，舌質紅苔薄黃，脈細數。TSH 數值：0.25 mU/L（正常參考值 0.3~5.5 mU/L），T3 數值：220 ng/dL（正常參考值 60~180 ng/dL）。下列證型何者最適宜？
(A)心膽虛怯 (B)心脾兩虛 (C)肝鬱脾虛 (D)陰虛火旺
- 31 28 歲林女甲狀腺腫大，平時即有目突、目脹，近來身倦乏力，語音乏力，胸悶，走路易喘，心悸，口乾燥，多汗，納可，舌質淡紅，脈浮而乏力。治以下列何方最適宜？
(A)生脈飲 (B)白虎湯 (C)柴胡加龍骨牡蠣湯 (D)四海舒鬱丸

- 32 有關「三消」的敘述，下列何者錯誤？
(A)「三消」之名最早出現於北宋《太平聖惠方》
(B)上消之病位在肺，火刑肺燥，出現口渴引飲的症狀
(C)中消病在脾胃，有虛實之分。症見飢而欲食，雖多食卻肌肉消瘦，是胃陰不足，虛火上炎所致
(D)下消之病位在腎，腎水枯竭，症見唇口乾焦，精液自溢，不飲而利
- 33 35 歲邱男糖尿病已 5 年，多食易飢，形體消瘦，大便乾燥，牙齦腫痛，口臭，舌紅苔黃燥，脈滑實有力，治以下列何方最適宜？
(A)麻子仁丸 (B)玉女煎 (C)知柏地黃丸 (D)甘露飲
- 34 50 歲謝男糖尿病多年，最近咳嗽 3 個月，症見氣短，神倦乏力，腰膝痠軟，夢遺，晚上盜汗，半夜咽乾，舌紅苔少，脈細數，治以下列何方最適宜？
(A)生脈飲 (B)清燥救肺湯 (C)百合固金湯 (D)六味地黃丸
- 35 45 歲罹患痛風之男性，昨晚喝啤酒後引發右足第一趾關節疼痛急性發作。來診自述擔任單位主管，近期工作壓力大，須經常應酬，飲食過度，熬夜晚睡。症見面紅，右足第一趾關節灼熱紅腫疼痛，發熱，口渴喜冷飲，色質紅，舌苔黃燥，脈滑數。下列診斷何者最適宜？
(A)痛痹 (B)熱痹 (C)著痹 (D)行痹
- 36 患者的主要病灶如圖，則下列診斷何者最可能？



- (A)癰疽 (B)癭腫 (C)梅核氣 (D)噎膈
- 37 59 歲吳先生早上工作時，感覺右半側肢體無力，說話較不清楚，經送急診室檢查，Babinski's Sign (+)，腦部 CT 顯示左側基底核梗塞性中風，立即施打血栓溶解劑 (t-PA)，轉入加護病房觀察，並於隔日照會中醫共同治療，患者臉色偏紅，舌紅苔白黃，脈弦數，口乾，大便 3 日未解，此時下列處方何者最不適宜？
(A)補陽還五湯 (B)調胃承氣湯 (C)天麻鉤藤飲 (D)黃連溫膽湯
- 38 中風恢復期，屬風痰阻絡證者，治以下列何方最適宜？
(A)天麻鉤藤飲 (B)解語丹 (C)菖蒲鬱金湯 (D)鎮肝熄風湯
- 39 有關頭痛病因病機，下列何者最少見？
(A)瘀血阻絡 (B)風邪客於巔頂 (C)臟腑功能失調 (D)嗜食菸酒厚味
- 40 某 28 歲女性患者容易頭痛已 2 年，主訴頭痛頭重如戴帽一般，身體重沉易浮腫，納呆胃悶，略有白帶，舌大苔白膩，脈濡。治以下列何方最適宜？
(A)川芎茶調散 (B)桑菊飲 (C)羌活勝濕湯 (D)通竅活血湯

- 41 31 歲女性患者近 1 個月來常感頭右邊顳側及頸枕部疼痛，往往騎乘機車後會誘發，頭戴帽子讓她覺得比較舒服，平時不易口渴，脈浮、苔薄白。治以下列何方最適宜？
(A)川芎茶調散 (B)桑菊飲 (C)通竅活血湯 (D)天麻鉤藤飲
- 42 62 歲男性，小腹腹肌疼痛，按壓明顯，裏急後重、肛門灼熱，瀉下膿血，赤多白少，渴欲飲水，舌紅苔黃，脈弦滑數。CEA：25 ng/mL，大腸鏡檢於降結腸處發現有腫瘤及潰瘍面，病理切片報告為 adenocarcinoma。治以下列何方最適宜？
(A)白頭翁湯 (B)五淋散 (C)犀角地黃湯 (D)防風通聖散
- 43 有關《難經》五十六難，論五臟積，下列敘述何者錯誤？
(A)心之積為伏梁 (B)肺之積為息賁 (C)脾之積為肥氣 (D)腎之積為奔豚
- 44 頭頸部腫瘤病患，經放射治療後易出現口腔乾燥症（xerostomia），臨床症狀出現口乾渴，頻渴頻飲，飲少尿多，飲水即消。舌質紅，舌苔少，脈沉細數。下列證型何者最適宜？
(A)肺燥傷津 (B)熱入營血 (C)陽明熱盛 (D)濕熱鬱結
- 45 55 歲鐘女士經檢查發現肝腫瘤，多次栓塞治療後，身體體重減輕，腹悶脹脇肋隱痛，稍多一些操勞即疲倦，心中煩擾失眠，頭暈，目眩，口乾，舌質暗紅、少苔，脈弦細而數。下列治則何者最適宜？
(A)滋陰養血，補虛益精，以辛溫之品為主 (B)滋陰柔肝，疏肝理氣，以辛平之品為主
(C)滋陰清熱，活血化瘀，以辛燥之品為主 (D)清熱利濕，疏肝和胃，以辛寒之品為主
- 46 46 歲女性鼻咽癌患者，放射線治療後，就診時見頭暈目眩，耳鳴耳聾，視物不清，聲音嘶啞，腰膝痠軟，潮熱盜汗等症。診其舌質紅，少苔，脈細數無力，治以下列何方最適宜？
(A)加味逍遙散 (B)瀉白散 (C)龍膽瀉肝湯 (D)麥味地黃丸
- 47 腫瘤的舌診研究，癌症患者舌象之變化，舌尖微循環異常率以下列何者最嚴重？
(A)紅絳舌 (B)青紫舌 (C)鏡面舌 (D)淡白舌
- 48 有關癌症病情之敘述，下列何者最適宜使用清熱解毒法治療？
(A)癌瘤局部紅腫熱痛 (B)痰凝聚結所形成之腫塊
(C)氣滯血瘀所形成之腫塊 (D)腫塊結聚而痛
- 49 有關婦女月經生理疾病，最主要是根據那些理論作為指導方向？①臟腑 ②經絡 ③氣血 ④津液
(A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④
- 50 根據《醫宗金鑑·婦科心法要訣》，血少淺淡月經先期之病因，下列何者最適宜？
(A)實熱 (B)虛熱 (C)內寒 (D)氣虛
- 51 36 歲女性，曾因為子宮內膜息肉導致經血過多伴隨嚴重貧血，經過子宮鏡手術切除子宮內膜息肉後月經量正常。經淨後小腹綿綿作痛，經水色淡質清，舌淡苔薄白，脈虛細。有關此病患的證候分析以下列何者最適宜？
(A)寒濕阻滯 (B)氣血虛弱 (C)氣滯血瘀 (D)脾氣虛弱
- 52 承上題，治療此病患的處方，以下列何者最適宜？
(A)《傳青主女科》順經湯 (B)《傳青主女科》完帶湯
(C)《醫林改錯》血府逐瘀湯 (D)《正體類要》八珍湯

- 53 某 35 歲女性主訴經來身熱面赤，便秘，溲黃，口乾喜飲，脈滑數，唇紅舌赤。治以下列何方最適宜？
(A)逍遙散 (B)一貫煎 (C)清經散 (D)普濟消毒飲
- 54 月經 4~5 個月不行，精神抑鬱，煩躁易怒，少腹脹痛拒按，脈沉弦，舌邊紫有瘀點，下列敘述何者正確？
(A)氣滯血瘀型月經後期 (B)肝氣鬱滯型閉經 (C)肝鬱化熱型停經 (D)瘀熱鬱滯型轉胞
- 55 下列敘述，何者最易導致氣虛崩漏？
(A)產多乳眾 (B)產後胞宮殘物瀦留未清
(C)墮胎、小產後，感受風熱 (D)熬夜傷肝，耗損陰液，血失所養
- 56 腎虛不孕中偏陽虛者之臨床表現，下列何者最正確？①婚久不孕，月經後期，量少色淡 ②面色晦暗 ③帶多黏稠 ④腰痠腿軟，小便清長
(A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④
- 57 蔡小姐最近為陰部脹痛灼熱而難過，婦科及尿液檢查都沒有發現問題，有時陰痛還會牽及少腹，心情不暢或有憂傷時，痛的更厲害，還常覺胸悶煩躁，睡不好，胃口不好。望其舌質偏紅，苔色黃白，診其脈細弦。治以下列何方最適宜？
(A)《醫宗金鑑》龍膽瀉肝湯 (B)《症因脈治》知柏地黃湯
(C)《內科摘要》丹梔逍遙散 (D)《壽安保元》菖蒲散
- 58 30 歲女性懷孕之後，噁心嘔吐不食，覺得口淡與嘔吐清涎，整天身倦想睡，舌淡，脈緩滑無力，下列敘述何者最適宜？
(A)病機為肝氣鬱結，失於疏泄，肝脈夾胃貫膈，肝氣上逆犯胃
(B)宜竹茹和胃理氣，黃連苦寒降胃氣
(C)宜《名醫方論》香砂六君子湯，以健脾和胃，降逆止嘔
(D)當病情嚴重且尿液檢查出現酮體陽性反應時，應重用清熱解毒藥物
- 59 病患懷孕 10 週時發生胎漏下血，色鮮紅，心煩不安，手心煩熱，口乾咽燥，或有潮熱，小便黃與大便秘結，舌紅苔黃乾，脈滑數，治以下列何方最適宜？
(A)《景岳全書》胎元飲去當歸，加黃耆、阿膠
(B)《醫學衷中參西錄》壽胎丸加黨參、白朮
(C)《景岳全書》保陰煎加苧麻根
(D)《蘭室秘藏》聖愈湯加菟絲子、桑寄生、續斷
- 60 兒枕痛所指之疾病，下列何者最適宜？
(A)妊娠腹痛 (B)產後頭痛 (C)產後小便癰閉不通 (D)產後腹痛
- 61 患者懷孕 7 個月，患小便頻數量少，小腹脹急疼痛而坐臥不安。問診發現病患短氣不喜多言，常覺疲倦，頭重眩暈，大便不爽。望其舌苔薄白質淡，脈虛緩而滑。治以下列何方最適宜？
(A)生地、木通、甘草梢、淡竹葉、玄參、麥冬
(B)桂枝、茯苓、桔梗、炙升麻、烏藥、通草、黨參、白朮、扁豆
(C)生地、山茱萸、山藥、澤瀉、茯苓、桂枝、巴戟天、菟絲子
(D)當歸、白芍、生地、車前子、木通、滑石、澤瀉、甘草梢、黃芩、黑梔子、赤茯苓

- 62 30 歲女性患者產後乳汁分泌量少，乳房脹痛，食慾不振，舌淡紅，苔薄白，脈弦。治以下列何法通絡下乳最適宜？
(A)柔肝養血 (B)活血化瘀 (C)軟堅散結 (D)疏肝解鬱
- 63 下列何者是《證治準繩》先期湯的組成？
(A)丹皮、地骨皮、熟地、青蒿、茯苓、黃柏、阿膠
(B)當歸、黃耆、生地、熟地、黃連、黃芩、黃柏、艾葉
(C)地骨皮、生地、川芎、當歸、阿膠、白朮、丹參、香附、黃連
(D)當歸、黃柏、生地、香附、黃連、艾葉、白芍、知母、川芎、阿膠、黃芩、炙甘草
- 64 根據《金匱要略》，溫經湯的組成除了當歸、芍藥、川芎、生薑、甘草等藥，還包括下列何者？
(A)丹皮、人參、莢朮、肉桂、牛膝
(B)丹參、山茱萸、天冬、莢朮、肉桂、牛膝
(C)丹皮、麥冬、阿膠、吳茱萸、半夏、桂枝、人參
(D)阿膠、半夏、桂枝、丹參、熟地、吳茱萸、麥冬、人參
- 65 所謂「純陽之體」，在說明小兒生理的體質為下列何者？
(A)盛陽 (B)有陽無陰
(C)生機蓬勃，發育迅速 (D)臟腑嬌嫩，形氣未充
- 66 有關小兒感冒的辨證論治，下列何者正確？①治療原則以解表為主 ②兼以補氣為通治之法 ③風熱感冒的治法為辛涼解表 ④暑邪感冒的治法為清暑解表
(A)①②③ (B)①②④ (C)②③④ (D)①③④
- 67 8 歲兒童因肺炎喘嗽住院會診中醫，體溫在 38.5~39.5°C 之間已有 5 天，白血球 15000/ μ L，CRP55 mg/L，聽診發現囉音，咳嗽呼吸急促，胸口悶痛，呼吸時略有鼻翼煽動，面赤唇乾，痰色黃而黏稠，舌質紅苔黃厚，脈弦滑。此病人屬於下列何種證型？
(A)風寒閉肺 (B)風熱閉肺 (C)痰熱閉肺 (D)心陽虛衰
- 68 根據《醫宗金鑑·幼科雜病心法要訣》，「過食腸胃滿，濁液外溢被寒凝，潮熱飲冷肌削瘦，腹滿硬塊面黃青」，係敘述下列何種病症？
(A)癖疾 (B)食滯 (C)食痛 (D)丁奚疳
- 69 某 5 歲男童於六月中旬開始出現發熱持續不退，熱勢午後升高，口渴欲飲，皮膚乾燥，無汗，小便頻數清長，口唇乾燥，舌質紅，苔薄黃，脈數等症狀，下列診斷何者最適宜？
(A)夏季熱 (B)疳夏 (C)暑溫 (D)暑厥
- 70 5 歲男童於臺灣八月炎熱季節至中醫兒科就診，症見壯熱多汗，頭痛項強，噁心嘔吐，煩躁昏睡，四肢抽掣，驚厥不已，舌苔黃膩，脈象洪數，治以下列何方最適宜？
(A)清瘟敗毒飲 (B)牛黃丸 (C)黃連解毒湯 (D)玉樞丹合保和丸
- 71 馬小妹 9 歲，因目窠及足脛腫來中醫求診，經媽媽描述，2 天前喉嚨痛，鼻塞，流鼻水，頭痛，嘔吐，尿量減少且出現血尿等症狀，經檢查尿蛋白+++。下列相關敘述，何者正確？①可懷疑是小兒急性腎小球腎炎（Acute glomerulonephritis） ②此屬中醫陽水 ③病屬血淋 ④方用麻黃連翹赤小豆湯
(A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④

- 72 有關丹痧的敘述，下列何者正確？①本病春夏季為多見，2~8 歲兒童發病率較高 ②又稱爛喉痧 ③丹痧一般較輕微，預後良好，恢復較快 ④丹痧病初邪在表，時間較短，宜辛涼宣透，使邪從汗泄
(A)①② (B)③④ (C)①③ (D)②④
- 73 有關發頤與疳腮的敘述，下列何者正確？①疳腮具有傳染性，發頤不具有傳染性 ②發頤多以單側發病，邊緣不清，有彈性，局部紅腫較不明顯 ③疳腮若邪毒傳入厥陰脈絡，移於肝經，可導致少腹疼痛或睪丸腫痛
(A)僅①② (B)僅①③ (C)僅②③ (D)①②③
- 74 根據《醫宗金鑑·幼科雜病心法要訣》，小兒衄血屬熱盛者，治以下列何方最適宜？
(A)皂刺大黃湯 (B)四物三黃瀉心湯 (C)平胃地榆湯 (D)牛膝四物湯
- 75 氣喘緩解期，其臨床症狀呈現咳嗽痰多，食少脘痞，面黃欠華，大便不實，肌肉消瘦，倦怠乏力，苔少色淡，脈緩無力，治以下列何方最適宜？
(A)六君子湯 (B)理中湯 (C)保和丸 (D)二陳湯
- 76 根據《醫宗金鑑·幼科雜病心法要訣》，瀉證門「驚瀉因驚成泄瀉，夜臥不安晝惕驚，糞稠若膠帶青色」，治以下列何方最適宜？
(A)先以琥珀抱龍丸定其驚，次以養脾丸理其脾
(B)先以琥珀抱龍丸定其驚，次以參苓白朮散理其脾
(C)先以益脾鎮驚散定其驚，次以養脾丸理其脾
(D)先以益脾鎮驚散定其驚，次以參苓白朮散理其脾
- 77 下列何者不是「五軟」常見的病因病理？
(A)跌仆產傷，心脈瘀阻 (B)乳育不當，久病失養
(C)胎墮未成，耗傷真氣 (D)源自父母，精血不足
- 78 根據《醫宗金鑑·幼科雜病心法要訣》，有關小兒頭痛的敘述，下列選項何者正確？①在表者，外感風寒也 ②在裏者，內熱薰蒸也 ③在表者，宜加味茶調散 ④在裏者，宜防風通聖散
(A)①② (B)①③ (C)②③ (D)③④
- 79 咖啡牛奶斑 (Café-au-laits' spots) 是下列何種疾病的特徵？
(A)結節硬化症 (Tuberous sclerosis)
(B)史特-偉柏症候群 (Sturge-Weber syndrome)
(C)第一型神經纖維瘤 (Neurofibromatosis type 1)
(D)第二型神經纖維瘤 (Neurofibromatosis type 2)
- 80 腦膜炎 (meningitis) 病童作身體理學檢查，當醫師彎曲病童的頸部，無法彎曲且有疼痛感，此現象為下列何者？
(A)巴羅氏徵象 (Barlow's sign) (B)柯林氏徵象 (Kernig's sign)
(C)布魯辛斯基氏徵象 (Brudzinski's sign) (D)麥氏徵象 (McBurney's sign)