

104年第一次專門職業及技術人員高等考試醫師中醫師考試分階段
考試、中醫師、營養師、心理師、護理師、社會工作師考試試題

代號：6105
頁次：8-1

等 別：高等考試

類 科：中醫師(二)、中醫師

科 目：中醫臨床醫學(三) (包括中醫外科學、中醫傷科學、中醫五官科學)

考試時間：1 小時 30 分

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 1 黃耆為瘡家之聖藥，外瘍患者屬上熱甚者，宜下列何者？
(A)炙用 (B)鹽水炒 (C)生用 (D)慎用
- 2 有關中醫外科的辨證之法，下列敘述何者正確？
(A)來勢緩慢、結腫有核、按之不痛、皮色如常、久不釀膿者為痰
(B)諸癰屬實，諸痛屬虛
(C)熾熱疼痛而發於皮膚之間，腫高如弓，根聚有盤者，屬虛
(D)辨證以虛實為首要。虛者屬臟，重而難治；實者屬腑，輕而易治
- 3 症見身腫而皮肉重垂脹急，深按之如棉不起，淺則光亮如水疱，破則滲水，最可能的診斷為何？
(A)痰腫 (B)濕腫 (C)氣腫 (D)風腫
- 4 下列何者生於下唇之唇稜下陷中？
(A)鎖口疔 (B)反唇疔 (C)承漿疔 (D)龍泉疔
- 5 某女性患者 34 歲，反覆發作上下嘴唇皸裂脫皮、滲液糜爛 3 年，現代醫學診斷為剝脫性唇炎，中西醫多方診治乏效，常呈破裂流水，吃飯喝水疼痛異常，唇部灼痛如燎，其相關證治下列何者錯誤？
(A)俱以防風通聖散服之 (B)外以黃連膏抹之
(C)外以紫歸油抹之 (D)因血燥而成者，宜服四物消風散
- 6 期門穴處隱隱疼痛而微腫、手不可按、呼吸不利、轉側不能、側臥則驚、便溺艱難，此敘述為下列何症？
(A)大小腸癰 (B)腎癰 (C)胃癰 (D)肝癰
- 7 有關癰的證治，下列相關敘述何者錯誤？
(A)癰是一種生於皮肉之間的急性化膿性疾患 (B)癰的臨床特徵是初起結腫疼痛，按之有塊
(C)治癰之大法，忌用消散法 (D)癰成膿之後，宜切開排膿
- 8 百會疽別名玉頂疽，下列相關敘述何者錯誤？
(A)初起頭白堅硬，唇燥便秘煩悶，宜服黃連消毒飲
(B)若面赤過煩，口乾不渴唇潤者，最宜服十全大補湯
(C)若漫腫平塌，紫暗堅硬，宜外敷回陽玉龍膏
(D)若陽虛浮泛，用生附子餅，置兩足心湧泉穴，以洩其毒
- 9 有關上中下發背之敘述，下列何者錯誤？
(A)生於背部，俱屬督脈經
(B)可分為陰毒、陽毒兩種
(C)陽毒為病者，皆由氣血衰弱，或患消渴，或兼瘴嵐之邪久積臟腑而發
(D)用藥之法，有表證者可以荊防敗毒散解之
- 10 患者頭皮皮紅光亮，癢如蟲行，並見毛髮乾焦，成片脫落，下列方劑何者治療最適宜？
(A)神功散 (B)神授衛生湯 (C)神應養真丹 (D)神效栝蒌散

- 11 白屑風最宜服用下列何方治療？
(A)萬靈丹 (B)神應養真丹 (C)荊防敗毒散 (D)祛風換肌丸
- 12 患者病膝蓋下骨空陷中隱隱作疼，患處略見胖腫而屈伸不利。下列治療方法何者最不適宜？
(A)服萬靈丹 (B)服獨活寄生湯 (C)以金黃散圍敷 (D)兼用火鍼鍼膝眼穴
- 13 小華的媽媽某日因整天忙碌，忘記幫小華換尿片，等到晚上解開尿片時，才發現小華的前後二陰附近皮膚整片通紅如圖所示。下列相關敘述何者錯誤？




- (A)初起者，不宜以苦參湯洗之，以免過度刺激 (B)洗後若皮損而痛者，宜以「鵝黃散」撲之
(C)內服可以「消風散」加減調治 (D)治則總以清熱利濕為主
- 14 有關中醫外科使用內治法的敘述，下列何者錯誤？
(A)皂角刺銳利托透，有釀膿速潰的能力，可早投在治療漫腫無頭的外科疾病
(B)傷口潰後不寐發熱，為虛火上炎，宜清養安神
(C)傷口潰後，自汗肢厥，宜用四逆治療
(D)傷口潰後新肉不生如凍色，為肉冷肌寒，宜倍用溫熱藥施治
- 15 一名患者，上背部出現一大小如豆粒，界限明顯，形圓質軟，可以推動，其內容物像豆腐渣樣物質具有臭味，最可能的診斷為下列何項？
(A)肉瘤 (B)氣瘤 (C)血瘤 (D)脂瘤
- 16 濁病者，溺竅時流穢物、如瘡之膿、如目之眵、淋漓不斷、濁色發赤，最可能的診斷為下列何項？
(A)赤濁 (B)白濁 (C)氣淋 (D)石淋
- 17 勞傷肺氣，腠理不密，外邪所搏而壅腫者，其自皮膚腫起，按之浮軟，最可能的診斷為下列何項？
(A)血瘤 (B)筋瘤 (C)氣瘤 (D)癭瘤
- 18 下列何者不屬於丹毒？
(A)赤遊丹毒 (B)抱頭火丹 (C)流火 (D)火赤瘡
- 19 32 歲男性，數日來皮膚發癢，鮮紅膨起成片（如附圖，左臂），夜間尤甚，白日則皮膚無症狀，下列那一種疾病診斷最不適宜？



- (A)癰疹 (B)鬼飯疙瘡 (C)風疹塊 (D)火赤瘡

- 20 一名 40 歲婦女，已婚有兩名小孩，平日上班工作壓力大，下班又需為家務繁忙，臉上出現病灶色如塵垢，形枯不澤，大小不一，小者如粟粒赤豆，大者似蓮子芡實，與皮膚相平。其最可能的診斷為下列何者？
(A)黧黑斑 (B)雀斑 (C)粉刺 (D)紫白癜風
- 21 下列何者損傷可出現 **drop-arm test** 陽性反應？
(A)肩袖撕裂傷 (B)胸廓出口症候群 (C)橈神經損傷 (D)網球肘
- 22 有關上肢 **Speed's test** 的敘述，下列何者錯誤？
(A)手肘先伸直，再進行之後動作 (B)檢查時，二頭肌用力收縮
(C)二頭肌長頭肌腱發炎時，可做此檢查鑑別 (D)又名 **Yergason's test**
- 23 《素問·宣明五氣篇》提到「五勞所傷」，其中「久坐」會導致下列何種組織傷害？
(A)筋 (B)肉 (C)皮 (D)骨
- 24 根據《正骨心法要旨》肘骨之敘述，下列何者錯誤？
(A)跌傷矯正後，雖能垂能舉，仍以養息為妙
(B)俗名鵝鼻骨
(C)跌傷時，肘尖向上突出，疼痛不止，汗出顫慄，柴胡桂枝湯解之
(D)跌傷時，斜彎之筋，以手推摩，令其平復
- 25 有關肱骨外上髁炎之敘述，下列何者錯誤？
(A)常見於網球球員，故又稱之為網球肘 (B)主要是由勞損造成的無菌性炎症
(C)前臂屈肌腱的反覆牽拉為致病主因 (D)抗阻力伸腕時疼痛明顯
- 26 53 歲男性患者，主訴左肩痠痛，夜間較明顯，左肩上舉背伸不利，晨起肩關節活動僵硬，則下列相關敘述何者正確？①係年老體弱，筋肉肌腱失於濡養所致 ②創傷、風寒濕邪侵襲常為誘因 ③初期出現肌肉僵硬、條索狀硬結等病變 ④好發於單側，雙側少見 ⑤因小圓肌損傷，致肩內旋不利
(A)②③④ (B)①④⑤ (C)①②④ (D)②③⑤
- 27 有關掌指關節扭挫傷之治療，下列敘述何者錯誤？
(A)傷後手法治療切忌過度，以免組織增生肥厚 (B)關節淺表之軟組織微細纖維條索可以輕推撫平
(C)有側彎畸形者要注意糾正，及早恢復關節功能 (D)應避免功能鍛鍊，以免加重疼痛腫脹
- 28 有關膝關節半月板之敘述，下列何者正確？
(A)半月板是一種纖維軟骨組織，本身血液循環極差，只有邊緣循環較好
(B)內側半月板較大呈「C」形如鐮刀狀，前 2/3 寬，後 1/3 窄，體部與內側副韌帶相連
(C)外側半月板較厚呈「O」形，前後等寬，外緣與外側副韌帶相連
(D)半月板內緣厚外緣薄，具有加深關節，增加穩定性和接觸面的作用
- 29 有關腰部扭挫傷的敘述，下列何者錯誤？
(A)腰部扭挫傷可分為扭傷與挫傷兩大類，扭傷較多見，一般均為突然遭受間接暴力所致
(B)扭傷多發生於腰骶、骶髂關節、椎間關節或兩側骶棘肌等部分
(C)腰部扭傷時，直腿抬高加強試驗常為陽性
(D)腰部挫傷多為直接暴力所致，如車輛撞擊，高處墜跌，重物挫壓等，致使肌肉挫傷，血脈破損，筋膜損傷，引起瘀血腫脹、疼痛、活動受限
- 30 20 歲男性患者，某日下午打籃球時遭球撞擊手指，右手食指近端指間關節疼痛腫脹，下列處置何者最不適當？
(A)檢查關節活動功能 (B)X 光檢查 (C)熱敷 (D)固定制動

- 31 2 歲兒童剛學會走路，大人牽東他往西走，突然肘關節半屈曲疼痛不願接受觸診，哭鬧不停，檢查無腫脹現象。下列診斷及治療有那些最適宜？①照 X 光檢查是否骨折 ②麻醉後進行復位手法 ③右手握其腕上部，並慢慢將其前臂旋後 ④通常不用藥物外敷其患部緩解疼痛
(A)①③ (B)②③ (C)②④ (D)③④
- 32 有關腰部正常活動角度，下列敘述何者錯誤？
(A)前屈 90 度 (B)後伸 30 度 (C)側屈 40~50 度 (D)旋轉 30 度
- 33 兩踝間有以下三條肌腱及一條血管通過：①伸拇長肌 (Extensor hallucis longus m.) ②伸趾長肌 (Extensor digitorum longus m.) ③脛骨前肌 (Tibialis anterior m.) ④足背動脈 (Dorsalis pedis a.)，其排列順序由內而外，下列何者正確？
(A)①②③④ (B)①③②④ (C)③①④② (D)③④①②
- 34 根據《醫宗金鑑·正骨心法》，黃同學跑步造成傷損之證，因榮衛氣滯而引起肌肉作痛之證，下列何方治療最適宜？
(A)復元活血湯 (B)復元通氣散 (C)桂枝湯 (D)葛根湯
- 35 22 歲陳同學，在足球比賽中，遭對方球員從右側外方快速衝撞過來，形成右膝外翻應力損傷 (valgus stress)，下列何處損傷最為嚴重？
(A)外側副韌帶 (B)內側副韌帶 (C)髌韌帶 (D)股四頭肌
- 36 根據《醫宗金鑑·正骨心法》，瘀血作痛，脹而重墜，色或青黑，甚則發熱作渴汗出者，宜先刺去惡血，後用下列何方調之最適宜？
(A)四物湯 (B)四君子湯 (C)失笑散 (D)復元通氣散
- 37 有關肩關節附近解剖構造標定，下列敘述何者正確？



- (A)1—肱二頭肌長頭腱，2—棘上肌，4—鎖骨，5—喙突
(B)1—肱二頭肌長頭腱，2—斜方肌，4—鎖骨，5—喙突，6—肩胛下肌
(C)3—肩峰，4—肋骨，5—鎖骨，6—肩胛下肌
(D)1—肱二頭肌長頭腱，4—鎖骨，5—肩關節盂，6—胸大肌
- 38 外踝三條韌帶①前距腓韌帶 (Anterior Talofibular lig.) ②後距腓韌帶 (Posterior Talofibular lig.) ③跟腓韌帶 (Calcaneofibular lig.)，扭傷發生率由高到低順序，下列何者正確？
(A)①②③ (B)①③② (C)②③① (D)③①②
- 39 有關脛骨結節骨骺炎之敘述，下列何者錯誤？
(A)又名奧斯古德氏病 (Osgood's disease)
(B)由於股四頭肌及髌韌帶長期、反覆、猛烈的收縮所致
(C)脛骨結節部分疼痛、腫大和壓痛，有明顯功能障礙
(D)慢性損傷，以致骨骺缺血壞死而引起

- 40 有關上肢損傷，下列敘述何者正確？
(A)長期抱持重物，造成拇指屈曲，餘四指握持拇指，手腕向尺側偏，鼻煙盒處局部壓痛，應為尺側屈腕肌損傷
(B)掌壓伏地挺身運動後，造成上臂軟組織損傷，肩前局部疼痛，屈肘抗阻時肩疼痛，上臂僅內收動作時疼痛，應為肱三頭肌損傷
(C)車禍碰撞，造成上臂骨折損傷，手腕無法作背伸動作，呈現下垂外觀，可能是肱骨骨折合併橈神經損傷
(D)腕力比賽後，造成上臂軟組織損傷，形成 Popeye's sign，多是肱二頭肌的短頭斷裂損傷
- 41 有關痿軟麻木一證之敘述，下列選項何者正確？①痿軟是指筋骨痿廢失用，肌肉消瘦無力，運動功能障礙 ②麻木是指肢體觸覺、痛覺、溫覺障礙 ③《雜病源流犀燭·麻木源流》指出：「麻木，風虛病亦兼寒濕痰血病也」 ④《素問·逆調論篇》說：「衛氣虛則不仁，榮氣虛則不用，榮衛俱虛則不仁且不用，肉如故也」 ⑤《景岳全書·非風》則說：「氣虛則木，血虛則麻」
(A)僅①②③ (B)僅①②④⑤ (C)僅④⑤ (D)①②③④⑤
- 42 50 歲男性司機，因車禍送到醫院，出現一時性的暈厥、昏迷不省人事、煩躁妄動等症狀，其損傷病機最可能為下列何者？
(A)氣滯 (B)氣閉 (C)氣脫 (D)氣虛
- 43 曹先生車禍受傷後，而犯勞碌，或怒氣肚腹脹悶，或過服寒涼等藥，致傷陽絡，根據《醫宗金鑑·正骨心法》，最可能有那些病候？①血塊 ②衄血 ③血積 ④便血 ⑤尿血 ⑥肌肉青黑
(A)①③⑤ (B)①③⑥ (C)②④⑤ (D)②④⑥
- 44 根據《醫宗金鑑·正骨心法》，傷損至重，昏愢，不知人事，宜急用下列何方急救？
(A)復元通氣散 (B)獨參湯 (C)正骨紫金丹 (D)聖愈湯
- 45 患者受傷當時曾大量出血，挫傷後開始抱怨眩暈，同時，有腹脹滿嘔吐情形，根據《醫宗金鑑·正骨心法》，處以下列何方最適宜？
(A)柴胡四物湯 (B)六君子湯 (C)補中益氣湯 (D)二陳湯
- 46 一車禍碰撞致胸脇挫傷脹痛患者，X 光無骨折血胸情形，患者大便順暢，喘咳有痰，根據《醫宗金鑑·正骨心法》宜處以下列何藥物組成的方劑？
(A)柴胡、黃芩、半夏、人參、甘草、薑、青皮、山梔
(B)人參、白朮、茯苓、炙甘草、當歸、川芎、丹皮
(C)陳皮、半夏、茯苓、甘草、白朮、川芎、當歸
(D)川芎、當歸、百合、赤芍、生地黃、側柏葉、丹皮
- 47 根據《醫宗金鑑·正骨心法》，傷損腹痛，下列治法何者最適宜？
(A)既下而發熱用四君子湯加參朮 (B)既下而惡寒，陽氣傷，用參附湯
(C)既下而惡寒發熱，氣血傷，用十全大補湯 (D)下而泄瀉，脾腎傷，六君子湯加肉果、補骨脂
- 48 王小姐車禍後傷損大出血，身發熱，汗出不止，見血脫之象，根據《醫宗金鑑·正骨心法》之內傷診治，下列何方治療最適宜？
(A)獨參湯 (B)當歸補血湯 (C)聖愈湯 (D)四君子湯加炮薑附子
- 49 有關副甲狀腺亢進症對骨關節的影響，下列敘述何者錯誤？
(A)所謂囊腫性纖維性骨炎，即表明造骨細胞的活性增強，骨吸收並沉積了大量的纖維組織於骨髓中
(B)副甲狀腺亢進症，雖然在骨質的變化比較顯著，但多數患者均表現為骨關節疾病
(C)副甲狀腺亢進性骨軟化症對關節的影響主要是軟骨軟化、軟骨塌陷，小樑骨骨折，而這些狀況大多隨外傷而來，故有併發關節積液、關節疼痛
(D)副甲狀腺亢進引起之高鈣血症，可引起軟組織的轉移性鈣化，如在滑膜、椎間盤、肌腱、腱鞘等關節周圍軟組織均可鈣化

- 50 有關肋骨骨折之敘述，下列何者正確？
(A)單純單處肋骨骨折時，易發生反常呼吸
(B)單純單處肋骨骨折時，有肋間肌和其他肋骨之支持，較穩定，多無明顯移位，一般無須手法整復
(C)使用膠布固定法時，於病患吸氣胸圍最大時固定之
(D)使用寬繃帶固定法時，於病患吸氣胸圍最大時固定之
- 51 某 17 歲高中男生因打球跌倒，用手撐地後手腕劇痛，隨即形成如圖所示「餐叉樣」變形（silver fork deformity），為下列何處骨折？



- (A)纏骨 (B)臂骨 (C)橈骨 (D)桡骨
- 52 《左傳》已有「三折肱知為良醫」的記載，此骨折最易造成下列那條神經損傷？
(A)尺神經 (B)正中神經 (C)橈神經 (D)肱神經
- 53 有關骨折內服用藥之敘述，下列共有幾項正確？①骨折初期治宜活血化瘀、消腫止痛，可選用復元活血湯 ②骨折中期治宜接骨續筋，可選用桃紅四物湯加骨碎補、續斷 ③骨折後期治宜壯筋骨、養氣血、補肝腎，可選用六味地黃湯、健步虎潛丸 ④骨折後期尚應適當注意補益脾胃，可用補中益氣湯加減
(A)1 (B)2 (C)3 (D)4
- 54 有關脛骨雙髌（髌間）骨折之敘述，下列何者正確？
(A)骨折常形成倒「T」形或「Y」形骨折，甚至可侵犯膝關節面，與股骨髌間接近
(B)骨折若侵犯膝關節，一般不會關節內積血，故「浮腫」現象不顯著
(C)復位手法常使用折頂手法
(D)若骨折侵犯膝關節，因為膝關節功能代償良好，治療時不要求解剖復位
- 55 造成膝關節後脫位的暴力方向和作用點敘述，下列何者正確？
(A)前方，股骨下段 (B)前方，脛骨上端 (C)後方，股骨下段 (D)後方，脛骨上端
- 56 手指槌狀指畸形（mallet finger）造成的原因為下列何者？
(A)末節指骨基底部背側撕脫骨折 (B)近節指骨骨折
(C)中節指骨骨折 (D)末節指骨幹骨折
- 57 髌關節脫位，根據股骨頭脫出於髌臼的位置分類，髌關節後上方脫位時，股骨頭位在下列何處？
(A)腸骨部 (B)坐骨結節部 (C)恥骨部 (D)閉孔部
- 58 肱骨幹骨折如有分離移位，下列敘述何者錯誤？
(A)整復時，應在拔伸牽引後進行提按
(B)矯正側方移位後，用合骨法使兩骨折端緊密接合
(C)手法操作要溫和，避免損傷橈神經
(D)固定包紮後，應經常注意患肢末梢血液循環，防止壓瘡
- 59 有關適用於骨痂改造期的內服藥物，下列敘述何者正確？
(A)以理氣止痛為主 (B)以活血祛瘀為主
(C)以接骨續筋為主，以活血祛瘀為佐 (D)以補肝腎、養氣血、壯筋骨為主

- 60 一車禍患者罹患腦震盪及鎖骨中端、肱骨幹中下三分之一交接及橈骨遠端等三處骨折，手術內固定後發現有「垂腕」現象，最可能造成此神經損傷現象之原因為下列何者？
(A)腦震盪 (B)鎖骨中端骨折
(C)肱骨幹中下三分之一交接處骨折 (D)橈骨遠端骨折
- 61 目得血的濡養才能視萬物，關於血的功能失常所引起眼病之敘述，下列何者錯誤？
(A)一般實火所致出血較急，量多色鮮紅
(B)虛火入血分所致目絡紅赤，赤脈不如實證多而粗大，出血多緩，一般血量不如實火多
(C)全身表現為面色蒼白，唇舌色淡，爪甲無華，疲倦無力，手足發麻，可考慮為血瘀的表現
(D)血虛患者在眼表現為胞瞼、白睛血絡淡紅不鮮，目睛乾澀，不耐久視或視物不清
- 62 根據《毛傳》稱「有眸子而無見」為下列何項？
(A)眺 (B)矇 (C)睨 (D)瞶
- 63 有關胞生痰核的敘述，下列何者錯誤？
(A)病程急，局部紅腫熱痛，易於潰瘍之眼病
(B)相當於西醫學之霰粒腫
(C)脾失健運，濕痰內聚，上阻胞瞼脈絡，與氣血混結而成本病
(D)本病腫核小者，一般無須治療，可任其自消；大者或已潰破者，宜予手術治療
- 64 有關漏睛的敘述，下列何者錯誤？
(A)可能一眼或二眼俱痛
(B)椒瘡嚴重可成漏睛瘡
(C)大眦頭，皮色如常，按之不痛，但見黏濁淚液隱澀不舒，當疏風清熱
(D)大眦微紅，黏稠膿液溢出，心有伏火，脾有濕熱，治宜歸芍紅花散，清心利濕
- 65 有關金疳的敘述，下列何者錯誤？
(A)白睛患者，形如玉粒之小泡，周圍圍繞赤脈，同氣輪屬肺，五行為金，故稱金疳，又名金瘍
(B)心肝壅熱者，白睛兩眦紅赤較甚，小便赤，便秘，治宜瀉熱黃連湯加減
(C)脾胃失調，肺金失養，氣血鬱滯，可成本病
(D)可外以黃連西瓜霜眼藥水或千里光眼藥水治之
- 66 有關白睛青藍的敘述，下列何者錯誤？
(A)本病初起，白睛傍黑睛緣發生紫紅色腫脹隆起，反覆發作，日久該處白睛遂變青藍
(B)多因火鬱血瘀，蒸逼所致
(C)常由金疳反覆發作而來，往往侵及風水二輪
(D)又名白珠俱青
- 67 患者眦部瞼弦紅赤糜爛，灼熱刺癢，甚者眦部瞼弦出血，其最有可能之診斷為下列何者？
(A)風赤瘡瘍 (B)天行赤眼 (C)暴風客熱 (D)迎風赤爛
- 68 下列何種眼疾是黑睛疾患痊癒後遺留之癍痕翳障，相當於現代醫學的角膜癍痕？
(A)宿翳 (B)凝脂翳 (C)花翳白陷 (D)聚星障
- 69 雙眼發病，初起症輕，多見夜盲，眼珠乾澀羞明，頻頻眨目，為下列何種眼疾之表現？
(A)疳積上目 (B)聚星障 (C)混睛障 (D)風輪赤豆

- 70 清代在喉科方面有許多重要著作，何者不是其中之一？
(A)《重樓玉鑰》 (B)《喉科指掌》 (C)《尤氏喉科秘書》 (D)《紅爐點雪》
- 71 有關異物入耳之敘述，下列何者錯誤？
(A)動物類異物應於蟲未死時即取出
(B)圓球形異物可用刮匙鉤出
(C)細小能移動異物，可用沖洗法沖出
(D)異物入耳應依異物的性質、形態、大小與所在位置不同，採取不同的方法取出
- 72 耳眩暈應辨證施治，下列何方最不適宜？
(A)歸脾湯 (B)天麻鉤藤飲 (C)半夏白朮天麻湯 (D)安宮牛黃丸
- 73 鼻病外治法，如鼻頭紅赤或鼻孔糜爛，用清熱解毒消腫藥物塗敷，下列何者為最常用的藥方？
(A)四黃散 (B)明礬散 (C)礞砂散 (D)冰硼散
- 74 鼻塞與現代醫學之慢性鼻炎相似，以出現鼻塞為主要特徵，在辨證施治中因肺脾氣虛，邪滯鼻竅所致，屬於脾氣虛者，宜健脾滲濕，祛風通竅，可選用參苓白朮散加石菖蒲、蒼耳子、藿香。處方中以下列何藥物，能達健脾滲濕作用？
(A)蒼耳子、陳皮 (B)甘草、桔梗 (C)蓮子、薏苡仁 (D)白朮、砂仁
- 75 42 歲男性瞳神甚小，珠痛拒按，痛連眉稜，抱輪紅甚，神水混濁，黑睛之後見血液沉積。伴有視力減退，口苦咽乾，煩躁易怒，舌紅苔黃，脈弦數等。有關患者瞳神疾病的治療處方，下列何者最適宜？
(A)新製柴連湯祛風清熱 (B)龍膽瀉肝湯清瀉肝膽
(C)抑陽酒連散祛風除濕清熱 (D)杞菊地黃丸滋養肝腎
- 76 某患者咽部疼痛劇烈，痛連耳根及頷下，吞嚥困難，有堵塞感，或有聲嘶。檢查時見喉核紅腫，表面黃白色膿點，逐漸連成偽膜；口臭，大便秘結，小便黃，苔黃厚，脈洪大而數。最適宜選用下列何方？
(A)十味敗毒散 (B)托裏消毒飲 (C)甘露消毒飲 (D)清咽利膈湯
- 77 喉癰初起邪在表，治宜疏風清熱，解毒消腫，最適宜選用下列何方加荊芥、防風、白芷？
(A)仙方活命飲 (B)金燈山根湯 (C)托裏消毒飲 (D)五味消毒飲
- 78 根據五輪學說，下列敘述何者錯誤？
(A)眼胞分上下瞼，邊緣稱瞼弦，屬脾胃
(B)血輪指兩眦分大小眦，下瞼弦近大眦的淚竅包含在內，大眦內的紅色肉狀隆起，則不歸於此範疇
(C)白睛的眼珠外壁具有保護內部組織作用，屬肺大腸
(D)黑睛位於眼部的中央，為光線進入必由之路，並有保護瞳神及其他眼內組織的作用，屬風輪
- 79 李先生 30 歲，某日中午至速食餐廳用餐，點勁辣雞腿堡（買一送一）和冰可樂一杯。大快朵頤，吃完第一個勁辣雞腿堡已覺飽，第二個吃到一半脘脹不舒，但仍勉強吃完。是日整日脘悶不舒，噯氣連連，有食臭味，隔日中午大便黏臭，口乾欲飲，口瘡作，瘡面紅，脈弦滑，舌紅苔黃膩。試問其口瘡的最可能病因為何？
(A)上焦肺熱痰阻 (B)中焦食積濕熱 (C)下焦膀胱濕熱 (D)三焦濕熱瀰漫
- 80 承上題，下列處方何者最適宜？
(A)瀉白散 (B)導赤散 (C)龍膽瀉肝湯 (D)保和丸