

102年第一次專門職業及技術人員高等考試醫師中醫師考試
分試考試、中醫師、營養師、心理師、醫事檢驗師、護理師、
社會工作師考試、特種考試聽力師、牙體技術人員考試、
102年專門職業及技術人員特種考試語言治療師考試試題

代號：5103
頁次：6-1

等 別：高等考試

類 科：中醫師

科 目：中醫臨床醫學(二) (包括中醫內科學、中醫婦科學、中醫兒科學)

考試時間：1 小時 30 分

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 1 某支氣管擴張症患者，症見發熱惡風，胸悶作痛，煩躁不安，咳嗽氣急，氣短不能平臥，頭痛乏力，自汗不止，咯唾膿痰，尤以晨間咯痰最多，時見痰中帶血，或滿口咯血；舌紅、苔黃，脈弦數。其診斷最可能為下列何證？
(A)風熱襲表，熱毒犯肺 (B)熱毒內蘊，瘀血阻滯
(C)熱毒久蘊，氣陰虧耗 (D)痰熱壅肺，木火刑金
- 2 張小姐昨天起因感冒而咳嗽，咽乾痛，痰微黃，頭暈，太陽穴痛，無發燒惡寒，苔薄白，紅舌，脈浮滑數。治以下列何者最適宜？
(A)小柴胡湯 (B)桑菊飲 (C)瀉白散 (D)定喘湯
- 3 某 45 歲女性患者，自訴最近因為有同事感冒，昨天開始也出現惡寒、四肢痠痛、鼻塞、涕白、咽癢則咳嗽、痰白等症狀。診其脈浮緊，苔白、舌淡紅。治以下列何方最適宜？
(A)荊防敗毒散 (B)金沸草散 (C)桂枝湯 (D)辛夷散
- 4 下列有關支氣管擴張症之敘述，何者錯誤？
(A)屬中醫咳血、肺癰等病的範疇 (B)痰、火、瘀往往貫穿本病的整個過程
(C)正確的內科辨證論治，大部分的患者會痊癒 (D)細菌感染急性發作期，發熱時應按熱證護理
- 5 某 8 歲幼童，夜間咳嗽已 1 個月，接近凌晨時喉中痰鳴如吼，痰色黃黏，咳吐不利，口渴喜冰飲，舌苔黃、質紅，脈滑數。自測峰速計值比率 (peak expiratory flow rate) 介於 60%到 80%。治以下列何法最適宜？
(A)溫肺散寒 (B)清熱宣肺 (C)清熱潤肺 (D)滌痰降氣
- 6 承上題，治以下列何方最適宜？
(A)定喘湯 (B)三子養親湯 (C)射干麻黃湯 (D)銀翹散
- 7 某 20 歲男性患者，因經常流連網咖，熬夜打電玩，數月之後開始出現心悸煩躁，失眠健忘，頭昏頭暈，耳鳴眼花，口咽乾燥，手足心熱。診其脈細數，舌紅、苔少。下列何者為最可能的診斷？
(A)心腎陰虛 (B)心脾血虛 (C)心膽氣虛 (D)脾腎陽虛
- 8 某 34 歲女性患者，有心臟二尖瓣脫垂併心律不整病史。來診時症見面色黃白偏暗，主訴近一個月頻發生心悸與心律不整，多於睡眠之中發作，發作時胸悶，左前胸連肩臂及手指緊痛。最近覺手足冰冷，頻尿，口淡，涎唾量多，常有黏痰，白帶量多。自覺服補藥會改善，平時舌苔少、舌質淡紅，脈來沉細弱無力。本病病機最可能為下列何者？
(A)脾陽虛衰，無以制水 (B)心腎陽虛，水氣凌心
(C)衝任虛寒，帶脈失約 (D)三焦決瀆失司，水飲泛溢
- 9 承上題，依中醫辨證論治原則，本病治以下列何者最宜？
(A)實脾飲 (B)真武湯 (C)炙甘草湯 (D)四逆湯
- 10 某 25 歲女性患者，主訴精神抑鬱近半年。家人代述其餘症狀尚有表情淡漠，神志痴呆，語無倫次，喃喃自語，喜怒無常，不思飲食。診其舌苔膩，脈弦滑。其診斷最可能為下列何者？
(A)痰氣鬱結 (B)心脾兩虛 (C)痰火上擾 (D)火盛傷陰
- 11 承上題，治以下列何方最適宜？
(A)順氣導痰湯 (B)養心湯 (C)生鐵落飲 (D)二陰煎

- 12 「心主血脈」意謂心臟主控人體的血流循環。下列有關血液調控功能的論述，何者錯誤？
(A)肝藏血、肺朝百脈 (B)血汗同源，故奪血者無汗，奪汗者無血
(C)人動則血運於諸經，人靜則血歸於心 (D)目受血而能視，足受血而能步
- 13 某患者大便秘結，面色無華，頭暈目眩，心悸，唇舌淡，脈細澀。治以下列何方最適宜？
(A)黃耆湯 (B)麻子仁丸 (C)《尊生》潤腸丸 (D)濟川煎
- 14 某患者脘腹滿悶，時輕時重，喜溫喜按，納呆便溏，神疲乏力，舌質淡，苔薄白，脈細弱。其辨證最可能為下列何者？
(A)脾胃虛弱 (B)中氣下陷 (C)脾腎陽虛 (D)胃寒
- 15 某患者主訴胸膈疼痛，食不得下，或雖下而復吐出，甚至水飲難下，大便堅如羊屎，或吐出物如赤豆汁，形體消瘦，面目肌膚枯燥晦滯。診其舌紅少津，舌質紫暗，脈細澀。治以下列何法最適宜？
(A)開鬱化結，潤燥降氣 (B)滋養津液，瀉熱散結
(C)破結行瘀，滋陰養血 (D)溫補脾腎，益氣回陽
- 16 某患者來診主訴呃逆多日，其呃聲低弱無力，氣不得續，面色蒼白，手足不溫，食少困倦。診其舌淡、苔白，脈沉細弱。治以下列何方最適宜？
(A)補中益氣湯加吳茱萸、丁香 (B)理中湯加吳茱萸、丁香
(C)苓桂朮甘湯加吳茱萸、丁香 (D)小半夏加茯苓湯加吳茱萸、丁香
- 17 腹痛泄瀉，每因抑鬱，惱怒或情緒緊張時誘發或加重，多伴有胸脅脹悶，噯氣食少，舌淡紅，脈弦。治以下列何法最適宜？
(A)解鬱疏肝 (B)疏肝和胃 (C)抑肝扶脾 (D)調和脾胃
- 18 某 26 歲女性患者，近日腹瀉 7-8 次，前 2-3 天大便臭，後變成水樣且腥味變重，日 4-5 行。診其苔白滑、質淡紅，脈濡。治以下列何方最適宜？
(A)葛根芩連湯 (B)胃苓湯 (C)藿香正氣散 (D)痛瀉要方
- 19 下列有關黃疸之敘述，何者錯誤？
(A)《內經》首創黃疸之病名
(B)《金匱要略》：「黃家所得，從熱得之」
(C)萎黃為目睛與小便均不黃，這是與黃疸最根本的鑑別點
(D)黃疸之黃分布均勻，遍及整個眼白
- 20 某 44 歲男性患者，罹患慢性 B 型肝炎。今日來診，主訴全身疲倦，頭重不舒，胸悶，口渴、口苦，小便黃赤。診其脈：弦滑；望其舌：苔黃膩。肝功能指數分別為 AST: 126 IU/L，ALT: 206 IU/L。治以下列何方最適宜？
(A)甘露消毒丹 (B)三仁湯 (C)胃苓湯 (D)柴胡疏肝散
- 21 下列有關脅痛之敘述，何者錯誤？
(A)病位主要在肝、膽，且與脾、胃、腎有關
(B)血瘀證：以刺痛為主，且痛處固定不移，疼痛持續不已，白天常較夜間痛甚
(C)氣滯證：以脹痛為主，且游走不定，痛無定處，時輕時重，每因情緒變化而增減
(D)實證以氣滯、血瘀、濕熱為主；虛證多屬精血虧損，肝失所養的陰傷證
- 22 某 19 歲女性患者，腰痛劇烈，不能俯仰，平日不喜飲水，小便量少無不適感，喜食炸物、肉類，胃口佳，但大便量少。觀其舌質淡紅、尖有朱點、苔薄白，診其脈弦，扣其腰部，無敲擊痛。尿檢無異常，腹部 X-ray 無結石。治以下列何方最適宜？
(A)增液承氣湯合芍藥甘草湯 (B)導痰湯合柴胡疏肝散
(C)大分清飲合金鈴子散 (D)身痛逐瘀湯合當歸芍藥散
- 23 某 34 歲男性患者，主訴遺精易發數月，特別是較為繁忙時容易發生。見其面色不華，自言容易疲勞，心悸、健忘，胃口不好，大便易溏。診其舌色淡白、苔薄白，脈弱。治以下列何方最適宜？
(A)六味地黃丸 (B)妙香散 (C)金鎖固精丸 (D)左歸飲
- 24 馬兜鈴酸引起的腎臟損害主要是影響下列何種細胞？
(A)腎小管上皮細胞 (B)腎絲球細胞 (C)腎膈細胞 (D)血管內皮細胞

- 25 某病患因代謝性酸中毒（Metabolic Acidosis）繼發代償性過度呼吸，臨床表現呼吸多吸少，這種呼吸型態的表現，較接近於下列那一種中醫證型？
(A)肺失宣發 (B)腎不納氣 (C)肝不疏泄 (D)肺失肅降
- 26 小便不暢或點滴不通，咽乾煩渴欲飲，呼吸急促或咳嗽，苔薄黃，脈數，為肺熱壅盛型癰閉，可用清肺飲治療。下列辨證與加減方治療，何者錯誤？
(A)如患者出現心煩，舌尖紅或口舌生瘡等心火旺的徵象，可加黃連、竹葉等以清心火
(B)如大便不通，可加杏仁、大黃以宣肺通便
(C)如兼表症而見頭痛、鼻塞、脈浮，可加荊芥、防風以解表宣肺
(D)如肺熱漸清而肺陰虧耗，症見舌紅少津者，治宜滋養肺陰，以清潤為主，方用百合飲子
- 27 某 60 歲男性勞工，最近常常有小便解不乾淨的問題，他覺得尿常常留在尿道中，老是抖不出來，同時引發小腹痛，小便不順暢，尤其是疲累時更明顯。其病症屬下列何者？
(A)膏淋 (B)氣淋 (C)勞淋 (D)寒淋
- 28 某患者其主症為全身浮腫，見腰以下至四肢水腫，按之凹陷不易恢復，脛腹脹悶，食少便溏，面色萎黃，腰酸畏寒，神疲乏力，肢冷小便短少。其診斷最可能為下列何者？
(A)肺腎陽虛 (B)脾腎陽虛 (C)心腎陽虛 (D)心脾兩虛
- 29 程氏萆薢分清飲有清熱利濕，分清泄濁的功用，有關其藥物組成與功用，下列敘述何者錯誤？
(A)白朮、茯苓健脾除濕 (B)蓮子心、丹參清心活血通絡
(C)黃柏、車前子清熱利濕 (D)烏藥、青皮破氣順氣
- 30 下列那些症狀是消渴中「消」的主要症狀，也是癯病陰虛火旺型的主要症狀？①多食易肌 ②多飲多尿 ③急躁易怒
(A)① (B)①② (C)①③ (D)①②③
- 31 關於消渴的治療原則，下列敘述何者正確？①上消宜常滋潤，慎用攻伐 ②中消胃火不宜久用苦寒，苦寒太過，反生中滿之證 ③上、中二消需避免治腎之藥以免生滋膩
(A)①② (B)①③ (C)②③ (D)①②③
- 32 紅斑性狼瘡的病人常會發燒，從中醫的角度思考，下列相關敘述何者錯誤？
(A)若有感受外邪之發熱，乃正邪相爭，應辨證論治
(B)若久病陰虛發熱，可考慮朱丹溪之養陰降火法
(C)若見陽虛發熱之證，可考慮以右歸飲治之
(D)雖屬氣虛發熱，仍不可用補中益氣湯
- 33 某 50 歲男性患者，罹患白塞病（Behcet's Disease）多年，近日出現壯熱、或低熱纏綿，口腔、下陰潰爛，下肢出現紅斑結節，納呆腹脹，觸之疼痛，舌苔黃膩，脈滑數等情形。治以下列何方最適宜？
(A)血府逐瘀湯 (B)百合地黃湯 (C)甘露消毒丹 (D)陽和湯
- 34 承上題，若出現外陰紅腫潰瘍，則以下列何者煎湯外洗最適宜？
(A)野菊花、苦參根 (B)玄參、荊芥 (C)萆薢、玉米鬚 (D)忍冬藤、絡石藤
- 35 某 30 歲男性患者，罹患僵直性脊椎炎多年，已出現駝背狀態；若再伴有腰脊強痛，轉側不利，遇風痛甚等情形，則於辨證基礎下再配伍下列何藥最適宜？
(A)半夏、天南星 (B)白花蛇、蜈蚣 (C)羌活、防風 (D)紅花、當歸
- 36 下列有關久痺之敘述，何者正確？①痺證日久不癒，反覆發作，易出現痰瘀阻絡，氣血虧虛及臟腑痺的證候 ②痰瘀阻絡症見肢體關節疼痛時輕時重，關節腫大，甚至強直畸形，屈伸不利 ③舌質色紫或有瘀點瘀斑、脈細澀為血瘀痰凝之象 ④可加威靈仙、雞血藤養血活血；白芥子、膽南星搜風通絡 ⑤久痺因痰瘀阻絡亦可以身痛逐瘀湯為基礎方進行治療
(A)①③④⑤ (B)①②③④ (C)①②③⑤ (D)②③④⑤
- 37 糖尿病，多食易飢，形體消瘦，口臭，牙齦腫痛，大便乾燥，舌紅苔黃燥，脈滑實有力，治以下列何方最適宜？
(A)麻子仁丸 (B)玉女煎 (C)防風通聖散 (D)白虎加人參湯

- 38 關於瘰癧的表現與其病機的關係，下列敘述正確的共有幾項？①頸前腫塊較大，兩側對稱，腫塊光滑柔軟，其主要病機為氣鬱痰阻 ②若瘰癧出現局部結節，如核桃大小，質地較硬者，其主要病機為氣鬱痰結血瘀 ③若患者出現煩熱，急躁易怒，面部烘熱，口苦，其病機為肝火亢盛
(A) 0 項 (B) 1 項 (C) 2 項 (D) 3 項
- 39 某 45 歲女性為橋本氏病患者，甲狀腺機能低下，面腫蒼白少華，神疲肢軟，手足麻木，少氣頭暈，四肢不溫，納呆，口淡乏味，便溏，月經後期，舌質淡胖，脈沉遲無力。治以下列何方最適宜？
(A) 補中益氣湯 (B) 右歸丸 (C) 養心湯 (D) 六君子湯
- 40 華醫師和弟子討論「陰虛盜汗」病案時，指出「當歸六黃湯」為治陰虛火旺之代表方，但臨床常因證加減，下列加減法何者錯誤？
(A) 兼氣虛時可加黨參 (B) 汗出多者，加牡蠣、浮小麥
(C) 火熱不甚者，可去生地黃與熟地黃 (D) 虛熱甚者，加秦艽、銀柴胡
- 41 某女性患者，就診時自訴近一個月來咽中常覺有痰，吞不下，咯不出，胸悶脅脹，伴見嘔心，口苦。診其舌淡紅偏紅，苔黃而膩，脈弦滑略數。其病機最可能為下列何者？
(A) 肝氣鬱結，鬱而化火 (B) 肝鬱乘脾，生濕聚痰
(C) 肝鬱脾虛，虛火上攻 (D) 肝鬱乘脾，痰鬱化熱
- 42 承上題，治以下列何方最適宜？
(A) 柴胡疏肝散加青皮、鬱金 (B) 丹梔逍遙散合左金丸
(C) 半夏厚朴湯加佛手、旋覆花 (D) 溫膽湯加黃芩、瓜蒌皮
- 43 某 50 歲男性患者，近 2 個月常覺頭痛、眩暈、耳鳴眼花、震顫、失眠、口苦，且會因惱怒加重。見其舌紅苔黃，脈弦細數，量其血壓為 170/90 mmHg。治以下列何方最適宜？
(A) 半夏白朮天麻湯 (B) 加味逍遙散 (C) 六味丸 (D) 天麻鉤藤飲
- 44 下列關於「眩暈」之敘述何者正確？
(A) 眩是頭昏，暈是眼花，二者常同時並見
(B) 輕者閉目即止，重者如坐車船，旋轉不定，不能站立，甚則昏倒
(C) 就治法而言，丹溪主張治虛為主
(D) 臨床所見則以痰濁壅遏者居多
- 45 中醫學所稱的「伏梁」與下列何種西醫學的癌症最相似？
(A) 肺癌 (B) 胃癌 (C) 甲狀腺癌 (D) 膀胱癌
- 46 某 65 歲女性患者，因癌腫致下肢水腫甚。依元代危亦林《世醫得效方》及唐代孫思邈《千金要方》所論述，本患者最可能需要的飲食禁忌為下列何者？
(A) 糖 (B) 多食魚肉 (C) 鹽 (D) 多喝水
- 47 放射治療腫瘤，以根治劑量治療後，依中醫辨證論治，下列何項證型最多見？
(A) 氣虛 (B) 脾虛 (C) 陰虛夾瘀 (D) 熱毒傷陰
- 48 某 32 歲女性罹患肺腺癌，就診時發現咯痰不爽，痰中帶血，胸痛氣急，痛處固定，唇甲紫黯，舌質暗有紫斑、瘀點，苔薄黃，脈弦澀。治以下列何方最適宜？
(A) 導痰湯 (B) 血府逐瘀湯 (C) 百合固金湯 (D) 小陷胸湯
- 49 在《婦科心法》的記載中，以下列何者治療經水過期不至，因血氣凝滯脹痛者？
(A) 人參養榮湯 (B) 過期飲 (C) 溫經攝血湯 (D) 大營煎
- 50 某 48 歲患者，主訴近三次月經來潮時間依序為該年之 8 月 25 日、9 月 10 日、11 月 5 日，並見經量減少，情緒低落，頭暈耳鳴，腰酸。診其舌質淡紅，苔薄白，脈沉弦細。下列相關敘述何者錯誤？
(A) 月經週期屬於月經先後不定期 (B) 可能因為更年期卵巢功能紊亂所引起
(C) 辨證為肝腎不足 (D) 治療可以《傅青主女科》清經散為主方
- 51 承上題，最適宜的處方，其組成為下列何者？
(A) 當歸、白芍、柴胡、白朮、茯苓、生薑、薄荷、炙甘草
(B) 當歸、白芍、柴胡、熟地、菟絲子、山藥、茯苓、荊芥
(C) 熟地、山藥、山茱萸、枸杞、杜仲、肉桂、附子、甘草
(D) 熟地、白芍、茯苓、丹皮、地骨皮、黃柏、青蒿

- 52 下列情況共有幾項可稱為「月經過多」？①經量明顯超過本人原有的正常量 ②行經時間延長且總量較以往明顯增多 ③月經週期規律但總量較以往明顯增多 ④月經週期規律，自覺經量較他人多者
(A) 4 項 (B) 3 項 (C) 2 項 (D) 1 項
- 53 《醫宗金鑑·婦科心法》主張婦人經前腹脹甚於腹痛的病機，下列何者正確？
(A) 胞中虛寒 (B) 氣滯其血 (C) 血凝礙滯 (D) 寒濕互滯
- 54 承上題，最宜下列何者治療？
(A) 當歸、炒白芍、肉桂、炙甘草、生薑、大棗
(B) 熟地、炙黃耆、酒拌白芍、人參、川芎、當歸
(C) 香附、縮砂仁、木香、延胡索、甘草、檳榔、烏藥、生薑
(D) 當歸、赤芍、劉寄奴、丹皮、熟地、三稜、莪朮、烏藥、官桂、烏豆、延胡索、生薑
- 55 下列何者並非虛證閉經的原因？
(A) 先天腎氣不足，天癸未充
(B) 飲食勞倦，損傷脾氣，化源不足
(C) 多產房勞，損及肝腎
(D) 經期、產後血室正開，調攝失宜，外感寒邪，內傷生冷
- 56 《傳青主女科》固本止崩湯最宜治療下列何病證？
(A) 氣虛型崩漏 (B) 血熱型崩中
(C) 肝腎不足型經漏 (D) 肝腎虧損型月經先後不定期
- 57 朱丹溪提出婦人無子的原因，下列敘述何者正確？
(A) 冷痰凝滯 (B) 子宮虛冷 (C) 血少不足以攝精 (D) 脾胃虛損
- 58 下列關於陰挺的敘述，何者錯誤？
(A) 陰挺一證相當於子宮脫垂或陰道前後壁膨出
(B) 濕熱是引起陰挺之主因，病程綿延久易致氣虛下陷
(C) 陰挺與任、帶兩脈失於提攝，前陰肌肉筋脈失養、鬆弛有關
(D) 現代醫學將子宮脫垂程度分成三度，子宮頸和部分宮體及陰道前壁全部脫出陰道口屬於第二度
- 59 某 32 歲女性患者，下腹有堅硬積塊，疼痛拒按，面色晦黯，肌膚甲錯，口乾不欲飲，舌苔薄，脈沉。治以下列何方最適宜？
(A) 《金匱要略》大黃蟅蟲丸 (B) 《金匱要略》桂枝茯苓丸
(C) 《蘭室秘藏》散腫潰堅湯 (D) 《醫宗金鑑》大七氣湯
- 60 某 30 歲懷孕已 14 週女性，主訴頭暈，小腹綿綿作痛，按之痛減，無出血，面色萎黃，便稍軟日一行，脈沉滑弱。有關此病例之描述，下列錯誤者共有幾項？①其治療方式之記載始見於《諸病源候論》 ②其診斷為墮胎 ③治宜養血緩急止痛
(A) 0 項 (B) 1 項 (C) 2 項 (D) 3 項
- 61 關於產後疾病，中醫有「三急」、「三衝」、「三病」之說。三證雖不相同，其共同的主要病機為何？
(A) 氣滯血瘀 (B) 亡血傷津 (C) 外感六淫 (D) 氣虛痰凝
- 62 根據沈堯封的說法，妊娠病源有三大綱，不包括下列何者？
(A) 陰虧 (B) 腎虛 (C) 痰飲 (D) 氣滯
- 63 下列關於產後乳汁不足之敘述，何者正確？
(A) 《傳青主女科》認為產後缺乳治宜補氣以生血，並加入利竅之藥以通乳
(B) 《三因極一病證方論》提到產婦乳脹不行，虛者宜用漏蘆、通草、鯽魚之屬
(C) 產後乳汁分泌少，胸脅脹悶，伴有情志抑鬱不樂，飲食不振，舌質正常，苔薄黃，脈弦細而數，宜給予《傳青主女科》通乳丹
(D) 產後乳汁不足，屬氣血虛弱者，如一時藥物不便者，可單用豬蹄湯服之
- 64 下列何者最宜用治虛熱型月經先期？
(A) 熟地、黃耆、當歸、白芍、川芎、黨參
(B) 黃連、赤芍、川芎、黃芩、當歸、熟地
(C) 生地、白芍、元參、地骨皮、阿膠、麥冬
(D) 當歸、黃柏、香附、黃連、艾葉、白芍、知母、川芎、阿膠、黃芩

- 65 有關小兒生理特點，下列何者正確？①傳變迅速 ②臟腑嬌嫩 ③生機蓬勃 ④形氣未充
(A)①②③ (B)①③④ (C)②③④ (D)①②③④
- 66 在《醫宗金鑑·幼科雜病心法要訣》的記載中，兒自胞胎既脫以後，有因便秘、腹中穢惡不淨，令兒腹滿其吐不止者，宜下列何方？
(A)調胃承氣湯 (B)香蘇飲 (C)一捻金 (D)黃連二陳湯
- 67 依《醫宗金鑑》，小兒咳嗽的治療，下列敘述何者正確？①肺寒咳嗽證，便軟者用聖惠橘皮散，便秘者用補肺阿膠湯 ②肺熱咳嗽證，便軟者用加味瀉白散，便硬者用加味涼膈散 ③食積咳嗽證，便溏者用麴麥二陳湯，便秘者用蘇葶滾痰丸 ④風寒咳嗽證，便軟者用參蘇飲，便秘者用金沸草散
(A)①② (B)③④ (C)②③ (D)①④
- 68 下列何者最不適合用於治療小兒風寒感冒？
(A)麻黃湯 (B)葱豉湯 (C)杏蘇散 (D)荆防敗毒散
- 69 某 5 歲幼童，因食慾不振至醫院求診，經察其腹部脹滿，手足心熱，噯氣泛酸，大便酸臭，口渴腹熱，喜歡臥睡，但睡不安穩。依《幼科雜病心法》，下列相關敘述，何者最不適宜？
(A)係孩童恣意肥甘生冷，腸胃不能運化所致 (B)此屬「食滯」
(C)可選用木香大安丸消導之 (D)若該孩童便秘重者，則不可攻下
- 70 某 4 歲幼童，因腹痛 1 天來求診。症見腹部脹滿，按之痛甚，口氣酸臭，不思飲食，時轉矢氣，大便穢臭，瀉後腹痛則減少，夜臥不安，舌苔厚膩。治以下列何方最適宜？
(A)香砂平胃散 (B)養臟散 (C)痛瀉要方 (D)葛根芩連湯
- 71 有關癰證臨床表現之敘述，下列何者錯誤？①濕癰發作時易喉間痰鳴 ②瘀血癰發作時四肢抽搐不甚明顯 ③肝熱驚觸癰證可能會吐舌急叫 ④風癰發作時仰臥面赤，牙關噤急
(A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④
- 72 有關慢驚風的治法，下列何者正確？①溫中健脾 ②溫陽逐寒 ③鎮驚 ④息風
(A)①② (B)①③ (C)①④ (D)③④
- 73 有關小兒水腫，如來勢迅速，水腫由眼瞼開始，繼而四肢，顏面為甚，皮膚光亮，並有發熱，惡風，咳嗽，治以麻黃連翹赤小豆湯。若兼見咳喘者，宜加下列何者？
(A)羌活、防風 (B)大腹皮、益母草 (C)附子、肉桂 (D)葶藶子、桑白皮
- 74 在《幼科雜病心法·淋證門》的記載中，「冷氣入胞，小便閉塞脹難禁，淋漓不斷腹隱痛」，宜治以下列何方？
(A)五苓散倍加肉桂、小茴香 (B)十味導赤散
(C)八正散 (D)小蓳飲子
- 75 《醫宗金鑑》之清熱瀉脾散，下列何者為其組成藥物之一？①石膏 ②山梔子 ③大黃 ④連翹
(A)①② (B)①③ (C)①②④ (D)②③④
- 76 夏季熱是嬰幼兒時期的一種特有疾病。關於其臨床發病特徵，下列何者正確？①口渴 ②多尿 ③多汗
(A)①② (B)①③ (C)②③ (D)①②③
- 77 依《醫宗金鑑》，有關小兒衄血的治療。下列敘述何者正確？①傷寒熱鬱於榮，其身無汗，用麻黃湯汗之 ②熱盛者，用犀角地黃湯瀉之 ③內熱衄血者，用涼膈散清之 ④外俱用髮灰散，或黑梔子末吹鼻
(A)①② (B)①②③④ (C)①②④ (D)①④
- 78 紫癍反覆發作，日久不癒，下列治法何者正確？
(A)滋養肝腎 (B)益氣攝血 (C)補氣活血 (D)補益氣血
- 79 依《醫宗金鑑·痘疹心法》，疹毒熱甚上攻喉，疹毒聲啞肺熱壅，元參升麻大有功。若疹已發而失音者，以下列何方治療？
(A)鼠黏子湯 (B)桔梗湯 (C)加味涼膈散 (D)響聲破笛湯
- 80 有關小兒嘔吐，下列敘述何者正確？①小兒哺乳後，乳汁自口角溢出，稱為「溢乳」 ②「溢乳」多屬病態，宜注意改善哺乳方法 ③乳兒傷乳而吐者，又稱「喂乳」 ④溢乳嚴重，應考慮「胃食道回流」的可能
(A)①②③ (B)①③④ (C)②③④ (D)①②③④