

102年第一次專門職業及技術人員高等考試醫師中醫師考試
分試考試、中醫師、營養師、心理師、醫事檢驗師、護理師、
社會工作師考試、特種考試聽力師、牙體技術人員考試、
102年專門職業及技術人員特種考試語言治療師考試試題

代號：6103
頁次：8-1

等 別：高等考試

類 科：中醫師

科 目：中醫臨床醫學(三) (包括中醫外科學、中醫傷科學、中醫五官科學)

考試時間：1 小時 30 分

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 1 下列有關中醫外科開刀法的敘述，何者錯誤？
(A)乳部開刀宜放射形切開，免傷乳囊 (B)瘡瘍膿深而淺切，則內膿不得外出
(C)膿未熟而過早切開，損氣血而膿易泄 (D)面部膿腫沿皮膚紋理切開，免生癍疤
- 2 外瘍發於多血少氣之經，治療時首應注意下列何項？
(A)行氣、活血 (B)行氣、滋養 (C)破血、補托 (D)破血、驅風
- 3 下列有關中醫外科辨癰的敘述，何者錯誤？
(A)疔瘡、疽在初起時，局部腫勢平坦，根腳散漫，尚未成膿時，都會生癢，是毒勢熾盛
(B)潰瘍如癢甚熾熱，搔抓流水，屬脾胃濕重，或膿液浸漬皮膚
(C)風、瘡、疥癬等皮膚癢，如屬風勝，則走竄無定，遍體作癢
(D)中醫外科的癢皆為實證
- 4 下列何病不屬於膀胱經濕熱，又兼七情不和，憂憤凝滯而成？
(A)坐馬癰 (B)騎馬癰 (C)上馬癰 (D)下馬癰
- 5 下列有關「牙衄」的證治，何者錯誤？
(A)胃經實熱者，多見血出如湧
(B)胃經虛火者，多見牙齦腐爛，淡血滲流不止
(C)腎經虛者，多見血點滴而出，口不臭而牙動
(D)外用可以「李杲牢牙散」擦牙，青竹茹浸醋含漱
- 6 外科腫瘍內治法的三大原則為何？
(A)溫、通、汗 (B)消、清、通 (C)消、托、補 (D)消、通、補
- 7 下列何者不是衝疽的別名？
(A)中發疽 (B)臍二疽 (C)中脘疽 (D)雍腎疽
- 8 有關腦鑱，下列敘述何者錯誤？
(A)生於督脈經風府穴 (B)宜急施桑柴烘法，艾壯灸法，以癢止為度
(C)速服仙方活命飲，以舒解其毒 (D)由陰精枯涸，毒火乘之而生
- 9 下列何者是由表淺性黴菌感染所致？
(A)大麻風 (B)紫白癰風 (C)白駁風 (D)破傷風
- 10 一名來自印尼的外籍勞工，大腿出現紅斑白屑，蔓延如癰，形如蛇皮，脫落成片，而且皮膚感覺消失。其最可能的診斷為下列何者？
(A)紫白癰風 (B)赤白遊風 (C)白屑風 (D)癰風
- 11 對於「火赤瘡」的證治，下列何者錯誤？
(A)上體多生者，屬風熱盛，宜服「解毒瀉心湯」
(B)下體多生者，屬濕熱盛，宜服「清脾除濕飲」
(C)未破者，宜外敷「蟬蛻拔毒散」或「如意金黃散」
(D)已破者，宜外敷「玉容散」養血生肌

- 12 對於「天泡瘡」的證治敘述，下列何者正確？
(A)病因為感受暑風濕熱之氣所生，能互相傳染 (B)上身多者屬風熱，宜內服「清脾除濕飲」
(C)下身多者屬濕熱，宜內服「解毒瀉心湯」 (D)已破者，宜以「如意金黃散」外敷
- 13 下列有關疳瘡之敘述，何者正確？
(A)生於前陰 (B)生於少腹 (C)生於肛門內 (D)生於肛門外
- 14 對於痔瘡之治療，下列何者錯誤？
(A)成年人大便帶血，而無疼痛者，若為內痔，可服消痔止痛方
(B)因久瀉久痢而生痔，時時脫肛者，可服桃紅承氣湯
(C)如兼大便閉結或夜熱者，屬血熱結滯，可服清涼飲
(D)如因產後用力過大而生痔者，可服活血補中湯
- 15 下列有關肉瘤的敘述何者最正確？
(A)病機為脾失健運，濕痰內生及氣血凝結而成 (B)質地堅硬，按之不動，推之不移
(C)治以健脾益氣，化痰散結 (D)甚易引發癰瘡或濕疹
- 16 經常久站或負擔重物的人，因下肢皮膚發癢搔抓感染，而容易造成：
(A)癰瘡 (B)足跟疽 (C)爛腿 (D)鶴膝風
- 17 許多疾病均可能造成感染性膿瘍，在皮下組織、肌肉、骨骼或關節之間漫延流竄。下列何者不具上述特性？
(A)流痰 (B)流注 (C)流火 (D)蟯蛄癰
- 18 某患者罹患赤白遊風，皮膚出現病灶起如雲片，浮腫焮熱，痛癢相兼，高壘如粟，色赤者，初宜服荊防敗毒散疏解之，次宜服何方治療為佳？
(A)四物消風飲 (B)清胃湯
(C)補中益氣湯加防風、蟬蛻、殭蠶、生何首烏 (D)烏藥順氣散
- 19 某患者眼病如圖，其右上瞼生有一粒約 3 mm×3 mm 大小核狀硬結，推之移動，硬腫不疼。近 3 個月來自覺眼瞼有重墜不適感，但未影響視力，經消炎抗菌藥治療無效而就診中醫。此為何證？




- (A)眼胞痰核 (B)眼胞菌毒 (C)圓翳內障 (D)鉞眼
- 20 承上題，治宜下列何方？
(A)小防風湯 (B)芩蔚丸 (C)化堅二陳湯 (D)疏風清肝湯
- 21 某 17 歲男性患者，因騎車跌倒，導致左前臂骨折，經送醫後以手法復位，外敷如意金黃散，並以副木外固定治療。五天後複診時，發現其左臂外觀如圖所示。則下列相關之處置何者正確？



- (A)腫未消，應繼續敷如意金黃散，並繼續副木外固定
(B)腫已消，但應堅持外敷如意金黃散，並繼續副木外固定
(C)皮膚有過敏反應，應立即停止外敷藥，並去除副木外固定
(D)皮膚有過敏反應，應立即停止外敷藥，僅以副木外固定即可

請依下圖回答下列第 22 題至第 24 題。



- 22 附圖所示之肩部 X 光是屬於何種視角的成像法？
 (A)前後位視角 (AP view) (B)腋視角 (axillary view)
 (C)側視角 (lateral view) (D) Y 視角 (Y view)
- 23 「肩關節盂 (shoulder glenoid)」指的是圖中的那個結構？
 (A)① (B)② (C)③ (D)④
- 24 經由所提供之影像，可以判斷其病變為何？
 (A)肩胛骨骨折 (B)肩關節前脫位 (C)肱骨頸陳舊性骨折 (D)無明顯異常
- 25 某 65 歲女性病患，因在浴室跌倒，主訴右膝疼痛，X 射線檢查如附圖所示。經手法整復後，下列固定包紮的正確順序為何？①紗布固定 ②外敷如意金黃散 ③固定抱膝 ④固定夾板



- (A)③②④① (B)③②①④ (C)②③④① (D)②③①④
- 26 某 16 歲男性患者，某日因從事直排輪極限運動自斜坡上跌下，著地時左臂撐地，旋即發生劇烈疼痛。經送醫檢查發現其 X 光片如圖所示，則其骨折之類型於分類上應屬下列何者？




- (A)骨骺分離 (B)嵌插骨折 (C)裂縫骨折 (D)青枝骨折

- 27 某 30 歲男性患者，職業為銀行辦事員，因長時間下背痛，行針灸治療後，疼痛減輕，但反覆發作約一年之久。X 光影像學檢查如下圖，下列何項臆斷最為可能？



- (A) 尿路結石
(B) 脊柱退行性病變 (Degenerative Spondylosis)
(C) 薦腸關節炎 (Sacroiliitis)
(D) 椎間盤突出
- 28 承上題，該病人宜作何項檢查進一步確診？
- (A) 進一步作 CT 檢查，確認椎間盤突出位置及神經受壓迫程度
(B) 進一步作 IVP 影像學檢查確診是否為尿路結石
(C) 進行腰椎正面及側面影像學檢查，有無骨贅物生成，以確診脊柱退行性病變
(D) 建議作血液檢驗紅血球沉降速率 (ESR)、C 反應蛋白 (CRP) 及 HLA-B27，以確診是否為僵直性脊柱炎
- 29 附圖為肩部核磁共振的冠狀斜向 (coronal oblique) 某一切面影像，其中以白色星狀標示的結構為何？



- (A) 三角肌 (deltoid)
(B) 棘上肌 (supraspinatus)
(C) 小圓肌 (teres minor)
(D) 大圓肌 (teres major)
- 30 某 25 歲男性患者，一個月前打籃球時，遭球友由前方衝撞右小腿上端致膝關節受傷，當時右膝嚴重腫脹及疼痛。目前腫脹消失，但患者自覺關節不穩、無力，上下樓梯有錯落感，向後推拉試驗呈陽性，其最可能之診斷為下列何者？
- (A) 半月板損傷
(B) 前十字韌帶斷裂
(C) 後十字韌帶斷裂
(D) 髁韌帶斷裂
- 31 下列有關肘部周圍軟組織的敘述，何者錯誤？
- (A) 環狀韌帶可維持肱尺關節之穩定性
(B) 橈側副韌帶可維持肱橈關節之穩定性
(C) 前臂伸肌腱附著於肱骨外上髁
(D) 肱二頭肌肌腱附著於橈骨結節
- 32 有關腕部傷筋之敘述，下列何者錯誤？
- (A) 腕部扭挫傷較嚴重者，可用兩塊夾板將腕關節固定於功能位 3 週。去除固定後，可用彈力護腕保護
(B) 橈側伸腕肌腱周圍炎於急性期一般不適宜行理筋手法，腫脹稍退後可作輕拿捏和理順手法
(C) 腕三角軟骨損傷為腕關節遭受突然的過度旋轉暴力時，引起三角軟骨損傷或破裂，在損傷初期要進行腕關節活動以免關節僵硬
(D) 腱鞘囊腫患者往往在沒有明顯外傷史情況下發現囊性的腫塊

- 33 有關彈響髖的敘述，下列何者正確？
(A)患肢的關節活動度多會受影響 (B)患處多會有明顯疼痛感
(C)可用熱敷患處的方式減輕症狀 (D)一般認為與髖內收肌群的緊繃有關
- 34 有關膝關節半月板撕裂傷（meniscus tear），下列何種檢查最不具直接的診斷價值？
(A)麥克馬雷氏測試（McMurray's test） (B)核磁共振影像（MRI）
(C)關節鏡（Arthroscopy）檢查 (D)X 光平片（X-ray plain film）攝影
- 35 有關腎虛性跟痛症的敘述，下列何者錯誤？
(A)久病臥床或年老體弱的患者，足跟部因不常負重而發生退行性變化，皮膚變薄，跟下脂肪墊萎縮，骨骼脫鈣致骨萎筋弛
(B)患者站立或行走時雙腿酸軟無力，雙跟部感到酸痛，走一段路後反而較不痛
(C)大多數患者 X 光未見骨質破壞，僅有脫鈣現象
(D)補腎強筋可選用六味地黃丸或金匱腎氣丸
- 36 有關腕三角軟骨（Triangular fibrocartilage complex）結構的敘述，下列何者正確？①軟骨基底部附著於尺骨遠端關節面的橈側緣 ②軟骨尖端附著於尺骨莖突基底部 ③僅軟骨的掌側緣與腕關節囊相連 ④軟骨將腕關節腔與尺橈下關節腔隔開
(A)①② (B)②④ (C)①③ (D)③④
- 37 下列有關足踝扭挫傷之敘述，何者錯誤？
(A)前腓距韌帶損傷最常見 (B)扭挫傷嚴重時，跟腓韌帶損傷亦可見
(C)因三角韌帶關係，可造成內踝骨折 (D)可因腓腸肌收縮造成第五跖骨骨折
- 38 某 23 歲男性，跌倒後左手食指撞擊地面，疼痛劇烈、腫脹明顯，遠端指間關節無法伸直，X 光無明顯異常，其最可能病症為何？
(A)伸指肌腱斷裂 (B)屈指肌腱損傷 (C)腕隧道症候群 (D)扳機指
- 39 某 50 歲女性電腦工程師，近半年右手腕部和拇指、食指、中指麻痛，常握不住東西，天氣寒冷時右手指易冰冷、紫紺，手腕持續伸展或屈曲都會使疼痛及麻痺加劇。下列何項疾病要首先考慮？
(A)腕三角軟骨損傷 (B)腕隧道症候群 (C)橈神經損傷 (D)橈骨莖突韌鞘炎
- 40 承上題，有何測試可鑑別診斷？
(A)手腕放置於屈曲 90° 的位置，60 秒內出現麻痛加重
(B)四指包住拇指握拳並向尺側屈曲，患處疼痛加劇
(C)手肘伸直前臂旋後，再將手腕極度背伸，患處疼痛加劇
(D)手肘伸直前臂旋前，再將手腕屈曲及向尺側偏，患處疼痛加劇
- 41 某患者因意外致肩挫傷，診察發現為肩關節脫位，經整復固定後，患者抱怨手臂外側知覺異樣感，下列何項為最可能原因？
(A)尺神經損傷（Ulna nerve injury）
(B)腋神經損傷（Axillary nerve injury）
(C)肌皮神經損傷（Musculocutaneous nerve injury）
(D)正中神經損傷（Median nerve injury）
- 42 有關奧斯戈德氏病（Osgood-Schlatter disease），下列何者錯誤？
(A)常見於青少年，且男生多於女生
(B)外觀常見脛骨隆突腫大
(C)有少數病患會合併出現脛骨隆突撕裂性骨折
(D)大部分的患者在急性期應給予膝伸直位之石膏固定


- 43 某 23 歲女性患者，今天上午因穿高跟鞋不小心踝關節受傷，晚上由家人攙扶來院就診。症見外踝腫脹瘀血嚴重，腳無法踩地。關於醫師之處理方式，下列何者錯誤？
(A)請病患仰臥於診療床，醫師檢查損傷部位骨頭、韌帶有無壓痛點
(B)可以作牽拉試驗，若疼痛為陽性；若與健側比較時，內翻活動增大則考慮外側韌帶斷裂
(C)X 光檢查可以排除撕脫骨折、距骨移位與判定傷筋的嚴重程度
(D)外敷金黃散後並以繃帶固定踝關節於內翻位（Varus）即可
- 44 落枕常用的理筋手法中，以頸部旋轉搖晃法的潛在危險性較高。下列何者是其主要原因？
(A)容易造成頸部肌肉拉傷
(B)容易造成腦部缺血
(C)頸椎發出的關節聲響令患者不安
(D)搖晃頭部容易產生暈眩
- 45 如意金黃散以下列何藥為君？
(A)大黃
(B)黃柏
(C)天花粉
(D)白芷
- 46 有關腰椎椎管狹窄症的敘述，下列何項最正確？
(A)單純椎管狹窄症，腰腿痛症狀與椎間盤破裂突出類似，難以鑑別區分
(B)以第四、五腰椎最多見，跛行症狀主因是行走時椎管內壓力增加，出現缺血性神經炎造成
(C)可影響小腿外側及足背外側感覺異常，足蹠屈能力降低，為 L5-S1 的神經受影響
(D)患者常有腰痛，腰背後伸動作時，可減少腰痛情形，常在腰部放置腰墊可減輕疼痛發作
- 47 下列那一位醫家記載了現存中醫最早的顛頤關節脫位整復方法，直至現在還普遍沿用？
(A)葛洪
(B)龔慶宣
(C)巢元方
(D)孫思邈
- 48 下列何項為《醫宗金鑑·正骨心法要旨》所記載的「鎖子骨」？
(A)襯骨
(B)琵琶骨
(C)拄骨
(D)髑骨
- 49 肱骨幹骨折處在三角肌止點以上時，骨折遠端由於肌肉的牽拉，可發生下列何種典型的移位？
(A)向前、向內移位
(B)向上、向外移位
(C)向外、向前移位
(D)向下移位
- 50 有關橈骨下 1/3 骨折合併下橈尺關節脫位的敘述，下列何者正確？
(A)多見於兒童，成人較少見
(B)直接暴力，則多因前臂被機器的輪帶捲傷所致
(C)橈骨下 1/3 骨折極穩定，整復固定容易
(D)下橈尺關節脫位容易診斷，預後良好
- 51 《醫宗金鑑·正骨心法要旨》使用攀索疊磚法應保持脊柱於何位置？
(A)過屈位
(B)過伸位
(C)中立位
(D)直立位
- 52 有關腕舟狀骨骨折的敘述，下列何者正確？
(A)是腕骨骨折中最常見的骨折類型
(B)舟狀骨血液供應良好，骨折後容易癒合
(C)受傷 2 週後，舟狀骨 X 射線未發現骨折線，即可排除舟狀骨骨折的可能
(D)尺側腕關節或叩擊第二掌骨頭時患部會有劇痛出現
- 53 有關肘關節脫位的敘述，下列何者正確？
(A)多發生於兒童
(B)後脫位為常見型態
(C)患者跌撲時，肘關節伸直，前臂旋後，掌面觸地，而形成前脫位
(D)患者屈肘位跌撲，肘尖觸地，形成後脫位
- 54 跌倒時，因肘關節突然屈曲，同時肱三頭肌強烈收縮，則可發生下列何者之撕脫骨折？
(A)橈骨頭
(B)尺骨鷹嘴
(C)肱骨外髁
(D)肱骨內上髁
- 55 有關骨盆骨折的敘述，下列何者正確？
(A)按盆弓斷裂的程度分為二類
(B)常見的併發症有神經損傷、膀胱破裂等
(C)骨盆正位 X 光片無法明確骨折部位和類型
(D)髂骨翼外旋時，其寬度增加、閉孔變大

- 56 某 60 歲男性病患，騎車不慎摔傷手臂，門診時中醫師根據下列何種症狀，即可以在臨床上初步診斷為骨折？
(A)劇烈的疼痛 (B)明顯的腫脹、瘀血 (C)手腕呈餐叉樣畸形 (D)手臂無力，抬不起來
- 57 固定的範圍和時間要恰到好處，並早期進行關節的練功活動，可以避免骨折併發下列何種症狀？
(A)創傷性關節炎 (B)關節僵硬 (C)骨化性肌炎 (D)缺血性肌攣縮
- 58 成人橈骨骨折部位形成骨性連接，一般需要幾週才能完成？
(A) 2~3 週 (B) 3~4 週 (C) 4~8 週 (D) 8~12 週
- 59 有關肘關節脫位的練功活動，下列敘述何者正確？
(A)肘關節損傷後不易產生關節僵硬
(B)肘關節儘早進行被動活動，方能有效
(C)去除固定後，開始肘關節主動活動，以伸肘為主
(D)應鼓勵患者早期練功活動
- 60 肩關節脫位之復位前後應注意檢查下列何神經有無損傷？
(A)腋神經 (B)正中神經 (C)橈神經 (D)尺神經
- 61 下列何者有「血輪四廓」之稱？
(A)風廓、火廓、澤廓、山廓 (B)風廓、雷廓、火廓、山廓
(C)火廓、雷廓、澤廓、山廓 (D)雷廓、風廓、澤廓、山廓
- 62 「貞王弗疾目」、「大目不喪明」出自何處？
(A)《甲骨文卜辭》 (B)《黃帝內經》 (C)《山海經》 (D)《淮南子》
- 63 《目經大成》認為下列何者是凝脂翳的險候之徵？
(A)納食不進 (B)氣逆作咳 (C)脇肋作痛 (D)二便閉澀
- 64 有關「真睛破損」的治療，下列何者錯誤？
(A)風邪乘襲可以除風益損湯加減
(B)可用還陰救苦湯涼血化瘀
(C)外邪入侵熱毒盛，治以經效散合五味消毒飲加減
(D)手術前後均可滴用黃芩、千里光等眼藥
- 65 某 73 歲女性主訴逐漸視力模糊，眼部不痛不癢，但眼前有位置固定之點狀、條狀或圓盤狀陰影，頭暈耳鳴，腰膝酸軟，脈沉細。檢視瞳神，部分晶珠灰白色混濁。下列有關患者的治療，何者正確？
(A)馬上手術 (B)內服補中益氣湯 (C)內服杞菊地黃丸 (D)內服石決明散
- 66 有關耳鼻喉口齒科癌症病因病理的敘述，下列何者錯誤？
(A)其病因複雜，易引發肝、脾、腎等的病理變化
(B)情志不遂，肝脾傷，久則氣滯瘀阻，積結成腫塊
(C)年少早衰，腎精虧損，又為寒邪所犯，漸漸積聚而成癌腫
(D)飲食內傷，過食辛辣及發霉腐敗之品，熱毒蘊積，上升顏頰、咽喉、口腔，結聚而成
- 67 有關耳鼻喉口齒科瘤症的敘述，下列何者正確？
(A)喉瘤：在咽部多生於喉關兩旁和喉結的地方，發病迅速
(B)鼻咽部血管纖維瘤：瘤體長大後，會出現鼻塞、耳鳴、耳聾、耳痛、張口呼吸、吞嚥困難等症，甚則引起視覺障礙
(C)痰包：舌下結腫如包，外表光滑，色淡黃，按之堅硬，如石一般
(D)唇部黏液腺囊腫：為口腔黏膜常見的一種囊腫，一般多發生於上唇
- 68 下列有關耳脹之病因病機敘述何者錯誤？
(A)肝膽經氣不舒，內有鬱熱 (B)風邪侵襲，引動經熱上循
(C)此病因感於濕邪而發者較多 (D)與心腎肝膽之經脈相關連

- 69 耳鳴爲耳聾之漸，但是根據《雜病源流犀燭·二十三卷》提及下列何種情況導致的耳聾，事前並無耳鳴的困擾？
(A)虛閉 (B)火閉 (C)濕閉 (D)氣閉
- 70 因脾氣虛弱所致的鼻淵，可選用何方加北黃耆、澤瀉，以健脾益氣，清利濕濁？
(A)歸脾湯 (B)逍遙散 (C)參苓白朮散 (D)連理湯
- 71 若鼻病症狀表現出鼻塞、嗅覺減退、流黃稠涕、鼻內肌膜紅腫加重、頭痛較劇、頭脹、目眩、胸悶、耳聾等；病理變化爲火熱上亢，循經上熏鼻竅，此爲邪熱壅盛內犯何臟腑所致？
(A)膽 (B)肺 (C)胃 (D)脾
- 72 若小兒因脾胃氣弱，肌膚嬌嫩，易積食化熱，熱上攻熏灼肌膚時，多產生何種小兒鼻病？
(A)鼻塞 (B)鼻疳 (C)鼻衄 (D)鼻軌
- 73 針刺法多用於急性熱性咽喉病，若咽喉腫痛時，常選用下列何組穴位治療？
(A)合谷、魚際 (B)神門、內關 (C)陽陵泉、陰陵泉 (D)液門、中衝
- 74 咽喉乾燥疼痛，如有芒刺，吞嚥困難，或聲音嘶啞爲主要症狀。檢查可見咽喉潰爛，邊緣參差不齊，上附灰黃色污穢腐物者，爲下列何病證？
(A)咽白喉 (B)陰虛喉癰 (C)喉疳 (D)喉癰
- 75 緊喉風呼吸困難的程度分等級，若症候出現唇青面黑，額汗如珠，身汗如雨，甚者四肢厥冷應屬第幾度？
(A)二 (B)三 (C)四 (D)五
- 76 某患者因口腔疾病前來求診，症見牙齒疼痛，呈陣發性，遇風發作，患處得冷則痛減，受熱則痛增，牙齦紅腫，發熱、惡寒、口渴，舌紅、苔白乾，脈浮數。下列敘述何者正確？①牙齒疼痛，牙齦紅腫，係因火鬱牙齦，瘀阻脈絡之故 ②此患者係因風濕之邪外襲，與熱相搏而致諸症 ③宜用薄荷、牛蒡子以疏風清熱 ④宜用金銀花、連翹以清熱解毒
(A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④
- 77 若患者牙齦浮腫，不紅而痛，或牙齦微紅微腫，牙齒浮動，咬物時痛，午後痛加劇者，屬何證型？
(A)陰虛火旺 (B)胃火實熱 (C)脾胃虧損 (D)脾經濕熱
- 78 某7歲男童游泳完後隔天耳朵痛、發燒，檢查發現耳膜穿孔、耳內流膿。下列何者最不可能爲其診斷？
(A)急性化膿性中耳炎 (B)耳瘡 (C)聾耳 (D)膿耳
- 79 眼病如右圖，其病機最可能爲何？



- (A)血寒 (B)血燥 (C)血瘀 (D)血虛
- 80 某患者常覺眼睛疼痛，有局部紫紅色結節隆起於白睛（如下圖）。下列相關敘述何者錯誤？



- (A)症狀輕者，發病稍緩，可有咽痛，苔黃等，宜瀉白散，瀉肺利氣
(B)若病情反覆發作，血絲色偏紫暗，病久傷陰，邪留不去，紫紅結節難退，反覆發作，宜養陰清肺湯加減
(C)若風濕熱邪攻目，結節色較鮮紅，濕熱蘊蒸，宜散風除濕活血湯加減
(D)本病不會波及黑睛