

110年第二次專技高考醫師第一階段考試、牙醫師藥師考試分階段考試、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師考試、110年專技高考職業治療師、呼吸治療師、獸醫師、助產師考試

代 號：4304

類科名稱：牙醫師(二)

科目名稱：牙醫學(四)(包括口腔顎面外科學、牙科放射線學等科目及其相關臨床實例與醫學倫理)

考試時間：1小時

座號：_____

※本科目測驗試題為單一選擇題，請就各選項中選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分!

※注意：本試題禁止使用電子計算器

- 1.慢性阻塞性肺臟疾病的病人接受口腔手術後，下列何者不是常見的併發症？
 - A.肺炎
 - B.肺膨脹不全
 - C.血氧不足
 - D.血碳酸過少
- 2.關於傷口癒合過程中纖維形成期（fibroplastic stage），下列何者錯誤？
 - A.此期傷口強度（wound strength）會迅速增加
 - B.通常會維持2到3星期
 - C.是屬於傷口癒合的第3期
 - D.在纖維形成期結束時，傷口的張力（tension）強度可達到未受傷組織的70%到80%
- 3.若下齒槽神經傷害造成axonal及endoneuron二者之連續性皆喪失，在神經傷害的分類上為：
 - A.neurapraxia
 - B.axonotmesis
 - C.neurotmesis
 - D.paresthesia
- 4.在美國麻醉學會（ASA）的術前麻醉身體狀態的評估上，患者具有嚴重的全身性疾病（severe systemic disease），且經常對生命造成威脅，是屬於第幾級分級？
 - A.ASA III
 - B.ASA IV
 - C.ASA V
 - D.ASA VI
- 5.施行下齒槽神經阻斷麻醉後，病人自述同側眼睛不能完全閉合，最可能原因為何？
 - A.麻藥到達顏面神經（facial nerve）
 - B.麻藥到達動眼神經（oculomotor nerve）
 - C.麻藥到達視神經（optic nerve）
 - D.麻藥到達上顎神經（maxillary nerve）
- 6.局部麻醉針頭斷裂，最不常見的因素為何？
 - A.病人閃躲

- B.使用短針頭
 - C.牙醫師事先將針頭彎曲
 - D.注射時用力過度
- 7.麻醉針最容易斷針的麻醉針型號與注射部位的組合，下列何者正確？
- A.30號短針與下齒槽神經
 - B.27號短針與下齒槽神經
 - C.27號長針與後上齒槽神經
 - D.30號短針與後上齒槽神經
- 8.拔除上顎第一大臼齒應阻斷下列那些神經？①posterior superior alveolar nerve ②middle superior alveolar nerve ③anterior superior alveolar nerve ④anterior palatine nerve ⑤nasopalatine nerve
- A.①②③
 - B.①②④
 - C.①②⑤
 - D.①③④
- 9.施行下顎阻斷麻醉時，最容易傷到那條肌肉而造成病患張口受限？
- A.內翼肌
 - B.外翼肌
 - C.咬肌
 - D.顳肌
- 10.關於拔牙後問題的敘述，下列何者正確？
- A.拔牙後可讓病人咬茶包30分鐘，其內含tannic acid為局部血管收縮劑
 - B.拔牙後冰敷可以有效消腫
 - C.拔牙後等麻藥退傷口開始感覺疼痛時是使用止痛藥的最佳時機
 - D.拔牙後顏面部瘀血（ecchymosis）會造成病人術後疼痛及感染
- 11.關於阻生齒拔牙後處置的說明，下列何者正確？
- A.冰敷不一定能預防術後腫脹，但病人大抵會覺得舒服
 - B.使用類固醇有許多副作用，不建議使用於預防拔牙術後腫脹
 - C.為預防拔牙術後感染，健康病人亦需使用抗生素
 - D.局部使用抗生素如四環黴素，並無證據顯示可以預防dry socket 發生
- 12.若要拔除牙齒殘根，不包括下列何者？
- A.良好的照明及清楚的術野
 - B.特殊的牙科診療椅
 - C.合適的器械
 - D.良好的止血
- 13.手術拔除下顎埋伏阻生齒，使用下列何種鑽頭可能會造成皮下氣腫？
- A.牙科慢速鑽頭
 - B.牙科高速鑽頭

C.手術電動鑽頭

D.手術氣動鑽頭

14.病人因齒源性感染投予penicillin治療，3天後不見改善時，常使用下列何種較廣效的抗生素？

A.augmentin

B.erythromycin

C.metronidazole

D.vancomycin

15.與下顎牙齒感染相關的deep fascial space為下列何者？

A.superficial temporal space

B.infraorbital space

C.maxillary sinuses

D.cavernous sinus thrombosis

16.急診病患主訴4天前右下顎智齒區附近的牙周組織隱隱作痛，至昨天更形嚴重且張口困難，口腔檢查發現右下顎智齒附近的牙周組織發炎，右側臉部位外觀變得腫脹疼痛，且病人有中度到重度的牙關緊閉的症狀，推斷為齒源性感染，其感染部位應在何處？

A.顎下間隙（submandibular space）

B.舌下間隙（sublingual space）

C.頰肌間隙（buccal space）

D.咬肌下間隙（submasseteric space）

17.25歲男性病人主訴下唇疼痛已有數天，如圖所示，下列何者是最可能造成的原因？



A.燙傷

B.免疫力降低

C.藥物灼傷

D.梅毒感染

18.75歲女病人有長期服用抗骨質疏鬆的藥物，抱怨拔牙後兩個月其左上顎牙齦區有潰爛性腫大，如下圖所示，請問臨床上下列那一個臆斷的機率比較低？



- A.鱗狀細胞癌
 - B.上顎骨壞死
 - C.口腔鼻竇相通
 - D.惡性小唾液腺腫瘤
- 19.利用骨牽引術增高齒槽骨，最適當的牽引速率為下列何者？
- A.每天拉開1 mm，一天二次
 - B.每天拉開1 mm，一天四次
 - C.每天拉開2 mm，一天二次
 - D.每天拉開2 mm，一天四次
- 20.關於簡單齒槽骨成形術（simple alveoloplasty）的敘述，下列何者錯誤？
- A.若齒槽嵴（alveolar ridge）不平整的地方，可以先翻瓣將不平整的齒槽骨修整好，達到理想齒槽嵴的型態
 - B.齒槽骨修整時，先用骨鉗（rongeur）將大範圍的不平整去除，也可以用修骨頭的牙科磨針（dental bur）來修平，最後再用骨銼（bone file）把所有不平整都修順，來達到牙槽嵴理想的型態
 - C.齒槽骨成形術過程中用生理食鹽水（normal saline）大量沖洗，以避免過熱造成骨頭壞死
 - D.下顎骨頭萎縮後，很容易形成刀緣式齒槽嵴（knife-edge ridge），修形時先從嵴骨（crestal bone）頰側1公分切開翻瓣，翻開後用修骨器械把牙槽嵴修整，然後縫合
- 21.牙科植體離下齒槽神經（inferior alveolar nerve）至少要多少距離？
- A.0.3 mm
 - B.1 mm
 - C.2 mm
 - D.4 mm
- 22.同樣是口腔癌，但針對不同部位的病灶有時會有不同的考量。關於lip cancer的敘述，下列何者錯誤？
- A.通常較容易早期發現，而且致病原因有時跟口腔其他部位的癌症不同（如：陽光曝曬）
 - B.通常需要比較積極的做頸部淋巴廓清術，因為其發生頸部淋巴轉移的機率比其他部位的口腔癌更高
 - C.若早期發現並早期接受手術治療，其五年存活率的表現是好的
 - D.手術缺損的重建可以使用Abbé-Estlander皮瓣術
- 23.病灶在某個區域範圍內有顏色的改變，但表面沒有突出時，稱為下列何者？
- A.痂（crusts）
 - B.斑（macule）

C.鱗屑 (scale)

D.菌斑 (plaque)

24.有關臨床篩檢輔助工具的敘述，下列何者錯誤？

A.一般使用490~510奈米的光波照射組織，利用正常及非正常細胞對於光線的吸收、反射不同來鑑別異生或不正常的細胞

B.因準確度高，可取代臨床檢查，特別是用於篩檢及術後追蹤

C.ViziLite使用前需用1%醋酸漱口，以溶解口腔黏膜表面的醣蛋白，再以白光照射，肉眼可見差異

D.VELscope使用螢光照射，正常組織顯示為淺綠色，異常組織顯示為深棕色或黑色

25.關於顎骨黏液瘤 (myxoma) 之敘述，下列何者錯誤？

A.放射線影像常見腫瘤會將牙齒推開或牙根吸收

B.放射線影像呈現網球拍狀 (tennis racket)

C.治療原則以手術為主

D.復發率低，手術採刮除術 (curettage) 即可

26.上顎骨惡性腫瘤手術時，最常使用的切線稱為：

A.唇頰切開法 (Lip-cheek incision)

B.韋伯－弗格森切開法 (Weber-Fergusson incision)

C.李士敦切開法 (Risdon incision)

D.梯階切開法 (Step incision)

27.施行造袋術 (marsupialization) 來治療顎骨囊腫的病變，下列何者為其缺點？

A.囊腫復發率極高

B.傷口較大且病患腫痛較明顯

C.手術操作複雜且費時

D.無法取得整體組織進行病理學檢查

28.關於完全角化齒源性角化囊腫 (orthokeratinized odontogenic keratocyst) 的敘述，下列何者錯誤？

A.與含齒囊腫 (dentigerous cyst) 相似，也都會有伴隨著未萌發齒

B.復發性不高

C.在X光片下，大多是呈現多房性 (multilocular) 的放射性透光病灶

D.剝出術 (enucleation) 加上刮除術 (curettage) 是很好的治療選擇

29.關於根尖囊腫 (radicular cyst) 的敘述，下列何者錯誤？

A.是顎骨中最好發的囊腫病灶

B.主要是牙髓發炎感染後所引起之續發症

C.最好的治療是刮除術 (curettage)

D.有時在根管治療後亦無法痊癒

30.齒源性角化囊腫的患者同時合併有肋骨分岐的症狀群時，發生下列何種癌症機率較高？

A.鱗狀細胞癌

B.乳癌

C.基底細胞癌

D.子宮頸癌

31.下列何種疾病，最不可能出現多發性囊腫？

- A.鎖顱骨成骨不全（cleidocranial dysostosis）
- B.戈林－高茲症候群（Gorlin-Goltz syndrome）
- C.牙本質發育不良（dentin dysplasia）
- D.牙釉質發育不全（enamel hypoplasia）

32.對下顎骨發育不足（mandible deficiency），正顎手術最常施行之術式為何？

- A.口內雙側垂直下顎枝切開術（bilateral vertical ramus osteotomy，BVRO）
- B.雙側矢向分裂骨切開術（bilateral sagittal split osteotomy，BSSO）
- C.頰成形術（genioplasty）
- D.勒福一型截骨術（Le Fort I osteotomy）

33.對於顎骨過度發育（excessive growth）的病例，正顎手術（orthognathic surgery）最適合開刀之時機為下列何者？

- A.發育停止後
- B.發育停止前
- C.隨時都可
- D.一定要在發育停止3～5年後

34.為降低 bilateral sagittal split osteotomy 發生不利骨折的情形，有關下顎阻生智齒之處置，下列敘述何者正確？

- A.至少是手術前6個月即拔除智齒
- B.最好是術中拔
- C.最好不要拔
- D.最好術後6個月拔

35.下列何者是 ergots 用來治療偏頭痛的主要機轉？

- A.鎮靜作用
- B.血管收縮作用
- C.血管擴張作用
- D.抑制前列腺素作用

36.關於顳顎關節盤之不可復位前移（anterior disc displacement without reduction）的敘述，下列何者錯誤？

- A.在 Wilkes 分類中屬於第3期
- B.常見張口範圍變小
- C.無法聽見彈響（click）
- D.張口時，下巴會向正常側偏移

37.有關TMJ關節內紊亂（internal derangement）之敘述，下列何者錯誤？

- A.Wilkes 分類中，第1期即有TMJ clicking sound
- B.出現輾軋音（crepitus），在 Wilkes 分類中屬於late stage
- C.電腦斷層是用以評估TMJ internal derangement的建議影像檢查
- D.建議一開始宜採保守性（非手術性）治療


38.關於人體口腔主唾液腺管Stensen duct的敘述，下列何者錯誤？

- A.腺管長度約12公分，直徑約0.2至0.6公分，最狹窄處常伴隨著結石發生
- B.為腮腺的主腺管，其路徑有時會出現副腮腺管協助唾液分泌物排出
- C.經咬肌的表面及前緣處，腺管內彎穿過頰肌後進入口腔
- D.開口位於上顎第一或第二大臼齒附近的頰黏膜處


39.對於黏液表皮樣瘤（mucoepidermoid carcinoma）的敘述，下列何者正確？

- A.為第二常見的唾液腺惡性腫瘤，平均發生年齡為65歲
- B.佔所有主唾液腺腫瘤的70%，主要影響位置在顎下腺
- C.佔所有小唾液腺腫瘤的20%，主要影響位置在腭側部位
- D.組織病理分類為高度（high grade）的病灶，術後復發機率較低

40.55歲具糖尿病病史且有抽菸習慣的患者，因左側上顎第一大臼齒疼痛，患者於三週前在診所局部麻醉下接受根管治療；來醫院求診主要的原因，是在其口腔內靠近左側後方硬腭區，近幾日出現直徑約一點五公分的疼痛性潰瘍，口腔內照片如圖一所示，經手術切片後病理組織圖如圖二所示。綜合以上敘述，此疾病最可能的診斷為下列何者？



圖一



圖二

- A.謝格連氏症（Sjögren's syndrome）
- B.壞死性涎腺變生（necrotizing sialometaplasia）
- C.鱗狀細胞癌
- D.小唾液腺結石

41.六歲兒童發生單側關節囊內髁頭骨折（intracapsular condylar fracture），下列處理何者最適當？

- A.休息數天後開始功能性治療（functional treatment）
- B.閉合性處理（closed treatment），上下顎間固定1~2周
- C.閉合性處理（closed treatment），上下顎間固定2~4周
- D.開放性復位手術

42. 下顎骨折，骨折線從第二大臼齒前方往下延伸並垂直於下顎下緣，下列敘述何者正確？
- A. 是有利性骨折（favorable fracture），容易移位，傾向閉合性復位（closed reduction）
 - B. 是有利性骨折，不易移位，傾向開放性復位（open reduction）
 - C. 是不利性骨折（unfavorable fracture），容易移位，傾向開放性復位（open reduction）
 - D. 是不利性骨折，不易移位，傾向閉合性復位（closed reduction）
43. 下列何種顏面顎骨外傷最可能會造成上呼吸道阻塞？
- A. LeFort I骨折
 - B. 兩側下顎骨髁頭骨折
 - C. 兩側下顎骨骨體骨折
 - D. LeFort II骨折
44. 經過手術修補後，部分唇腭裂患者講話會有鼻音，可能是下列何種因素導致？
- A. 咽帆閉鎖不全（velopharyngeal incompetence）
 - B. 舌頭肥大（tongue hypertrophy）
 - C. 前牙缺失
 - D. 鼻中隔彎曲（nasal septum deviation）
45. 一位2歲腭裂（cleft palate）患者計劃施行骨移植（bone graft）手術修補骨缺損，考量可取得之骨量及後遺症，應選擇那種供給部位（donor site）較適當？
- A. 肋骨（rib）
 - B. 腸骨脊（iliac crest）
 - C. 頭頂骨（calvarial bone）
 - D. 脛骨近端（proximal tibia）
46. 病人若有心肌缺血或梗塞（myocardial ischemia or infarction）時，下列何者為可能呈現的症狀？
- A. 胸部有沉重擠壓感覺
 - B. 不適感源自胸骨的表面
 - C. 不適感輻射至右肩和臂部
 - D. 不適感輻射至右頸和下顎
47. 下列那一種情況適用平躺姿勢及雙腳抬高？
- A. 哮喘（asthma）
 - B. 換氣過度症候群（hyperventilation）
 - C. 慢性阻塞性肺病（chronic obstructive pulmonary disease）
 - D. 血管迷走性暈厥（vasovagal syncope）
48. 一位以躺姿正接受牙科治療的病患，突然自行起來呈坐姿，可見焦慮、呼吸急促、呼吸有雜音、呼吸困難及心跳過速，其最可能發生的疾病為下列何項？
- A. 缺血性心臟病（ischemic heart disease）
 - B. 腦血管意外（cerebrovascular accident）
 - C. 哮喘（asthma）
 - D. 充血性心臟衰竭（congestive heart failure）

49.腎功能衰竭（renal failure）病人需要接受口腔手術時，下列何者正確？

- A.動靜脈分路（atrioventricular shunt）為例行靜脈注射進針處
- B.選擇性外科手術（elective surgery）最好安排在洗腎後第三天
- C.嚴重腎功能衰竭病人可用非類固醇抗發炎藥物（nonsteroidal anti-inflammatory drugs）
- D.注意發生繼發性副甲狀腺功能亢進症（secondary hyperparathyroidism）

50.關於肉毒桿菌毒素（botulinum toxin）敘述，何者錯誤？

- A.為一種神經毒（neurotoxin）
- B.可以阻斷acetylcholine在神經肌肉交接處（neuromuscular junction）的釋放
- C.為*Clostridium botulinum*細菌所產生
- D.不需要常常施打，可以一勞永逸

51.關於髌切斷術的敘述，下列何者錯誤？

- A.不需要使用鋼絲和金屬骨釘固定
- B.與垂直枝切斷術（vertical ramus osteotomy）相同，都需要中間植入物
- C.最主要用以治療可復位或不可復位關節盤異位（disk displacement with or without reduction）
- D.可用於治療顳顎關節退化性關節炎及半脫臼

52.關於顳顎關節全置換（total joint replacement），下列何者正確？

- A.術後需要張口練習，減少黏連的疤痕反應
- B.術後髌頭仍有平移（translate）的運動
- C.術後仍有前突（protrusive）的運動
- D.術後仍有滑移（excursive）運動

53.低劑量抗憂鬱症藥物（如tricyclic），可以用於治療顳顎關節疾病，下列敘述何者錯誤？

- A.可以抑制疼痛傳導物質serotonin的再吸收
- B.無法減緩夜間磨牙
- C.睡前服用amitriptyline（Elavil）10～25mg，可以改善睡眠
- D.可以減緩顳顎關節疼痛

54.關於牙醫門診手術及麻醉同意書的內容，下列何者正確？

- A.醫療機構應於病人簽具手術及麻醉同意書後兩個月內，施行手術，超過兩個月應重新簽具同意書，簽具手術及麻醉同意書後病情發生變化者，亦同
- B.醫療機構為病人施行手術後，如有再度為病人施行相同手術之必要者，則不需重新簽具同意書
- C.簽具手術及麻醉同意書時，若病人不識字，得以按指印代替簽名，惟應有兩名見證人於指印旁簽名
- D.病人接受局部或全身麻醉手術時，需簽具同意書，若麻醉方式為鎮靜術時，則不需簽具同意書

55.根據這張頭部X光片請選出正確的檢查名稱？



- A. Towne view
- B. Water view
- C. submental vertex view
- D. oblique view

56. 承上題，請問這是屬於何種型式的骨折？

- A. favorable fracture
- B. greenstick fracture
- C. compressive fracture
- D. comminuted fracture

57. 造成牙科X光光束衰減（beam attenuation）的原因，不包括下列何者？

- A. coherent scattering
- B. photoelectric absorption
- C. Compton scattering
- D. Curie scattering

58. 下列有關放射線劑量當量（equivalent dose）之敘述何者錯誤？

- A. SI unit為joules/kg
- B. 其單位名稱為格雷（Gray）
- C. 其與放射線種類有關
- D. 其為輻射吸收劑量乘上輻射加權因子

59. 曝露量1倫琴（R，coulombs/kg）約等於多少air kerma（kinetic energy released in matter）？

- A. 8.73 Gy
- B. 8.73 mGy
- C. 8.73 cGy
- D. 8.73 dGy

- 60.在拍攝口腔X光片時，會請病人將眼鏡取下，其最主要的原因為下列何者？
- A.避免出現不必要的影像而干擾判讀
 - B.考量病人的舒適度
 - C.預防在拍攝過程中產生意外
 - D.眼鏡可能在X光機拍攝進行中造成干擾
- 61.關於拍攝口腔根尖片的理想品質標準（ideal quality criteria），下列敘述何者錯誤？
- A.影像不要有錐切（cone-cutting）
 - B.根尖至少要有1~2 mm的骨頭結構
 - C.拍攝條件須一致，以利於比較前後次拍攝的影像
 - D.牙齒的鄰接面沒有重疊
- 62.最常用於第一線篩檢顫顎關節疾病的放射線攝影方法為下列何者？
- A.關節造影術（arthrography）
 - B.環口放射線攝影術（panoramic radiography）
 - C.電腦斷層攝影術（computerized tomography）
 - D.顫顎關節斷層攝影術（TMJ tomography）
- 63.下列何者較不屬於環口放射線攝影法（panoramic radiography）的適用範圍？
- A.6歲以下兒童
 - B.評估大範圍的顎骨病變
 - C.張口受限的病人
 - D.比較左右兩邊的顫顎關節
- 64.附圖中白色箭頭所指部位為下列何者之影像？




- A.鼻唇皺摺
- B.下嘴唇

C.上嘴唇

D.X光片刮痕

65.附圖根尖X光片中，白色箭頭所指為何種構造？




A.zygomatic process of the maxilla

B.styloid process

C.retained root fragment

D.inferior border of maxillary sinus

66.附圖之X光影像中黑色長箭頭所指的病變，最有可能為下列何者？



- A. 骨瘤 (osteoma)
- B. 骨化纖維瘤 (ossifying fibroma)
- C. 牙雙生 (gemination of teeth)
- D. 骨性迷離瘤 (osseous choristoma)

67. 56歲男性因缺牙來求診，經X光檢查如附圖所示，此病患最可能罹患下列何種疾病？



- A. 鎖顱骨成骨不全 (cleidocranial dysplasia)
- B. 外胚層發育異常 (ectodermal dysplasia)
- C. 牙骨質骨發育不良 (cemento-osseous dysplasia)
- D. 浦茲-詹賀症候群 (Peutz-Jeghers syndrome)


68. 關於osteomyelitis之影像學特徵，下列敘述何者錯誤？

- A. 可能有moth-eaten appearance
- B. 可能出現sequestrum

C. acute suppurative osteomyelitis : well-defined periphery with a loss of internal trabeculae

D. Garré's osteomyelitis : radiopaque lines similar to onion skin

69. 65歲男性因缺牙要求植牙，口內無不適或異常，且無其他系統性疾病。X光檢查如圖，下列敘述何者錯誤？



A. 左下顎有一單房性界限清晰之放射線透過性（radiolucent）病灶

B. 左下顎神經管（mandibular canal）向上位移

C. 建議他作cone beam CT檢查

D. 可以建議他作切片檢查

70. 一位小女孩因左下顎腫脹來就診，其X光影像如圖，請問下列診斷何者最可能？




A. 成纖維性造釉細胞瘤（desmoplastic ameloblastoma）

B. 造釉細胞纖維瘤（ameloblastic fibroma）

C. 造釉細胞纖維齒瘤（ameloblastic fibro-odontoma）

D. 含牙囊腫併有腐骨（dentigerous cyst with sequestrum）

71. 附圖中X光影像所顯示的顎骨異常，下列敘述何者錯誤？




- A. 短箭頭所指為osteophyte
- B. 長箭頭所指的構造，常稱為" joint mouse"
- C. 此一顳顎關節異常，又可稱為" bifid condyle"
- D. 此X光影像為sagittal tomogram of TMJ

72. 下列放射線影像何者較不易用來診斷coronoid hyperplasia ?

- A. panoramic radiography
- B. Waters' view radiography
- C. CBCT image
- D. PA-view cephalogram

73. 附圖中箭頭所指病變之最可能診斷為何？




- A. 伊格爾症候群 (Eagle syndrome)
- B. 涎石 (sialolith)
- C. 唾腺管囊腫 (salivary duct cyst)
- D. 謝格連氏症候群 (Sjogren's syndrome)

74. 下列何者為圖中左下第一大臼齒牙根尖病灶之最適切診斷？




- A. 牙骨質骨發育不良 (cemento-osseous dysplasia)
- B. 造牙骨質細胞瘤 (cementoblastoma)
- C. 凝聚性骨炎 (condensing osteitis)
- D. 骨化纖維瘤 (ossifying fibroma)

75. 下列何者為附圖圓圈中心點病變影像之最適切診斷？



- A. 齲齒 (dental caries)
 - B. 咬耗 (attrition)
 - C. 磨耗 (abrasion)
 - D. 齒頸部照蝕 (cervical burnout)
76. 標準版第三版Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) 的影像儲存採用下列那一種格式？
- A. TIFF (tagged image file format)
 - B. BMP (bitmap)
 - C. JPEG (joint photographic experts group)
 - D. PNG (portable network graphics)
77. 因口腔周圍接受放射線治療造成的味覺喪失，其全部恢復期至少需時多久？
- A. 1個月
 - B. 2~4個月
 - C. 6~9個月
 - D. 一年以上
78. 請依所附圖示影像，依序回答下列3題。



圖示影像是以何種方法拍攝？

- A.magnetic resonance imaging
- B.occlusal radiography
- C.panoramic radiography
- D.cone beam computed tomography

79.附圖中黑色箭頭所指解剖位置為何？

- A.上顎腭側
- B.上顎頰側
- C.下顎舌側
- D.下顎頰側

80.附圖中黑色箭頭所指病變最可能的診斷為下列何者？

- A.牙瘤 (odontoma)
- B.下顎外生贅骨 (mandibular exostoses)
- C.腭隆凸 (palatinus torus)
- D.造牙骨質細胞瘤 (cementoblastoma)