

103年第二次專門職業及技術人員高等考試牙醫師考試分階段考試、藥師、醫事檢驗師、醫事放射師、助產師、物理治療師、職能治療師、呼吸治療師、獸醫師考試

代 號：3304

類科名稱：助產師

科目名稱：各科護理學（包括內外科、兒科、精神科與社區衛生護理學）

考試時間：1小時

座號：_____

※注意：本試題禁止使用電子計算器

1. 缺血性腦中風病人口服 Aspirin 100 mg 1# QD 治療的主要目的，下列何者正確？
 - A. 解熱鎮痛
 - B. 降顱內壓
 - C. 降高血壓
 - D. 抗血小板凝集
2. 有關腦震盪併發顱內壓升高的護理措施，下列何者正確？
 - A. 採集中式護理，以免過度打擾病人休息
 - B. 鼓勵每小時執行咳嗽一次
 - C. 將床頭抬高 30°，避免伏臥
 - D. 鼓勵 Valsalva 氏活動，以促進身體機能恢復
3. 張先生右上腹劇烈疼痛，且有腹瀉，糞便外觀油膩，深觸診右上腹部深吸氣時有劇烈疼痛感，下列何者為最可能之診斷？
 - A. 闌尾炎
 - B. 十二指腸潰瘍
 - C. 脾腫大
 - D. 急性膽囊炎
4. 關於食道靜脈曲張病人之藥物治療，下列敘述何者正確？
 - A. Propranolol (Inderal) 是 β 阻斷劑，可減少出血的危險性
 - B. Ranitidine 是 H_2 接受器拮抗劑，可增加胃液分泌
 - C. Somatostatin 可使血管平滑肌收縮，但易造成心肌梗塞
 - D. Vasopressin 控制出血效果好且無血管收縮之副作用
5. 關於退化性關節炎之敘述，下列何者錯誤？
 - A. 是一種發炎性關節病變
 - B. 僵硬的症狀通常發生在清晨或休息一段時間後
 - C. 葡萄糖胺及玻尿酸為常見的治療藥物
 - D. 嚴重者可接受關節置換手術
6. 服用毛地黃病人之護理照護，下列何者錯誤？
 - A. 病人的鉀離子過高時，容易發生毛地黃中毒徵象
 - B. 腎廓清率下降的病人，應注意觀察毛地黃中毒徵象
 - C. 應注意觀察病人有無噁心、嘔吐、腹瀉等藥物過量徵象
 - D. 當病人心尖脈低於 60 次／分鐘時，應暫時予以停藥
7. 下列何者是鬱血性心臟衰竭病人使用利尿劑之目的？
 - A. 增加前負荷，以增加心輸出量
 - B. 降低前負荷，以減少心肌負荷
 - C. 降低後負荷，以減少心肌負荷
 - D. 改善腎臟灌流情形
8. 缺鐵性貧血病人長期口服鐵劑之衛教，下列何者不適當？
 - A. 口服鐵劑時避免飲用果汁
 - B. 服用鐵劑後糞便顏色會變黑
 - C. 宜在兩餐間口服鐵劑
 - D. 不可與牛奶共食
9. 腫瘤溶解症候群 (Tumor Lysis syndrome) 會造成之電解質不平衡，下列何者錯誤？
 - A. 高尿酸血症
 - B. 高血磷
 - C. 高血鉀
 - D. 高血鈣
10. 燒傷患者進行水療 (hydrotherapy) 處理傷口前，給予肌肉注射止痛劑的最佳時間為何？
 - A. 水療前 1 小時

- B.水療前 30 分鐘
C.水療開始後 15 分鐘
D.水療完成後 15 分鐘
- 11.後天免疫缺乏症候群（AIDS）之傳染途徑，下列何者錯誤？
A.輸血
B.共用飲食餐具
C.母子垂直傳染
D.性行為
- 12.當醫護人員直接觸及愛滋病患者體液時，下列處理步驟何者最優先？
A.立即抽血檢查
B.立即給予預防性抗生素治療
C.以 0.6%漂白水擦拭污染部位
D.以大量清水沖洗污染部位
- 13.心衰竭引起滲出性肋膜積水（transudative pleural effusion）的主要機轉，下列何者正確？
A.血管通透性增加
B.淋巴系統清除功能下降
C.血管液體靜力壓增加
D.血液流入肋膜腔
- 14.關於體液容積過多的臨床表徵，下列何者錯誤？
A.中心靜脈壓上升
B.血清鈉升高
C.體重增加
D.呼吸短促
- 15.病人血清鉀 6.5 mEq/L 時，下列處置何者錯誤？
A.靜脈注射短效胰島素及葡萄糖溶液
B.靜脈注射 KCl
C.口服或灌腸給予 Kayexalate
D.避免攝食柑橘、香蕉
- 16.有關糖尿病酮酸中毒之醫療處置與護理措施，下列何者錯誤？
A.補充液體
B.將 RI 加入大量點滴滴注
C.將 NPH 加入大量點滴滴注
D.使用 NaHCO_3 改善嚴重酸血症
- 17.關於敗血性休克病人的評估，下列何者需立即處理？
A.血壓 88 / 54 mmHg
B.心尖脈 110 次／分鐘
C.尿液排出量四小時 40 c.c.
D.動脈血氧飽和濃度 90%
- 18.有關毒蛇咬傷之處理，下列何者正確？
A.咬傷肢體高度低於心臟
B.若疼痛給予 Aspirin 類止痛劑
C.傷口以酒精及優碘消毒
D.冰敷及壓迫包紮患部以消腫
- 19.有關臺灣目前已實施汽車兒童安全座椅新制之敘述，下列何者錯誤？
A.出生六個月內的嬰兒，頭頸部脆弱，必須使用平躺式車用嬰兒座椅
B.年齡在一歲以內的嬰兒，嬰兒用座椅可放置在車輛之前座以安全帶協助固定
C.年齡在一歲至四歲以下，且體重在十至十八公斤之間的幼童，應該坐在車輛後座之兒童用座椅
D.年齡在四歲至十二歲以下，或體重在十八至三十六公斤之間的兒童，應該坐在車輛後座並妥適使用安全帶
- 20.有關哺餵母乳的敘述，下列何者錯誤？
A.初乳含腸道乳糖細菌生長要素，應儘早餵食
B.母乳中含有 IgA，可提供嬰兒天然被動免疫能力
C.母乳中含有較多的酪蛋白，可促進嬰兒腦部發育
D.可以促進母親分泌催產素（oxytocin），以利子宮收縮
- 21.下列何種狀況之嬰兒仍可以接種卡介苗（BCG）的預防注射？

- A.體重 2400 公克的嬰兒
B.體重 2500 公克的發燒嬰兒
C.體重 2600 公克罹患法洛式四重畸形（TOF）的嬰兒
D.體重 2700 公克接種過 B 型肝炎免疫球蛋白（HBIG）的嬰兒
- 22.有關兒童身高與體重的生長評估標準，下列敘述何者錯誤？
A.嬰兒滿六個月時其體重約為出生時的 2 倍
B.嬰兒滿週歲時其體重約為出生時的 4 倍
C.兩歲時身高約為成人的一半
D.四歲時身高約為出生身長長的 2 倍
- 23.執行巴賓斯基氏反射（Babinski's reflex）檢查，當嬰兒的足部呈現下列何種現象時，可判讀為「陽性」反應？
A.大拇趾曲屈，其餘四趾如扇形般張開
B.大拇趾曲屈，其餘四趾緊閉在一起
C.大拇趾背屈，其餘四趾如扇形般張開
D.大拇趾背屈，其餘四趾緊閉在一起
- 24.下列何者不是維持極低出生體重兒（very low birth weight，VLBW）體溫穩定的方法？
A.出生後應立即擦乾身體並包裹溫暖毛毯
B.宜置放於加熱處理台，長期持續保溫
C.應置於加熱處理台，溫度控制設在自動調節
D.為防止熱經由對流散失，應優先使用雙壁保溫箱
- 25.下列何者不是胎便吸入症候群（meconium aspiration syndrome，MAS）的危險因素？
A.羊水過少
B.早產兒（<34週）
C.胎兒窘迫
D.臀產式兒
- 26.吳小弟出生第 2 天出現黃疸症狀，經血液檢查結果，吳媽媽血型為 O 型 Rh(+)，吳小弟為 A 型 Rh(+)，如果吳小弟需要換血治療，下列那種血液適用於吳小弟？
A.A 型 Rh(+)
B.A 型 Rh(-)
C.O 型 Rh(+)
D.O 型 Rh(-)
- 27.一位早產兒使用呼吸器中，已連續 24 小時 $FiO_2 = 35\%$ ，故醫囑停止使用呼吸器，在拔除氣管內管後 24 小時內，最佳的給氧方式為何？
A.鼻導管持續性呼吸道正壓呼吸法（CPAP）
B.鼻咽導管（nasal pharyngeal catheter）
C.部分呼吸氧氣面罩（partial rebreather mask）
D.氧氣頭罩（oxygen hood）
- 28.罹患呼吸窘迫症候群的新生兒，使用人工表面張力素 Surfacta 治療時，可能會出現下列何種合併症？
A.動脈導管重新開放
B.支氣管肺炎
C.凝血機能障礙
D.低血鉀症
- 29.有關新生兒敗血症的敘述，下列何者正確？
A.早期常出現體溫過高及黃疸現象
B.白血球計數 $> 5000 /mm^3$
C.C反應性蛋白質（CRP） $> 5 mm$
D.肝蛋白（hepatoglobin） $< 200 mg/dL$
- 30.護理人員在健兒門診幫 10 個月大的丁小妹做頭部評估，下列評估結果何者正確？
A.前凶門呈現菱形屬於異常現象
B.後凶門約 4~5 公分寬是正常現象
C.輕觸摸後凶門已關閉是正常現象
D.用力哭鬧時摸到前凶門微凸屬異常現象
- 31.最常引起嬰幼兒哮喘（croup）的致病原為何？
A.細菌
B.病毒

- C.原蟲
D.灰塵
- 32.為3歲的小明進行丹佛嬰幼兒發展篩檢測驗（DDST），應向母親解釋此發展測驗的目的是為了篩檢那些層面的發展：
- A.智力、認知、運動及自我概念的發展
B.情緒、社會心理、性別角色及道德的發展
C.社會適應能力、精細動作、粗動作及語言的發展
D.嬰幼兒氣質型態
- 33.王小妹，唇顎裂的新生兒，於新生兒加護病房接受照護中，她媽媽只探視過一次，其他家屬也都甚少探視，下列何項護理措施應優先考量？
- A.瞭解家庭面對王小妹治療的決策者是誰
B.鼓勵家屬表達對王小妹罹病的感受
C.教導家屬有關王小妹的特殊照顧技巧
D.提供唇顎裂的支持團體資訊給家屬
- 34.有關腦性麻痺兒童之敘述，下列何者錯誤？
- A.大動作發展遲緩
B.是進行性神經功能障礙
C.會合併語言障礙
D.是中樞神經受到永久的傷害
- 35.對於膽道閉鎖（biliary atresia）的嬰兒，下列飲食指導何者最適當？
- A.需補充水溶性維生素
B.食用高纖維食物
C.食用中鏈脂肪酸配方奶，如哺力美（Pregestimil）
D.食用含鉀高的食物
- 36.王太太已懷孕 20 週，向護理師表示：「昨日去買嬰兒用品的路上，突然心跳加快、喘不過氣、呼吸困難、感到非常焦慮和極度的害怕、沒辦法控制自己的身體並且感覺自己會很快死掉。」上述為何種症狀？
- A.焦慮
B.無欣快感
C.激動
D.恐慌
- 37.林小姐和男友分手後，發現自己已懷孕六週，母親發現林小姐開始對原來有興趣的事都不再感興趣了，不再出去和朋友爬山，每天都待在家裡不和任何人互動。林小姐較可能為下列何種情緒障礙？
- A.不悅心情（dysphoric mood）
B.焦慮心情（anxiety）
C.無欣快感（anhedonia）
D.淡漠心情（apathy）
- 38.張護理師擔任媽媽教室的團體領導者，當成員李太太提到剛知道懷孕時，心情很矛盾，一方面感到快樂，另一方面覺得寶寶來的不是時候，會影響自己的事業，李太太覺得自己的想法有點罪惡。依據耶隆（Yalom）所提出的『共通性（universality）』療效因子，張護理師的回應下列何項較適切？
- A.你的想法是正常的
B.不知道有沒有其他媽媽也有類似經驗？
C.不知道這跟你的家庭關係是否有關？
D.這種感覺曾經發生在你母親跟你之間嗎？
- 39.陳小姐一入院就大肆宣稱自己是張天師轉世，只要唸咒語就能治病，認為自己有無比的神力，此為下列那一種症狀？
- A.性愛妄想
B.意念飛躍
C.情緒高昂
D.誇大妄想
- 40.有關患者服用選擇性血清素回收抑制劑（selective serotonin reuptake inhibitors，SSRI），下列敘述何者正確？
- A.多數 SSRI 藥物，最好三餐飯前空腹時使用
B.首次服用 SSRI 後，二至三天可見明顯療效

- C.建議患者應該睡前服用 SSRI 藥物，可以助眠
D.比三環抗鬱劑，SSRI 較少出現抗膽鹼副作用
- 41.有關每年可接受全民健保成人預防保健服務之對象，下列何者錯誤？
A.65 歲以上一般民眾
B.40 歲至 64 歲之一般民眾
C.55 歲以上之原住民
D.35 歲以上小兒麻痺患者
- 42.有關我國目前後天免疫缺乏症候群的敘述，下列何者錯誤？
A.「不安全性行為」為年輕族群的主要傳染途徑
B.受感染之患者有可能無任何明顯之臨床症狀
C.罹患後天免疫缺乏症候群之產婦不宜哺乳
D.目前尚未列入免費產前檢查之項目
- 43.死因別死亡率為一個國家社會、經濟和衛生的綜合指標，使用單位為 10^5 ($^0/_{0000}$)。某地區 2005 年年中人口數為 10,000 人，而當年的肺結核患者為 50 人，全年內死亡總人數為 100 人，其中因肺結核死亡者共 5 人，該地區肺結核的死亡率為何？
A.50/100,000
B.50/10,000
C.50/1,000
D.5/100,000
- 44.學校衛生護士發現一學生得到登革熱，第一步處理的步驟為何？
A.採集檢體
B.環境消毒
C.預防投藥
D.報告衛生機關
- 45.在流行病學研究中，與「人」相關的因素中，下列何者最為重要？
A.遺傳
B.職業
C.性別
D.年齡
- 46.依據國民健康署目前的公告標準，下列何者為代謝症候群個案？
A.靳先生 38 歲，腰圍 93 cm，血壓 137/88 mmHg，三酸甘油酯 168 mg/dL
B.臧小姐 58 歲，腰圍 78 cm，飯前血糖 105 mg/dL，HDL-C 45 mg/dL
C.范姜太太 88 歲，腰圍 75 cm，血壓 128/78 mmHg，飯前血糖 107 mg/dL
D.李先生 20 歲，腰圍 90 cm，飯前血糖 101 mg/dL，三酸甘油酯 140 mg/dL
- 47.世界衛生組織所提「健康社區」的特徵，下列何者錯誤？
A.社區居民有高度公民意識及社區參與
B.社區居民有互助合作的概念
C.社區內能提供健康食物
D.社區居民不再發生疾病
- 48.有關焦點團體法的優點，下列敘述何者錯誤？
A.獲得資料比個別訪談快速且低成本
B.使資料收集者有機會充分表達意見
C.不同背景的參與者可同時檢視議題
D.使參與者可以直接回應彼此的看法
- 49.為加強外籍配偶的健康照護，下列措施何者錯誤？
A.強調以個案為單位的照護
B.尊重個案的文化價值
C.發展多國語文版本的衛生教育手冊
D.建立正確飲食觀念
- 50.張太太懷孕第 24 週，有下肢水腫現象，下列建議事項何者正確？
A.限鹽
B.限水
C.保暖
D.穿彈性束襪