

115 年第二次專技高考醫師中醫師第一階段考試、牙醫師藥師考試分
階段考試、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師考試、115 年專技
高考職能治療師、呼吸治療師、獸醫師、助產師考試

代 號：3310

類科名稱：助產師

科目名稱：各科護理學（包括內外科、兒科、精神科與社區衛生護理學）

考試時間：1 小時

座號：_____

※注意：本試題禁止使用電子計算器

※本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當答案。

1. 下列何者是腦膜炎會出現的徵象？①巴特爾氏徵象（Battle's sign） ②布魯辛斯基氏徵象（Brudzinski sign） ③克尼格氏徵象（Kernig sign） ④頸部僵硬（nuchal rigidity）
A. ①②③
B. ①②④
C. ①③④
D. ②③④
2. 有關腸阻塞的敘述，下列何者正確？
A. 腹部膨脹常見於小腸上段阻塞的病人
B. 易產生脫水、低鉀、低鈉而造成低血壓
C. 手術治療是首要的處置方式
D. 鼓勵病人採低纖維飲食減緩腹痛
3. 膽結石病人經內視鏡取石術後之護理措施，下列何者正確？
A. 多攝取乳酪、全脂牛奶補充熱量
B. 建議使用鹼性香皂減少皮膚搔癢
C. 應使用 morphine 緩解術後疼痛
D. 口服 cholestyramine 可減少膽鹽再吸收
4. 有關腕隧道症候群的敘述，下列何者正確？
A. 通常在晨起時疼痛最厲害
B. 發生的年齡層以 20～30 歲男性居多
C. 直接於關節注射 aspirin 可緩解疼痛
D. 一般是正中神經受壓迫引起
5. 有關心肌梗塞病人的護理指導，下列何者錯誤？
A. 避免在用餐後立即運動

- B.鼓勵從事等長運動
 - C.運動前先做 10~15 分鐘暖身
 - D.一般發病後 4~8 週可恢復性活動
- 6.有關高血壓病人的護理指導，下列何者錯誤？
- A.教導或轉介病人使其進行戒菸
 - B.鼓勵病人少吃高鹽分與醃漬食物
 - C.每日應測量血壓並自行調整藥物劑量
 - D.依據病人個別狀況培養運動習慣
- 7.艾倫氏試驗（Allen' s Test）是測試下列何者的通暢性？
- A.足背動脈
 - B.後脛動脈
 - C.肱動脈
 - D.尺動脈
- 8.有關白血病患血小板減少之護理措施，下列何者不適宜？
- A.建議病人使用牙線
 - B.避免肌肉注射
 - C.須注意是否有血壓降低與脈搏加快的情形
 - D.血小板數目低於 $20,000/\text{mm}^3$ 應報告醫師
- 9.蔡女士正處於類風濕性關節炎急性期，下列護理指導何者不適宜？
- A.解釋目前因處於急性期，關節紅腫熱痛需臥床休息
 - B.說明臥床時需平躺於硬床墊上，膝關節下方勿放枕頭
 - C.教導關節儘可能伸展，並用毛巾捲軸避免肢體外旋
 - D.鼓勵在患部按摩及使用熱敷袋，以減輕疼痛與肌肉痙攣
- 10.有關後天免疫缺乏症候群（AIDS）病人之護理重點，下列何者正確？
- A.臥床休息，勿下床走動以保存體力
 - B.使用鹼性、高殺菌性清潔劑清潔皮膚，維持皮膚完整性
 - C.採少量多餐，鼓勵低熱量、低蛋白質、高維生素 D 之飲食
 - D.去除環境危險因子避免受傷
- 11.有關肺腺癌之敘述，下列何者正確？
- A.一種生長非常快速且最惡性的肺癌

B.癌細胞對於化學治療及放射線治療都非常敏感

C.癌細胞會分泌多種荷爾蒙引發內分泌紊亂

D.為非吸菸女性最常見的肺癌

12.下列何者是造成氣喘病人出現哮鳴音及呼吸困難最可能的原因？

A.喉頭攣縮

B.肺水腫

C.呼吸道狹窄

D.肺泡擴張

13.有關懷孕後期婦女尿失禁之護理指導，下列何者正確？

A.此時尿失禁多為上運動神經元受損所致之反射性尿失禁

B.教導婦女於白天時間，可每隔 4~6 小時進行自我導尿

C.教導婦女於如廁時，可用克萊台氏法（Crede's method）

D.教導婦女維持足夠的攝水量且每 1~2 小時如廁一次

14.有關泌尿道感染護理指導之敘述，下列何者正確？

A.教導病人須定時服用抗生素且完成所需療程

B.教導女性病人於如廁後，應由後往前擦拭

C.建議病人採盆浴及使用女性清潔噴劑

D.鼓勵病人多攝取高鈣飲食及鹼灰性食物

15.有關靜脈注射腎孟攝影術之敘述，下列何者正確？

A.因檢查不具侵入性，故病人不需填寫檢查同意書

B.檢查前，病人需增加水分攝取，以增加腎臟顯影

C.檢查時，病人會因顯影劑注入而有短暫臉部潮紅

D.檢查後，病人須減少水分攝取，以減少腎損傷

16.有關甲狀腺風暴之敘述，下列何者正確？

A.可能是甲狀腺機能低下病人，在面臨生產或手術等重大壓力所致

B.病人抽血結果，會呈現 T3、T4 及 TSH 升高，以及游離甲狀腺素下降

C.病人易出現，體溫過高、譫妄、臉潮紅、心搏過慢與心衰竭等症狀

D.治療包含給與 β 腎上腺阻斷劑、皮質類固醇、維生素 B 群與碘化物

17.有關糖尿病的合併症，下列何者錯誤？

A.視網膜病變

- B. 男性陽萎
- C. 肺氣腫
- D. 間歇性跛行

18. 王先生車禍，導致左大腿開放性骨折且血流不止，到達急診時，心跳 126 次／分，呼吸 32 次／分，血壓 86／60 mmHg，皮膚蒼白濕冷，下列何者正確？①可能為低血容積性休克 ②可能為血管性休克 ③採取半坐臥姿勢 ④依醫囑輸全血

- A. ①③
- B. ①④
- C. ②③
- D. ②④

19. 有關嬰幼兒發展理論，下列敘述何者錯誤？

- A. 根據皮亞傑的認知發展理論，0 到 2 歲幼兒為感覺運動期
- B. 根據佛洛伊德的性心理發展階段，1 到 3 歲幼兒為肛門期
- C. 根據艾瑞克森的社會心理發展理論，幼兒期發展為信任感對不信任感
- D. 根據皮亞傑的認知發展理論，2 到 4 歲幼兒為運思前期的前概念階段

20. 小強，6 個月大，有關其生長發展評估，下列敘述何者最適當？

- A. 前囟門已閉合
- B. 吸吮反射 (sucking reflex) 尚存在
- C. 足底抓握反射 (plantar grasp reflex) 尚存在
- D. 後囟門尚未關閉

21. 為新生兒執行反射測試，在不碰觸新生兒下，突然製造噪音，新生兒手臂出現外展、手肘彎曲、拳頭緊握。此為何種反射測試？

- A. 驚嚇反射 (startle reflex)
- B. 頸部強直反射 (asymmetrical tonic neck reflex)
- C. 巴賓斯基氏反射 (Babinski's reflex)
- D. 手掌抓握反射 (palmar grasp reflex)

22. 小明，6 月大，媽媽詢問助產師有關添加副食品注意事項，下列回答何者較適當？

- A. 小明味覺開始敏感，可以添加鹽及雞精粉來調味
- B. 將新食物混合到奶瓶中餵食，以讓小明接受新食物
- C. 建議先選擇柑橘類的水果，以補充維生素 C

D.每次只給 1 種新食物，且由 1 小匙開始後再酌量增加

23.有關胎便吸入症候群，下列敘述何者錯誤？

- A.為 34 週以下早產兒呼吸窘迫的常見原因
- B.X 光檢查時可見過度換氣造成的特殊蜂巢狀
- C.臨床表徵為羊水顏色改變、呼吸窘迫與急促
- D.動脈血液氣體分析檢查呈現呼吸性酸中毒

24.何小妹，32 週出生，3 天大之早產兒，住院期間發生 2 至 3 次的呼吸暫停，若床邊警示器又顯示呼吸暫停的情形，下列護理措施何者最適當？

- A.立即抽吸何小妹的口鼻
- B.以手掌輕揉何小妹背部
- C.提供 100%高濃度氧氣
- D.協助何小妹持續採仰臥姿勢

25.葉小妹，33 週大，目前接受鼻導管式持續性氣道正壓呼吸（CPAP）治療，下列護理措施何者最適當？

- A.如 $\text{PaO}_2 < 60 \text{ mmHg}$ ，應改為間歇性氣道正壓呼吸治療
- B.使用加熱式潮濕器，以避免呼吸道黏膜太乾燥
- C.人工皮貼在臉頰上需頻繁更換，以避免鼻頭及鼻中膈皮膚受損
- D.氧氣濃度依需要調整，壓力應維持在 2~3 cmH_2O

26.有關新生兒使用全靜脈營養法（total parenteral nutrition, TPN），下列敘述何者錯誤？

- A.一般運用在壞死性腸炎者，但營養不足的早產兒也可使用
- B.TPN 溶液有使用期限，若使用超過 72 小時，未用完需立即丟棄
- C.可能出現之合併症包括低血糖、高血糖、脂肪酸不足
- D.長期使用 TPN 易出現黃疸現象，需定期監測肝功能

27.陳小妹，2 歲，就讀幼兒園感染腸病毒（enterovirus），下列敘述何者正確？

- A.發病前數天，病毒不具傳染力
- B.主要侵犯腸胃系統引起水瀉
- C.避免與家人分享食物或共用餐具
- D.戴口罩仍可繼續上幼兒園

28.有關兒童預防注射，下列敘述何者錯誤？

- A.癌症兒童或使用免疫抑制劑的兒童，不應使用活病毒或活菌疫苗
- B.免疫球蛋白（IVIG）注射後，應注意 2 個月後才可施打一般疫苗

- C.健康兒童如罹患中、重度發熱性疾病時，只要有發燒就延後接種
- D.一般日本腦炎疫苗注射，在兒童出生滿1歲3個月時接種第1劑
- 29.小明，3歲，因腹痛入院治療，助產師應以下列何種疼痛評估工具，了解其疼痛程度？
- A.描述量表（descriptive scale）
- B.臉譜量表（faces pain rating scale）
- C.視覺類比量表（visual analog scale）
- D.數字量表（numeric rating scale）
- 30.助產師評估新生兒的產瘤（caput succedaneum），下列臨床表徵何者正確？
- A.腫塊會越過骨縫合線，且界線模糊，約在24小時內出現
- B.腫塊會越過骨縫合線，且界線分明，約在24小時後出現
- C.腫塊不會越過骨縫合線，且界線模糊，約在3~7天會自然吸收
- D.腫塊不會越過骨縫合線，且界線分明，約在3~7星期會自然吸收
- 31.有關自閉症（autism）兒童的身心表徵，下列敘述何者正確？
- A.在3歲後出現症狀，女生的發生率高於男生
- B.出現鸚鵡性對話、語法錯誤的語言溝通障礙
- C.社會互動方面，較容易與親人建立親情關係
- D.對感官輸入訊息的反應與一般孩童沒有差異
- 32.有關單純性熱性痙攣（simple febrile convulsion）的相關敘述，下列何者正確？
- A.好發於6歲以上的兒童
- B.抽搐的類型為局部肌肉或肢體抽搐
- C.抽搐發作後會造成神經功能的缺損
- D.發作時間約2~3分鐘，通常不超過15分鐘
- 33.小明，出生1個月大，罹患單側發展性髖關節發育不良，有關臨床徵象之敘述，下列何者最不適當？
- A.巴羅氏徵象（Barlow's sign）是指患肢膝部較健肢低
- B.患肢皺摺較多且較短
- C.哈特氏徵象（Hart's sign）是指患肢外展受限制
- D.歐氏徵象（Ortolani's sign）是指患肢外展時會聽到咔嗒（click）聲
- 34.小方，出生即罹患腦性麻痺，下列護理指導何者錯誤？
- A.小方的疾病是屬於永久且進行性殘疾
- B.小方主要的障礙以肢體動作為主

C.使用輔具有助於小方改善運動功能

D.小方的語言訓練應儘早開始

35.有關兒童青少年憂鬱症治療的護理指導，下列敘述何者正確？

A.應多攝取多醣類，並持續服用選擇性血清素回收抑制劑（selective serotonin reuptake inhibitors）

B.應避免攝取蛋白質，並持續服用單胺氧化酶抑制劑（monoamine oxidase inhibitors）

C.應多攝取維生素，並持續服用三環抗鬱劑（tricyclic anti-depressants）

D.應避免攝取高膽固醇食物，並持續服用抗乙醯膽鹼（anti-cholinergics）

36.曾罹患重度憂鬱症病史的李小姐，因待產安排入院。其表示吃不下東西、心情感到很沮喪、睡不好，此時護理人員最優先的處置，下列何者最適宜？

A.觀察其與醫療人員的互動，評估其人格特質

B.聯繫其精神科醫師，了解過去病史

C.回應說：「你感到沮喪，能再多談些感覺或想法嗎？」

D.告訴她不要胡思亂想，生產一定會順利的

37.陳太太之前曾於懷孕 20 週發生意外流產，最近懷孕後在日常活動都格外小心謹慎，卻也使夫妻間的摩擦爭吵增加，當其產檢時眼泛淚光表示：「我先生說我太神經質了」，護理人員的下列何項回應，較能同理個案的感受？

A.「你自己覺得呢？」

B.「這件事情，你感到難過且對自己產生懷疑吧？」

C.「目前你的日常活動和過去相比，有那些不同？」

D.「請說說看，你和先生的期待有何不同？」

38.陸女士任職於會計室，因某同事肺炎嚴重住院病假 2 週，陸女士逢人便說該住院同事是故意裝病，就想要避開年度繁重的稽核工作。陸女士使用的防衛機轉下列何者最適宜？

A.否定（denial）

B.轉化作用（conversion）

C.退行作用（regression）

D.投射（projection）

39.有關智能的評估，下列敘述何者錯誤？

A.「失火時該如何處理？」，此問句是評估判斷力

B.「蘋果和香蕉都是水果，那請問船和車子都是什麼？」，此問句是評估注意力

C.解釋「『天有不測風雲』、『舉頭三尺有神明』是什麼意思？」，此問句是評估抽象思考

D.「你上一餐吃什麼？昨天發生什麼事？」，此問句是評估近期記憶

40. 有關選擇性血清素回收抑制劑 (selective serotonin reuptake inhibitor, SSRI)，所產生的停斷症狀 (discontinuation symptoms)，下列敘述何者最正確？
- A. 開始服用 SSRI 二至三天，多數患者會出現停斷症狀
 - B. 突然將 SSRI 停藥，慢性病人當天立即出現停斷症狀
 - C. 停斷症狀表現有頭暈、手抖、焦慮、噁心等
 - D. 比起三環抗鬱劑，中斷服用 SSRI 更易出現心臟傳導障礙
41. 有關全民健保預防保健的服務項目，下列敘述何者正確？
- A. 0~6 歲兒童預防保健共計 5 次
 - B. 未滿 5 歲兒童牙齒塗氟每年一次
 - C. 孕期產前檢查共計 10 次
 - D. 30 歲以上婦女子宮頸抹片檢查每年一次
42. 有關流行病特性的敘述，下列何者最不適當？
- A. 不限於病例數目的多寡
 - B. 不限於急性或慢性的疾病
 - C. 有地理範圍或特殊時間的限制
 - D. 只要任一疾病之發生率超過其正常期望值 (normal expectancy)，即符合疾病流行的條件
43. 下列何者屬於活性減毒疫苗？
- A. 卡介苗疫苗
 - B. B 型肝炎疫苗
 - C. 白喉破傷風混合疫苗
 - D. 流行性感感冒疫苗
44. 有關健康識能的敘述，下列何者最適當？
- A. 是指一個人健康知識的多寡
 - B. 是指個人獲取、理解及處理基本健康資訊與服務的能力
 - C. 健康識能程度對自我的健康照顧能力影響不大
 - D. 教育程度與健康識能無關
45. 婦女因害怕乳房攝影所造成的疼痛而未定期參與乳癌篩檢，以健康信念模式說明其行為，下列何者最適當？
- A. 社經地位或年齡的影響
 - B. 醫護人員提供的資料不足
 - C. 對篩檢益處的認知低於篩檢障礙的認知

D.自覺患病的可能性不大

46.護理師進行社區評估，收集縣市政府統計處人口結構的資料，是屬於下列何種資料收集方式？

A.參與式觀察法

B.社會調查法

C.擋風玻璃式調查

D.文獻考察法

47.有關家庭訪視路線的安排，下列何者應安排於最後訪視？

A.剛出院返家且有輕微黃膽的新生兒

B.長期臥床的陳奶奶

C.上週被診斷出肺結核的李先生

D.路程最遠且中風的王太太

48.越南新住民阮女士不諳中文，剛生產返家。有關母乳哺餵的護理指導方法，下列何者最適當？①團體討論

②越南文之自學教材 ③示範法 ④問答法

A.①②

B.①④

C.②③

D.③④

49.有關婦女更年期症狀困擾的處置，下列何者最不適當？

A.鼓勵採用荷爾蒙替代療法

B.鼓勵多攝取黃豆類及高鈣食品

C.辦理更年期支持團體

D.評估更年期症狀對生活造成的困擾

50.有關懷孕新住民婦女沒有健保身分時的產前檢查，下列敘述何者最不適當？

A.產檢前須至衛生所申請辦理核發補助聯單

B.享有 10 次免費產前檢查

C.享有免費妊娠糖尿病篩檢及貧血檢驗

D.符合補助條件者，醫療院所不得事先向個案收取產檢補助費用