

109年第二次專技高考醫師第一階段考試、牙醫師藥師考試分階段考試、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師、職能治療師、呼吸治療師、獸醫師考試、109年專技高考助產師考試

代 號：4310

類科名稱：助產師

科目名稱：助產學（一）（包括助產學緒論、生殖系統的解剖與生理、產前護理、分娩期護理、產後護理、新生兒護理）

考試時間：1小時

座號：_____

※本科目測驗試題為單一選擇題，請就各選項中選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分！

※注意：本試題禁止使用電子計算器

1.有關婦嬰生命統計之敘述，下列何者錯誤？

- A.粗出生率（‰）=（一年內之活產總數／年中人口數）× 1,000
- B.孕產婦死亡率（‰）=（所有原因死亡之懷孕生產婦女人數／該年活產嬰兒總數）× 1,000
- C.新生兒死亡率（‰）=（一年內出生未滿4週嬰兒死亡數／當年出生之活嬰總數）× 1,000
- D.嬰兒死亡率（‰）=（一年內出生未滿1歲之嬰兒死亡數／當年出生之活嬰總數）× 1,000

2.助產人員解釋、說明個案之權利和責任，並保護、尊重及支持個案的權利，是屬於下列那一種角色？

- A.照顧者
- B.教育者
- C.諮詢者
- D.代言者

3.有關產科以家庭為中心的護理方式，下列敘述何者錯誤？

- A.鼓勵大小孩探訪新生兒
- B.建議每4小時哺餵新生兒
- C.鼓勵家人共同參與生產
- D.施行親子同室

4.有關子宮功能之敘述，下列何者正確？

- A.子宮肌層的環狀肌可維持子宮頸閉鎖
- B.子宮黏膜層分泌酸性環境提供受精卵著床
- C.子宮肌肉中層的斜走肌有助生產時將胎兒娩出
- D.子宮肌肉外層的縱走肌產生止血功能

5.有關羊水的敘述，下列何者正確？

- A.來自胎兒的尿液液體，呈中性
- B.有蛋白質的成分，供給胎兒營養
- C.含胎兒上皮細胞，呈酸性
- D.能維持胎兒體溫穩定

6.有關胎兒發育之敘述，下列何者正確？

- A.12週心臟形成開始跳動
- B.胎兒20週開始有聽覺

- C.生殖器官20週發育完成，可以分辨性別
D.12週開始有胎動
- 7.女性內生殖器官是由下列那些構造組成？①子宮 ②陰阜 ③卵巢 ④輸卵管 ⑤陰道 ⑥陰蒂 ⑦會陰
A.①③④⑥
B.①③④⑤
C.②③④⑤
D.①②⑥⑦
- 8.有關懷孕期內分泌系統的變化，下列何者正確？
A.人類胎盤泌乳激素（hPL）可維持黃體
B.黃體素（progesterone）增加皮膚的色素沉著
C.雌性素（estrogen）使平滑肌及呼吸道放鬆
D.皮質類固醇（corticosteriod）使肝醣合成增加
- 9.張太太詢問胎動的相關問題，助產師的回答下列何者錯誤？
A.初產婦大約在懷孕18～20週可感受到胎動
B.經產婦大約在懷孕16～18週可感受到胎動
C.每日胎動可選擇三餐飯前測量
D.2小時內可記錄到至少10次胎動
- 10.有關產前檢查的敘述，下列何者正確？
A.前胎有胎兒畸型者，建議接受高層次超音波檢查
B.羊膜穿刺術比絨毛膜取樣在胎兒發育更早期進行
C.羊膜腔穿刺合適的檢查時間是妊娠10～16週之間
D.母血唐氏症篩檢可作為確立唐氏症的診斷方法
- 11.超音波檢查胎兒唐氏症之頸部透明帶厚度的診斷閾值為何？
A.1.5mm
B.3.0mm
C.5.5mm
D.7.0mm
- 12.有關孕期葉酸的攝取，下列敘述何者錯誤？
A.葉酸預防胎兒神經管缺陷，懷孕末期效果最佳
B.整個孕期皆需補充葉酸
C.缺乏葉酸會造成巨母紅血球性貧血
D.深綠色蔬菜富含葉酸
- 13.有關孕期補充鐵劑的注意事項，下列敘述何者正確？
A.鐵劑要在飯前一小時口服可減少腸胃刺激
B.使用維生素C會減低鐵在胃腸道的吸收
C.鐵劑於空腹時給藥可達最大的吸收率
D.第一孕期是補充鐵劑最佳時機

- 14.有關懷孕期飲酒之敘述，下列何者正確？
- A.少量酒精不具致畸胎作用，可選擇性飲用
 - B.甲醇是酒精代謝產物，與胎兒酒精症候群發生有關
 - C.第三孕期時胎兒器官已成形，此期可以飲酒
 - D.酒精會干擾腸胃道對維生素B吸收
- 15.趙女士確定懷孕，有關產前檢查之敘述，下列何者正確？
- A.在懷孕早期每兩週產檢一次
 - B.第一次梅毒篩檢宜在懷孕第20週執行
 - C.依全民健保給付標準，在懷孕第20週，做第一次胎兒的超音波檢查
 - D.德國麻疹抗體、愛滋病的實驗室檢查，在懷孕32週檢查
- 16.孕期子宮頸會產生充血、腫脹、腺體增生及分泌物增加等現象，主要是受到下列那個荷爾蒙影響？
- A.雌性素（estrogen）
 - B.黃體素（progesterone）
 - C.催產素（oxytocin）
 - D.鬆弛素（relaxin）
- 17.有關妊娠生理性貧血之敘述，下列何者錯誤？
- A.血漿量增加50%，紅血球增加20~30%
 - B.血液中紅血球相對被血漿稀釋所致
 - C.又稱為妊娠假性貧血
 - D.需要進一步治療
- 18.孕婦於懷孕後期，積極尋找有助產師共照的醫院生產，她是為了達成那項母性任務（maternal task）？
- A.確保自己及胎兒在懷孕及分娩過程中能安全順利
 - B.確保重要家人接受新生兒
 - C.情緒上與胎兒連成一體
 - D.學習對孩子貢獻自己
- 19.唐太太於妊娠33週，進行無壓力試驗（NST），結果在20分鐘內有3次胎動，每次胎動時胎心率增加20次，且持續15秒，表示胎兒狀況如何？
- A.胎兒健康狀況良好
 - B.胎兒處於睡眠狀態
 - C.胎盤功能狀況不佳
 - D.胎兒中樞神經發育不良
- 20.有關妊娠期間內分泌系統的變化，下列敘述何者正確？
- A.甲狀腺素（ T_4 ）和三碘甲狀腺素（ T_3 ）濃度升高，主要是讓基礎代謝率降低
 - B.黃體素的主要作用為刺激乳腺系統發育，減少胃泌素和鹽酸的分泌
 - C.泌乳素於懷孕末期分泌達最高峰，可刺激乳房發育，促使乳汁產生
 - D.雌性素最初由卵巢中的黃體分泌，妊娠8週後由胎盤製造，其主要作用是維持妊娠狀態
- 21.林女士G₁P₀，41週入院引產，經陰道內診的結果為：子宮頸口未開、子宮頸柔軟且變薄為50%、子宮頸的位

置向前、胎頭的Station為0。則比夏（Bishop）計分法為幾分？

- A.6分
- B.7分
- C.8分
- D.9分

22.有關溫柔生產措施，包含下列何者？①自發性產程啟動 ②持續性的支持 ③仰臥位生產 ④常規使用醫療介入 ⑤待產過程中可以自由活動 ⑥母嬰不分離

- A.①②③④
- B.②③④⑤
- C.③④⑤⑥
- D.①②⑤⑥

23.助產人員執行孕婦腹部四段觸診，觸診胎兒為頭產式，並發現胎兒之最大突出部分和胎背方向一致，此代表胎兒的姿勢為：

- A.伸張
- B.屈曲
- C.反曲
- D.固定

24.以超音波進行胎兒生理活動評估（biophysical profile）時，不包括下列何者？

- A.羊水容積
- B.胎兒呼吸運動
- C.胎兒心跳速率
- D.胎兒身體張力

25.懷孕時缺乏何種維生素，會影響葉酸儲存？

- A.Vitamin B₁
- B.Vitamin B₁₂
- C.Vitamin D
- D.Niacin

26.下列何種生產姿勢較不利於胎兒下降，恐延長第二產程時間？

- A.站姿
- B.坐姿
- C.蹲姿
- D.膀胱截石臥位

27.有關分娩時在第一產程的生理反應，下列敘述何者錯誤？

- A.因生產耗氧量增加，導致呼吸速率增加
- B.因子宮收縮、血壓上升，而刺激壓力受器，使心跳下降
- C.因先露部位壓迫膀胱，使排尿受阻，而產生輕微蛋白尿
- D.生產的用力與情緒壓力，使白血球上升

28.王女士，妊娠39週因破水入院待產，母胎身體評估皆正常，目前子宮頸擴張 Dilation：4cm，變薄

Effacement：good，高度 Station：+1。有關使用生產球的護理指導，下列何者不適宜？

- A.「妳已破水，雖然有助產師陪伴，仍不適合下床使用生產球。」
- B.「採站姿移動身體做上下蹲踞動作來滾動生產球，可有助於胎兒下降旋轉。」
- C.「若覺得躺在床上待產不舒服，可試著坐在生產球上於床邊休息。」
- D.「使用生產球可讓骨盆自由活動，放鬆骨盆底肌肉和減輕疼痛不適。」

29.有關按摩法對緩解待產婦女疼痛的敘述，下列何者錯誤？

- A.按撫法是藉由門閥控制理論，藉刺激大的神經纖維，來抑制細小神經纖維所傳導的疼痛刺激
- B.按撫法是藉由抑制腦內啡的產生來緩解疼痛
- C.按撫法只對輕～中度疼痛的緩解效果較佳
- D.在骶骨處採重壓法，可減輕因胎兒枕部壓迫骶髂韌帶（sacroiliac ligaments）所造成的骶椎部疼痛

30.林女士待產中，胎頭呈枕後位（OP），下列何種生產姿勢較無法有效幫助胎頭進行內回轉？

- A.左側臥
- B.手膝跪姿
- C.前傾坐姿
- D.半坐臥姿

31.陳女士，子宮頸全開，已進入第二產程，助產師教導其使用腹壓、向下用力的方法，下列敘述何者不適當？

- A.教導有宮縮時憋住氣，不要發出聲音，往下用力
- B.當有不自主想向下用力時，教導可做6～7秒緩慢開聲門的用力
- C.教導宮縮間歇時盡量放鬆休息，保存體力
- D.宮縮間歇時，提醒可啜飲開水等液體

32.有關枕後位（OP）與枕前位（OA）的比較，下列敘述何者錯誤？

- A.第一產程時間，OP位較OA位所需時間長
- B.先露部位下降速度，OP位較OA位慢
- C.子宮頸擴張速度，OP位較OA位慢
- D.胎頭內回轉至伸展角度，OP位較OA位小

33.下列何者為子宮收縮頻率（Frequency）的定義？

- A.二次子宮收縮之間的間隔
- B.子宮收縮時增加的壓力
- C.子宮底肌肉開始繃緊一直到鬆弛為止
- D.一次子宮收縮的開始到下次子宮收縮的開始

34.希氏法（Schultze mechanism）娩出胎盤的特徵包括下列那些？①胎盤由中央向邊緣剝離 ②胎盤由邊緣向中央剝離 ③由胎兒面先娩出 ④由母體面先娩出 ⑤較易發生剝離不全 ⑥有較多數產婦（80%）以此種方式娩出

- A.①③⑥
- B.②④⑤
- C.①④⑥

D.②③⑤

35.生產過程中胎兒頭部下降的位置在-1時，是指胎頭高度位於何處？

- A.坐骨棘連線上1指寬
- B.坐骨棘連線下1指寬
- C.坐骨棘連線上1公分
- D.坐骨棘連線下1公分

36.有關陰道分娩會陰四度裂傷的定義，下列敘述何者正確？

- A.會陰部皮膚黏膜處有裂傷
- B.會陰部裂傷裂到直腸壁
- C.會陰部肌肉層處有裂傷
- D.肛門括約肌有裂傷

37.初產婦最適合進行腰椎硬脊膜外麻醉的時間，是在子宮頸口開幾公分時？

- A.未開時
- B.2公分
- C.4公分
- D.全開時

38.楊女士，G₂P₀A₁，入院待產第8小時，宮縮每3~4分鐘一次，主訴有不自主想用力。隨著宮縮開始，胎心音逐漸變慢下降至110次／分，宮縮結束時，胎心音上升至150~160次／分。此胎心率變化最符合下列那一種情況？

- A.早期減速
- B.晚期減速
- C.變異性減速
- D.晚期加速

39.楊女士，G₂P₀A₁，入院待產，宮縮持續／頻率時間為 60~90秒／3~4分。子宮頸口開8公分，胎膜完整，胎頭高度：0~+1，有不自主想用力的情形，下列措施何者較適當？

- A.鼓勵產婦閉氣用力，加速產程進展
- B.鼓勵產婦採直立姿勢，重力原理加速產程
- C.鼓勵產婦採淺而快的呼吸方式，度過產程
- D.給予人工破水，加速產程進展

40.待產婦給與麻醉性止痛藥後，在幾小時內娩出胎兒，容易增加新生兒呼吸抑制的機率？

- A.2~3小時內
- B.4~5小時內
- C.6~7小時內
- D.8~9小時內

41.曹女士陰道分娩一女嬰，產後15分鐘仍表示太累而拒絕立即肌膚接觸，下列護理措施何者最適當？

- A.立即將嬰兒送至嬰兒室保暖
- B.再次強調愛嬰醫院十大措施之重要

- C.依曹女士意願給予休息，暫停肌膚接觸
- D.助產師回應：「你辛苦了，若體力無法負擔我會協助你」
- 42.一般而言，胎盤娩出後2小時內被界定為分娩的那一階段？
- A.第二產程
- B.第三產程
- C.第四產程
- D.胎盤期
- 43.待產婦的行為表現出緊張，少注意外界，對問話小聲回答，最可能是處於下列何期？
- A.潛伏期
- B.活動期
- C.過渡期
- D.胎盤娩出期
- 44.有關待產及分娩時的護理評估，下列敘述何者錯誤？
- A.應每1小時執行陰道指診，以了解產程之進展
- B.第二至第四產程要特別留意與急性出血有關的生命徵象
- C.體溫若高於38°C，應每1小時監測體溫變化
- D.胎心聽診前應先執行腹部四段式觸診，以確定胎兒姿勢
- 45.下列何者為分娩時子宮收縮的特性？①開始於子宮底 ②開始於子宮體 ③為階梯性，收縮由子宮上段到下段 ④為階梯性，收縮由子宮下段到上段
- A.①③
- B.②③
- C.①④
- D.②④
- 46.陰道產後婦女，第一次自解小便，下列照護何者正確？
- A.為避免跌倒，協助於床上使用便盆
- B.解尿後需按摩至子宮變硬
- C.解尿不順暢，立即給予導尿
- D.解尿後評估餘尿量
- 47.王女士產後第二天，主訴肛門痔瘡處疼痛，坐立難安，下列處理與反應，何者最不恰當？
- A.教導溫水坐浴，減輕痔瘡不適
- B.鼓勵攝取高纖食物，避免便秘
- C.告知這是產後常見正常狀況，幾天過後可改善，不需擔心
- D.教導用潤滑手套將痔瘡推回肛門內
- 48.有關無泌乳月經法避孕之敘述，下列何者最合宜？
- A.適用於產後6個月內完全哺餵母乳的產婦
- B.可達100%的避孕效果
- C.避孕機轉為雌性素與黃體生成激素分泌過多

D.哺乳之產後婦女月經未恢復前均適用

49.有關口服避孕藥的敘述，下列何者錯誤？

- A.服用者容易造成陰道黴菌感染
- B.出現嚴重腹痛、胸痛等症狀，應停用並就醫
- C.單一黃體素製劑（mini pill），可以抑制排卵而產生避孕效果
- D.按時服用，避孕藥效果高達99.9%

50.有關陰道生產四度裂傷之照護，下列何者不適當？

- A.早期下床活動
- B.每日3,000ml 水分攝取
- C.攝取蔬果纖維素
- D.使用灌腸協助排便

51.有關助產師進行產後膀胱狀況之評估，下列敘述何者錯誤？

- A.會陰傷口疼痛與尿道水腫會影響膀胱排空
- B.膀胱漲滿會讓子宮偏離中線，影響子宮收縮
- C.產後利尿作用，一般在產後6~8小時開始發生
- D.陰道產後4~6小時內，需評估產婦是否自解尿液順暢

52.下列何者為產後生殖系統的正常變化？

- A.分娩後子宮內膜剝落排出惡露，約持續10天，皆為紅色惡露
- B.產後3週子宮底進入骨盆腔，無法於腹部摸到
- C.約產後2小時，子宮底上升至肚臍偏右位置
- D.子宮約在產後6週，便可恢復到懷孕前的大小

53.陰道分娩後第一天，下列何者為異常血液變化？

- A.血球容積會有暫時性上升
- B.白血球數目上升達25,000~30,000/mm³
- C.血漿纖維蛋白原濃度下降
- D.紅血球數目會有暫時性上升

54.有關婦女於產後皮膚、毛髮的生理變化，下列敘述何者錯誤？

- A.產後一週內，排汗量增加
- B.妊娠紋於產後六週消失
- C.產後數週內有暫時性掉頭髮現象
- D.產後腹部黑中線會逐漸消失

55.產婦於剖腹產後第3天因傷口疼痛仍不敢下床，下列那些為適當的護理措施？①同理其情況並鼓勵繼續臥床休息 ②衛教其可以使用束腹帶支托傷口以減輕疼痛 ③給予傷口換藥 ④評估傷口情況，必要時可以依醫囑給與止痛藥

- A.①②
- B.③④
- C.②④

D.①③

56.有關產婦產後誘尿的護理措施，下列何者較不合宜？

- A.維持解尿的隱蔽性
- B.聽流水聲
- C.以冷水沖洗會陰部
- D.協助下床如廁

57.有關陰道分娩後陰道的立即變化，下列敘述何者正確？

- A.陰道壁充血，黏液分泌增加
- B.陰道皺褶消失不見，且呈無菌狀態
- C.陰道有水腫瘀傷現象，但呈無菌狀態
- D.可見處女膜殘痕，陰道內有微生物存在

58.張女士36歲，罹患糖尿病，剛生下第五個孩子，她表示不想再生了，但先生又不願意配合使用保險套，建議那一種避孕方式最合適？

- A.安全期計算法
- B.裝置子宮內避孕器
- C.服用口服避孕藥
- D.結紮法

59.下列何者為嬰兒正確含乳的姿勢？

- A.嘴巴張大吸吮乳頭
- B.舌頭位於嘴巴後面
- C.嬰兒下唇外翻，母親下方的乳暈露出較上方的乳量少
- D.吸吮後，母親乳房組織不會被拉長

60.下列何種方法最不能促進母乳分泌量？

- A.儘量讓新生兒靠在媽媽身邊
- B.儘早開始餵乳
- C.拉長餵奶時間
- D.夜間持續哺餵

61.有關母乳與牛奶的比較，下列敘述何者正確？

- A.吃牛奶的嬰兒，大便較成形，不易腹瀉
- B.牛奶含較多的乳清蛋白，容易造成過敏
- C.牛奶中的含鐵量比母乳多，但不好吸收
- D.牛奶比母乳含較多不飽和脂肪酸，較少的飽和脂肪酸

62.林小弟為足月兒，出生後一直以母乳餵食，出生後第3天有明顯黃疸，至第5天黃疸狀況更嚴重，產婦及家屬都很擔心，頻頻詢問有沒有問題，助產師的回答以下列何者最為適當？

- A.此為足月兒正常現象，請家屬不必擔心
- B.此為母乳性黃疸，應暫時改餵配方奶
- C.此為病理性黃疸，將立即請醫師診治


- D.此為母乳性黃疸，需確認林小弟有吃到足夠的奶水
- 63.林小弟為足月兒，出生後第3天，小便3次，尿布偶出現粉紅色斑點的結晶。有關此現象的解釋，下列何者正確？
- A.與新生兒的奶量攝取不足有關
 - B.與新生兒體熱散失過多有關
 - C.與母體荷爾蒙的影響有關
 - D.與尿比重及含有尿酸鹽有關
- 64.陳小弟為足月且以臀位生產，在出生24小時，父親發現陳小弟的陰囊如水球般腫脹透光。下列那一個解釋最為適當？
- A.為陰囊受壓所致，不須治療繼續觀察即可
 - B.為異常狀況，須儘速請醫師治療
 - C.為每種生產方式都可能發生的正常現象
 - D.為異常現象，須先了解是否有家族史
- 65.林小弟為足月出生，出生體重3,140gm，今產後第一天，於洗澡前測體重2,980gm，體溫36°C，在室溫24°C的情況下，下列敘述何者正確？
- A.林小弟狀況都正常
 - B.林小弟體重喪失過多，不宜洗澡以免體力過於消耗
 - C.室內溫度過低，宜在浴室中使用電熱器增加室內溫度
 - D.林小弟體溫過低，暫時不給予沐浴
- 66.章女士陰道生產，今天預定和新生兒一起出院，助產師告知她須等新生兒打完疫苗才出院，該疫苗最有可能為下列何者？
- A.B型肝炎免疫球蛋白（HBIG）
 - B.B型肝炎疫苗（HBV）
 - C.卡介苗（BCG）
 - D.13價結合型肺炎鏈球菌疫苗
- 67.張小弟為足月出生的新生兒，出生體重為3,450 gm，在出生第三天時，下列何種狀況應視為異常？
- A.體重為3,270 gm
 - B.有二片尿濕的尿褲
 - C.一天中吃10次母乳
 - D.呼吸速率為30~40次／分
- 68.有關嬰兒早期飢餓的暗示行為（early hunger cues），下列何者錯誤？
- A.手指緊握、將手指伸向臉部或嘴巴
 - B.出現吸吮動作、吸吮聲音、舌頭伸出
 - C.臉部轉向照顧者
 - D.大聲哭泣、背往後弓
- 69.下列何者不是乳頭凹陷婦女產前母乳教育的照護核心概念？
- A.孕期準備母乳相關知識

- B.建議整個孕期配戴乳頭罩
- C.指導產後可立即肌膚接觸
- D.指導產後應儘早讓寶寶吸吮

70.下列何種情況適宜哺餵母乳？①母親為B型肝炎帶原者 ②母親有乳腺炎 ③母親為愛滋病患者 ④嬰兒有先天性心臟病 ⑤嬰兒有半乳糖血症

- A.①③⑤
- B.①②④
- C.②③④
- D.②④⑤

71.進行新生兒抽吸時，下列何者為正確姿勢？



- D.不需在意頭部姿勢

72.新生兒首次呼吸時，氧氣進入新生兒的肺部，使得肺部動脈產生何種變化？

- A.收縮
- B.擴張
- C.先收縮後擴張
- D.先擴張後收縮

73.依據新貝拉德量表（New Ballard score），40週足月兒的成熟度特徵，下列何者錯誤？

- A.佈滿胎毛
- B.皮膚乾裂
- C.皺褶佈滿整個足底
- D.手肘無法到達身體中線

74.有關助產人員執業相關法律的敘述，下列何者正確？

- A.助產人員之執業機構需永久保存相關紀錄
- B.助產人員執業經機構主管同意，最多可以在三處
- C.助產人員執業，需接受繼續教育，並每六年提出完成繼續教育證明文件，辦理執業執照更新
- D.助產人員停業或歇業時，應自事實發生之日起半年內，報請原發執業執照機關備查

75.王女士目前懷孕中，上週的例行產檢時發現50克糖水測試（oral glucose challenge test）為142 mg/dL，本週經

醫師建議下又做了一次100克糖水耐性測試（oral glucose tolerance test），結果分別是空腹95 mg/dL；1小時180 mg/dL；2小時155 mg/dL；3小時140 mg/dL。依此回答下列2題。王女士執行妊娠糖尿病篩檢最合宜的時間為妊娠幾週時？

- A.8~12週
- B.16~18週
- C.24~28週
- D.35~37週

76.承上題，下列敘述何者正確？

- A.王女士已符合妊娠糖尿病的診斷
- B.50克的葡萄糖水試驗不需要空腹就可以執行
- C.妊娠糖尿病的孕婦宜服用口服降血糖藥治療
- D.妊娠糖尿病婦女無法以飲食控制血糖，皆需藥物治療

77.黃女士第一胎，目前子宮頸口開5公分，主訴嚴重下背痛且有不自主想用力，此現象可能原因為何？

- A.枕後位或胎位不正
- B.胎頭過大壓迫直腸
- C.產婦骨盆狹窄
- D.正常分娩徵象

78.承上題，助產師應優先提供下列何者措施？

- A.告知產婦先禁食，因剖腹機率增加
- B.建議施打硬膜外麻醉，緩解疼痛
- C.採膝胸臥位，協助胎頭轉位
- D.指導產婦採深而慢的腹式呼吸

79.林先生於產後第一次見到自己的寶寶，以手指逗弄其孩子，表示興奮能當父親，依此回答下列2題：

助產人員鼓勵其可以抱抱寶寶時，他表示：「不了，我不會抱！」，對林先生此行為的意義，下列何者敘述最為恰當？

- A.缺乏學習動機
- B.擔心孩子以後黏他
- C.怕自己傷害到小孩
- D.認為照顧小孩不是他的職責

80.承上題，此時助產人員的處理，下列何者最適當？

- A.尊重林先生的意見，將小孩抱走
- B.請林先生坐在椅子上，再協助其與小孩做第一次接觸
- C.告知照顧小孩是夫妻共同的責任，所以他是應該學習的
- D.告知小孩好可愛，長得好像他，不要擔心，一切都會很好的