

**103年第二次專門職業及技術人員高等考試牙醫師考試分階段考試、藥師、醫事檢驗師、醫事放射師、助產師、物理治療師、職能治療師、呼吸治療師、獸醫師考試**

代 號：3305

類科名稱：職能治療師

科目名稱：生理障礙職能治療學

考試時間：1小時

座號：\_\_\_\_\_

※注意：本試題禁止使用電子計算器

- 下列有關治療活動與所屬介入階段的配對，何者正確？
  - 在家中煮菜－目的性活動
  - 在治療床上練習坐立平衡－職能活動
  - 滑車運動－增進能力性（enabling）活動
  - 拼形狀板－附屬（adjunctive）方法
- 下列何項為較適當的職能治療長期目標記錄方式？
  - 盡量提升個案的日常生活功能
  - 個案接受治療二個月後，可在監督下上廁所
  - 個案具備轉位時所需的平衡能力
  - 個案可將雙腿穿進正確的褲管內
- 個案在練習轉位時，治療師要個案先將動作步驟背誦一遍後，再實際操作，則代表個案的學習應處於何種階段？
  - 認知（cognitive）
  - 聯合（associative）
  - 自動（autonomous）
  - 保留（retention）
- 下列何種回饋及練習方式，較能增進學習的保留（retention）？
  - 立即式回饋+封閉式練習（blocked practice）
  - 摘要式回饋（summary feedback）+封閉式練習
  - 摘要式回饋+隨機式練習（random practice）
  - 立即式回饋+隨機式練習
- 「要求病人等學會正確的動作，才讓病人自己獨立去練習動作」較符合下列那些理論或治療途徑？①神經發展理論（NDT） ②卡爾與雪佛之動作再學習治療途徑（Motor relearning approach） ③動作學習理論（Motor learning theory） ④職能治療任務導向之治療途徑（O.T. task-oriented approach）
  - ①②
  - ①③
  - ②③
  - ②④
- 進行肌電生理回饋（EMG biofeedback）訓練時，有關電極位置的敘述，下列何者正確？①正負極應沿著肌腹之縱線（longitudinally）放置 ②正負極應沿著垂直於肌腹之縱線放置 ③接地電極（ground electrode）應放在正負極的中間 ④接地電極應放在病人不測量之肢體上其他部位
  - ①③
  - ①④
  - ②③
  - ②④
- 關於以「伸手觸（取）物品」來訓練中風病患之平衡能力，下列敘述何者正確？①物品置於前方比置於患側方（等距離）較易取得 ②物品置於前方比置於患側方（等距離）較難取得 ③雙手互握前伸去觸物品比用健側手去觸物品對平衡之挑戰較多 ④雙手互握前伸去觸物品比用健側手去觸物品對平衡之挑戰較少
  - ①③
  - ①④
  - ②③
  - ②④
- 下列何者不是復健參考架構的優勢？
  - 有相當多具信度及效度的評估方式
  - 使臨床者能較全面性地了解個案的功能

- C.強調以個案為主（client-centered）的治療關係  
D.評估過程會考量到與個案日常生活有關的興趣、環境
- 9.有關通用設計（universal design）之敘述，下列何者正確？  
A.通用設計的原則與無障礙設計（barrier-free design）完全相同  
B.指不受能力或殘障程度的影響，所有人皆能夠使用的產品、建築或空間的設計  
C.其缺點為使用者依歲月的變遷或功能程度的變化，不可做產品或環境的調整  
D.其缺點為設計及調整所需之成本負擔比量身訂做之產品來得高
- 10.有關老年人肌肉退化的敘述，下列何者錯誤？  
A.肌纖維的數量及大小均減少  
B.結締組織增加  
C.第II型的無氧白肌增加  
D.肌耐力及彈性減少
- 11.職能治療師所使用之工作評估系統科技（Work Evaluation Systems Technology，WEST）是屬於下列何種評估？  
A.工作現場評估  
B.工作樣本評估  
C.情境評估  
D.心理計量評估
- 12.下列何種患者較不需要用到移動式手臂支撐架（mobile arm support）？  
A.類風濕性關節炎患者  
B.肌肉萎縮患者  
C.頸髓損傷者  
D.格巴二式症候群（Guillain-Barré Syndrome）
- 13.有關脊髓損傷者使用輔具之描述，下列何者錯誤？  
A.C3 tetraplegia必須使用呼吸器  
B.C5 tetraplegia可藉mobile arm support進食  
C.C6 tetraplegia可駕駛改裝汽車  
D.T5 paraplegia可穿長鐵鞋走路
- 14.關於輔助科技之敘述，何者錯誤？  
A.通用設計的精神是跨障礙別的設計，讓所有身心障礙者受惠，但不特別考慮正常人的需求  
B.輔助科技可取代或強化受損功能，但不能改變個案內在的能力（intrinsic function）  
C.輔助科技介面（interface）指的是輔助科技、使用者及環境之間的交互關係  
D.輔助科技協助個案獨立執行日常生活活動，支持其職能表現
- 15.關於Canadian Occupational Performance Measure（COPM）之敘述，下列何者錯誤？  
A.屬於標準化且半結構式的評估  
B.了解個案隨時間變化，對職能表現改變的自我認知  
C.適用對象限定於成人個案  
D.以訪談型式進行，由個案針對評估項目自行評分
- 16.有關動態互動模式（Dynamic interactional approach）認知復健的特色，下列何者錯誤？  
A.強調依認知階層（cognitive levels）訓練  
B.強調認知要素（cognitive components）的強化  
C.強調認知處理（cognitive processing）的過程  
D.強調在多重情境中練習
- 17.家屬敘述個案會盡量避免選擇傍晚時外出，此現象最有可能是因為個案具下列何項視知覺功能缺損？  
A.眼球運動控制（oculomotor control）  
B.視野（visual field）  
C.視覺掃描（visual scanning）  
D.視覺敏銳度（visual acuity）
- 18.進行認知功能評估時，個案無法清楚說出目前身在何處、正確時間及陪同的人是誰，據此可以推斷病患的那一項認知功能受損？  
A.記憶力（memory）  
B.注意力（attention）  
C.概念形成（concept formation）  
D.定向力（orientation）
- 19.患者左手肘關節曾因骨折造成被動屈曲角度為0°-110°，進行左手肘關節屈曲的徒手肌力測驗

(Manual Muscle Testing)時，病患表現可將左肘關節屈曲到110°，且可抵抗中度的阻力，則該紀錄為：

- A.F級
- B.F-級
- C.G級
- D.N級

20.有關high-Fowler's position之敘述，下列何者錯誤？

- A.為一種床上擺位姿勢
- B.病人上身姿勢維持在90度直立姿勢
- C.呼吸有問題如Dyspnea病人適用
- D.下肢雙膝維持在彎曲的位置

21.下列那些介入原則可用於增加耐力？①由50%最大阻力開始漸漸增加阻力 ②漸漸增加肌肉可重複收縮之次數 ③漸漸增加肌肉每次收縮可維持的時間 ④漸漸增加每日肌肉運動的頻率

- A.僅①②③
- B.僅①③④
- C.僅②③④
- D.①②③④

22.依照桃氏 (Toglia) 多重情境治療途徑 (Multicontext approach) 之主張，下列何種處理策略 (processing strategies) 屬於非情況性 (nonsituational) 策略？

- A.事前計劃
- B.反覆背誦
- C.利用視覺心像 (visual imagery)
- D.從左至右掃描搜尋

23.下列那一項手功能測驗也是評量感覺的測驗？

- A.傑布森手功能測驗 (Jebsen hand function test)
- B.改良式毛伯拾起測驗 (Modified Moberg pick-up test)
- C.普渡插板測驗 (Purdue pegboard test)
- D.克羅弗小部份精細測驗 (Crawford small parts dexterity test)

24.有關帕金森氏症 (Parkinson's disease)，下列敘述何者錯誤？

- A.可能是因為環境因子所導致
- B.患者腦部黑質的細胞退化
- C.可能是染色體突變導致的
- D.患者腦部的多巴胺 (dopamine) 濃度過高

25.關於中風病人之感覺測驗，下列敘述何者正確？

- A.兩點分辨測驗 (two-point discrimination test) 可以完全預測病人是否具分辨手中物品為何之能力
- B.Monofilament觸覺測驗可以完全預測病人能否分辨手中之物品為何物
- C.Monofilament觸覺測驗不能取代Pinprick測驗
- D.兩點分辨測驗比Monofilament觸覺測驗更具敏感度

26.某中風病患，右側輕癱，右下肢的動作及感覺都比右上肢差，是下列那條血管阻塞的可能性最高？

- A.左側前大腦動脈 (anterior cerebral artery)
- B.左側中大腦動脈 (middle cerebral artery)
- C.左側後大腦動脈 (posterior cerebral artery)
- D.左脊椎動脈 (vertebral artery)

27.針對心臟病患者運動時心血管反應的考量，下列何者錯誤？

- A.靜止時心跳大於120bpm則不適合運動
- B.收縮壓應於運動過程中升高
- C.舒張壓可維持不變或略降
- D.靜止時與運動後心跳速率差距可達30bpm

28.下列何者不是Erb's palsy影響到的上肢功能？

- A.手臂外展
- B.手臂抬高過頭
- C.手肘屈曲
- D.手腕屈曲

- 29.依照「三色概念（three-color concept）」，下列何種顏色的傷口不需清創（debridement）？
- A.黃色傷口
  - B.紅色傷口
  - C.灰色傷口
  - D.黑色傷口
- 30.為了使截肢後之殘肢末端萎縮並呈現好的形狀，通常會以彈性繃帶綁紮，下列原則何者錯誤？
- A.以環狀方式綁紮（circumferential method）
  - B.殘肢近端壓力要小於遠端
  - C.植皮的區域，壓力要小一些
  - D.綁紮植皮的區域，繃帶內要有非黏性敷料
- 31.馬尾束症候群（cauda equina syndrome）中會受影響的功能是？①排尿 ②排便 ③行走
- A.僅①②
  - B.僅②③
  - C.僅①③
  - D.①②③
- 32.在伯格費力程度自我評量表（Borg Rate of Perceived Exertion Scale）中，「完全不費力」是幾分？
- A.0
  - B.4
  - C.6
  - D.8
- 33.類風濕性關節炎在手指關節部位所產生的天鵝頸變形（swan-neck deformity），其特徵為何？①PIP joint過度伸直 ②PIP joint彎曲 ③DIP joint過度伸直 ④DIP joint彎曲
- A.①③
  - B.①④
  - C.②③
  - D.②④
- 34.橈骨遠段的骨折常合併各種症狀，下列何者較不會出現？
- A.伸拇長肌（extensor pollicis longus）肌腱斷裂
  - B.肌腱抓握（tenodesis grasp）能力變弱
  - C.關節炎
  - D.背側橈側感覺喪失
- 35.老年人在記憶過程中，通常那一步驟呈現較明顯的退化現象？
- A.注意力
  - B.處理訊息
  - C.貯存訊息
  - D.抽取訊息
- 36.帕金森氏症患者之主要症狀不包括：
- A.震顫
  - B.僵直
  - C.運動徐緩
  - D.共濟失調
- 37.臉部及四肢燒傷之病患除了常見的攣縮問題外，其他潛在的後遺症不包括下列何者？
- A.搔癢症
  - B.異位骨化
  - C.小口畸形
  - D.不耐寒冷
- 38.協助橈神經損傷患者抓握東西，下列何種副木處置較為適當？
- A.豎腕副木（wrist cock-up splint）
  - B.背面動態伸展副木（dorsal dynamic extension splint）
  - C.短型拇指對掌副木（short opponens splint）
  - D.掌面休息副木（volar resting splint）
- 39.風濕性關節炎突發疼痛時，下列何者不是適當處理？
- A.提供動態副木以協助手部運動

- B.提供靜態休息用副木
  - C.教導關節保護技巧
  - D.提供輔助器具
- 40.關於手部損傷後的傷口（wounds）評估，下列敘述何者正確？
- A.評估傷口時常會用三顏色之概念判定傷疤狀況，分別為紅、紫及黑三個顏色
  - B.可藉由傷口之滲出物質（drainage）判定傷口復原情形，如有深紅色分泌物表示復原情形良好
  - C.如傷口顏色為黑色，表示可能有組織壞死之情形，可能須接受清創（debridement）手術
  - D.如傷口呈現紅色，表示有分泌物滲出，需清洗傷口或做清創（debridement）處理
- 41.下列關於Gamekeeper's thumb的敘述及處理原則何者正確？
- A.其致傷的原因多為拇指受到一內收及伸展方向強大的力量，導致掌指關節之橈側側韌帶（radial collateral ligament）撕裂或斷裂
  - B.臨床分類上依據韌帶受傷的嚴重程度分為4級，以第4級韌帶完全斷裂最為嚴重
  - C.針對第2級的患者，建議穿戴以手部為基礎的拇指固定副木（hand-based thumb immobilization splint）4–5週，以提供韌帶修復
  - D.類似的病症為掌指關節之尺側側韌帶（ulnar collateral ligament）撕裂或斷裂所造成之golfer's thumb
- 42.下背痛個案的人體工學（body mechanics）介入處理原則，下列敘述何者錯誤？
- A.個案欲坐下時，其策略應為先彎腰減輕背部壓力，再接續屈曲髖關節及膝關節
  - B.當長時間清洗碗盤時，患者應將一側腳墊高置於小板凳上，避免骨盆過度前傾
  - C.搬物時避免脊椎出現扭轉（twisting）動作而造成脊柱旁韌帶或小肌肉拉傷
  - D.對於需長時間久坐之患者，維持於一稍為往後傾斜的坐姿是較正襟危坐之坐姿為合適的
- 43.教導關節炎患者的關節保護（joint protection）時，下列原則何者錯誤？
- A.避免關節持續受力，關節炎個案應避免執行肌力及關節活動度之訓練
  - B.儘可能使用大且強壯的關節動作替代小關節的活動
  - C.應避免在同一工作姿勢維持過久的時間，必須在活動及休息之間取得生活平衡
  - D.手部動作時應儘可能避免使用掌指關節往尺側偏移（ulnar deviation）方向施力
- 44.Glasgow Coma Scale是用來評估意識之工具，其中口語反應（Verbal response）V4所代表的意思是：
- A.不會發出聲音
  - B.會發出一些無從被理解的聲音
  - C.問話時有答非所問的混淆情形
  - D.問話時反應適切
- 45.職能治療的目標若在改善個案上肢的肌肉力量，則慣用手與非慣用手的肌力應設定在多少%的差異範圍內？
- A.0–5
  - B.10–15
  - C.20–30
  - D.35–40
- 46.關於燒燙傷的介入，下列何者錯誤？
- A.壓力衣起始壓力宜從25 mmHg開始
  - B.已產生骨質增生（heterotopic ossification）的部位應避免作過度的關節活動
  - C.擴口器（microstomia device）不適用於意識不清者
  - D.增加戶外活動時間以加速疤痕成熟（scar maturation）
- 47.下列為C6頸髓完全損傷患者獨立維持前傾坐姿平衡（forward sitting balance）的動作，何者錯誤？
- A.肩下壓（shoulder depression）
  - B.肩外轉（shoulder external rotation）
  - C.肩胛內縮（scapula retraction）
  - D.肘伸直鎖住（elbow extension lock）
- 48.下列項目中那些是心肌梗塞（myocardial infarction）的臨床症狀？①心絞痛（angina pectoris） ②發汗（diaphoresis） ③呼吸急促 ④噁心（nausea） ⑤臉色潮紅
- A.①②③④⑤
  - B.僅①③④⑤
  - C.僅①②③④
  - D.僅①③④

- 49.下列何種情況是考慮進行肌腱鬆解術（tenolysis）的最可能原因？
- A.神經損傷
  - B.肌腱斷裂
  - C.關節變形
  - D.肌腱黏連（adhesion）
- 50.非複雜性肘關節上髁骨折（supracondylar fracture），肘關節應用副木固定於屈曲多少度？
- A.90—100
  - B.60—70
  - C.30—45
  - D.15—30
- 51.下列何者是下肢截肢最主要的原因？
- A.外傷
  - B.周邊血管病變
  - C.蜂窩性組織炎
  - D.惡性腫瘤
- 52.下列有關腦傷病人的行為與可能的視覺缺失配對，何者錯誤？
- A.看東西時遮蔽單眼：單側視覺忽略
  - B.看東西時頭部歪斜特定的角度：視野缺損
  - C.伸手拿眼前物體時錯估距離：複視
  - D.走路時撞上牆壁或空間中物體：視野缺損
- 53.劉伯伯為一單側中風病患，病後患側上肢幾乎沒有任何的動作功能存在，造成個案每次到餐廳吃牛排時都有很明顯的困難。請問劉伯伯最不需要下列何種進食輔具？
- A.底部有吸盤的盤子
  - B.以萬用套（universal cuff）固定刀叉
  - C.邊緣有加高設計的盤子
  - D.弧形刀具（rocker knife）
- 54.關於標準型式手動輪椅的尺寸量測，下列敘述何者正確？①座寬為臀部寬度再加5公分 ②扶手高度為肩關節自然下垂與手肘彎曲90度時的前臂下緣處 ③座深為臀部後外緣至膝窩處再減2.5至5公分 ④腳踏板應離地5公分 ⑤肩峰即為輪椅的靠背高度
- A.僅①②③④
  - B.僅②③
  - C.僅①④⑤
  - D.①②③④⑤
- 55.依據職能治療實務架構（Occupational Therapy Practice Framework），下列有關個案的敘述，是受到各種類型情境（context）的影響，何者不正確？
- A.個案具有「努力付出就可克服障礙」的價值觀：文化（cultural）情境
  - B.個案因家庭支持系統不佳，而需入住長照機構：社會（social）情境
  - C.宗教信仰提供個案「繼續努力復健必成功」的信念：個人（personal）情境
  - D.個案因行動不便，而選擇網路購物：虛擬（virtual）情境
- 56.當個案僅有生理上的受限以致無法重回工作時，利用半天的治療活動（如有氧運動等）來促進個案神經肌肉功能的恢復，使其順利重返職位。此方式為：
- A.工作強化（work hardening）
  - B.工作適應（work conditioning）
  - C.職業訓練
  - D.現場試做
- 57.下列有關認知功能與評估工具之配對，何者正確？
- A.概念形成—桃氏種類測驗（Toglia's Category Assessment）
  - B.自我覺察—廚房工作測驗（Kitchen Task Assessment）
  - C.執行功能—病人能力評價量表（Patient Competency Rating Scale）
  - D.解決問題—數字警覺測驗（Digit Vigilance Test）
- 58.治療師可教導個案下列何種技巧以促進其解決問題之能力？
- A.視覺心像（visual imagery）
  - B.語意詳述（semantic elaboration）
  - C.自我預測
  - D.方法—結果（means-ends）分析
- 59.罹患周邊神經病變的個案，其患肢最早出現的感覺障礙為：

- A.在沒有視覺的輔助下，無法分辨鉛筆和原子筆  
B.皮膚受傷也不覺疼痛  
C.皮膚碰到冰水不覺得冷  
D.無法判斷洗澡水的冷熱
- 60.根據 Warren 的視知覺發展階層，由基礎至高階排列，下列何種順序為正確？  
A.視覺注意力→掃瞄→視覺記憶→樣式辨認  
B.掃瞄→視覺注意力→樣式辨認→視覺記憶  
C.視覺注意力→掃瞄→樣式辨認→視覺記憶  
D.掃瞄→視覺注意力→視覺記憶→樣式辨認
- 61.無論是退化性（OA）或類風濕性關節炎（RA），均會影響手部功能，並可能導致手部畸形的產生，下列敘述何者正確？  
A.無論 OA 或 RA，均可能讓病患的近端指間關節因軟骨破壞導致骨頭增生腫大，出現 Heberden's node  
B.在 RA 病患的手常出現的特徵即為，掌指關節出現背側脫臼、尺側偏移並有伸指肌腱往內側滑移之現象  
C.RA 病患的 type I 拇指關節變形（boutonniere deformity），會造成 MP 關節屈曲及 IP 關節過度伸展，但 CMC 關節通常不受影響  
D.OA 或 RA 所產生的關節破壞及變形，多好發在四隻手指上，發生在拇指的機會較為小
- 62.因打電玩過多致大拇指側枝韌帶受傷，副木固定大拇指應以下列何者為適當？  
A.長型副木，腕掌關節（CMC joint）外展 15 度  
B.長型副木，掌指關節（MP joint）外展 15 度  
C.短型副木，腕掌關節（CMC joint）屈曲 0~10 度  
D.短型副木，掌指關節（MP joint）屈曲 0~10 度
- 63.游伯伯是一名中風個案，其肩關節處於半脫位（subluxation）及有疼痛感的狀態，下列情況何者較不需要介入而改善之？  
A.個案練習走路時，患側手下垂而腫脹  
B.個案在家中行走時，患側手插於褲子口袋內  
C.家屬對個案的患側肩關節進行屈曲及外展被動關節活動時，未協助患側的肩胛骨做旋轉  
D.個案使用三角巾式肩吊帶時，長時間維持上肢屈曲姿態
- 64.一名 38 歲的中風個案，即將回到家中擔任家庭主婦的角色，治療師希望增強她的動作學習能力（motor learning ability）與問題解決能力，下列的治療策略何者不適當？  
A.與個案共同討論活動類型後多加練習  
B.教導個案活動分析相關技巧，並使其了解環境因子對動作的影響  
C.讓個案學習在不同環境中練習，並聚焦於動作結果、記錄動作進步情況  
D.治療師在活動中持續給予立即的回饋，促進其動作學習
- 65.下列那項評估工具不適合評量中風病患之動作技巧及動作功能之問題？  
A.富格梅爾測驗（The Fugl-Meyer Test）  
B.功能性伸手測驗（Functional Reach Test）  
C.行為研究手部測驗（Action Research Arm Test）  
D.半側癱瘓上肢功能測驗（The Functional Test for the Hemiplegic/ Paretic Upper Extremity）
- 66.下列關於推者症候群（Pusher Syndrome）的敘述，何者錯誤？  
A.將患者身體推向健側時，個案健側會拒絕承重  
B.坐姿或站立時若無外力協助穩定，非常容易向前傾倒  
C.有此症候群的患者，右腦損傷者比例高於左腦損傷者  
D.可能伴隨單側忽略的問題
- 67.為心臟疾病患者進行運動測試時，下列那些生理徵兆為其對運動無法承受（exercise intolerance）的現象？  
A.胸口疼痛通常會轉移至腹部  
B.體重不尋常下降，約 1~3 日下降 3~5 lbs  
C.產生嘔吐暈眩的現象  
D.下肢水腫
- 68.下列關於手指肌腱受傷所致畸形成因的敘述，何者正確？  
A.鵝頸指畸形（swan-neck deformity）是因手指伸肌的中央瓣片（central slip）斷裂  
B.槌狀指畸形（mallet finger）是因手指伸肌的末稍肌腱斷裂  
C.鈕扣指畸形（boutonniere deformity）是因手指屈肌的末稍肌腱斷裂

- D.遠端指關節扭傷是因手指屈肌的側邊瓣片（lateral band）斷裂
- 69.刺激一中風患者的單側手臂時，其可正確分辨刺激源，但當治療師同時給予兩側手臂刺激時此患者無法明確區分出是那一側，則此現象為下列何者？
- A.Anosognosia  
B.Allesthesis  
C.Extinction  
D.Hypometria
- 70.屈指肌腱斷裂經過縫合手術（flexor tendon repair）後，使用副木型態何者為宜？
- A.背側穿戴，腕關節屈曲 30°，掌指關節約屈曲 70°  
B.腹側穿戴，腕關節屈曲 30°，掌指關節約屈曲 70°  
C.背側穿戴，腕關節屈曲 30°，掌指關節約屈曲 90°  
D.腹側穿戴，腕關節屈曲 30°，掌指關節約屈曲 90°
- 71.依據Hoehn及Yahr定義帕金森氏症的五個分級階段，下列敘述何者錯誤？
- A.第一級：通常僅有單側出現靜止震顫（resting tremor）症狀  
B.第二級：雙側出現症狀，但沒有平衡問題  
C.第三級：出現平衡問題，但日常生活活動仍可完全自理  
D.第五級：無法行走，需使用輪椅或臥床
- 72.治療師正在替一名 52 歲的左大腦梗塞的中風個案治療。目前個案主動動態姿勢控制（dynamic postural control）不佳，下列何種活動為改善此個案問題的最佳活動？
- A.請個案以健側手撿起掉落在地上的物品  
B.請個案在坐姿下折疊衣服  
C.鼓勵個案使用右邊上肢穿衣服，以促進其使用患側上肢的機會  
D.設計個案家中浴室的扶手，以便個案在洗澡時不易跌倒
- 73.從那一脊髓神經節以下，受傷時就不會影響呼吸功能？
- A.腰髓第二節  
B.胸髓第二節  
C.胸髓第六節  
D.胸髓第十二節
- 74.由植物人進入意識恢復的階段，通常最早期的徵兆是什麼？
- A.自發性的言語  
B.自行抬舉手腳  
C.情緒的表達  
D.持續的追視移動物體
- 75.針對腦傷早期階段的病人出現躁動現象時，下列處置何者錯誤？
- A.建立規律可預期的生活常規步驟  
B.一但出現躁動的跡象立即準備轉換活動  
C.若病人動作能力許可，建議從事類似拍氣球的大動作活動  
D.病人出現猥褻或怪異的言語時，需立即給予回應
- 76.下列關於腦傷的敘述何者錯誤？
- A.局部性腦傷（focal brain injury）最常見的受傷部位為額葉及顳葉  
B.硬腦膜上出血（epidural hemorrhage）病程進展急速，病患可能由原本清醒狀態轉為意識急遽惡化  
C.由昏迷中清醒的病人最常見的失憶症為回溯性失憶症（retrograde amnesia）  
D.一旦出現創傷後癲癇（post-traumatic seizures），復發率超過 80%
- 77.依照瑞裘認知功能層級（Rancho Levels of Cognitive Functioning），下列關於 Level VII 的主要臨床表徵敘述何者正確？
- A.缺乏判斷能力及問題解決能力  
B.情緒高昂、易怒，具攻擊性  
C.對於熟悉的環境能有適切反應，但挫折忍受度低  
D.對於簡單口語指令能有適當反應，但容易分心
- 78.有關慢性阻塞性肺炎（COPD）患者出院後之 home program，下列何者正確？①鼓勵患者漸進訓練其上肢及肩帶之肌力②從事上肢的活動時可予以支撐，較可降低耗氧量③協助並訓練患者使用輔具達到日常生活獨立④提高室內的溫度與濕度，可促進呼吸順暢
- A.①②③  
B.①③④  
C.①②④



D.②③④

79.市售的預製成形副木（prefabricated splints），最大的缺點為何？

- A.價錢太昂貴
- B.外觀不佳
- C.材質種類有限
- D.不一定合身

80.下列那幾個量表或工具，是適合職能治療師用來評估癌症治療對生活品質之影響：① 癌症治療之功能性評估（ Functional Assessment of Cancer Therapy）② 簡明疲憊量表（ Brief Fatigue Inventory）③ 安德森症狀量表（ M.D. Anderson Symptom Inventory）

- A.僅①
- B.僅②
- C.僅③
- D.①②③