

103年第一次專門職業及技術人員高等考試醫師中醫師考試分階段
考試、中醫師、營養師、心理師、護理師、社會工作師考試試題

代號：5105
頁次：8-1

等 別：高等考試

類 科：中醫師(二)、中醫師

科 目：中醫臨床醫學(二) (包括中醫內科學、中醫婦科學、中醫兒科學)

考試時間：1 小時 30 分

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 1 72 歲男性患者罹患慢性阻塞性肺病而肺功能較差，已有心肺症，症見胸悶、刺痛，手足麻，舌青紫、瘀點，脈澀者，治以下列何方最適宜？
(A)千金葶藶湯 (B)補中益氣湯 (C)血府逐瘀湯 (D)百合固金湯
- 2 有關支氣管哮喘預防保健方法，下列敘述何者錯誤？
(A)哮喘每因氣候突然變化，特別是寒冷空氣刺激而誘發，故患者應注意避免感冒
(B)飲食宜清淡，忌食肥甘厚味，如酒、魚、蝦蟹、肥肉、濃茶等
(C)若見實喘，禁食補品；只有在身體虛弱的患者，才適合食用
(D)凡見痰黏稠之症，均宜食梨子以潤肺化痰
- 3 62 歲女性患者有多年支氣管擴張病史，近一年來症見咳逆喘息少氣，咳痰夾血絲色暗淡，白天常動則出汗，形寒肢冷，五更腹瀉。診其脈虛大無力，舌質紅少津，依中醫辨證，下列何者最適宜？
(A)陰陽兩虛 (B)痰濁阻肺 (C)肺腎氣虛 (D)肺腎陰虛
- 4 承上題，治以下列何方最適宜？
(A)百合固金湯 (B)參蛤散 (C)補天大造丸 (D)蘇子降氣湯
- 5 25 歲男性患者上呼吸道感染，症見咽乾、咽痛、痰黃、涕黃、身熱微惡寒、脈浮數、苔薄白，舌質微紅等症，醫師用荊防敗毒散治療，最可能出現下列何種預後？
(A)有助熱燥液動血之弊 (B)汗不易出，病邪難以外達
(C)重傷正氣 (D)邪速從表解
- 6 30 歲患者於感冒 5 天後發生咳嗽，呼吸困難，測量體溫 38.3℃，理學檢查：在右側肩胛骨尖端下方，叩診時呈現濁音，該部位之呼吸音消失，無濕性囉音；在該濁音區域之附近聽診時，可聽到一些濕性囉音及支氣管呼吸聲，中醫師診察後，症見舌紅，苔黃，脈滑數。下列何方可優先考量使用？
(A)十棗湯 (B)茯苓桂枝白朮甘草湯
(C)小青龍湯 (D)大青龍湯
- 7 65 歲男性患者，自訴 2-3 個月前由 24 小時心電圖診斷為病態竇房結綜合徵 (sick sinus syndrome)，其望診面白少華，精神倦怠，舌淡胖有齒痕，舌苔白邊少苔多津，舌下絡脈怒張，問診其症狀有頭暈心悸、胸悶氣促、手足冰冷乏力等，切診其脈遲澀無力。下列相關敘述何者錯誤？
(A)辨證為心腎陽虛為主
(B)可以人參、黃耆、附子、肉桂等藥物為主治療
(C)本病多為病毒感染所致，可輔以抗病毒藥物治療
(D)本病多夾有血瘀，可輔以活血藥物治療

- 8 臨床上「心悸」常源自其他臟腑的生理失調，間接影響到心臟的功能，下列何者不屬於上述狀況？
(A)房勞過度，或長期憂思驚恐，導致腎陰虧損，虛火妄動，擾亂心神，形成心悸
(B)飲食無度，膏粱厚味煎炸炙烤，生痰蘊熱化火，痰火擾心，導致心悸
(C)天氣寒冷，寒邪外束，心脈收引，脈氣不利，造成心悸
(D)年老或勞役過度，導致脾腎陽虛，無以運化水液，聚而成飲。飲邪上泛，心陽被遏，造成心悸
- 9 61 歲女性患者有多年高血壓糖尿病病史。來診時主訴最近一個月經常心悸發作，同時伴有眩暈、噁心嘔涎、脘腹痞脹、手足不溫、小便短少等症狀。其臨床辨證以下列何者最有可能？
(A)心脾兩虛 (B)腎陰虛火旺 (C)水飲凌心 (D)痰火擾心
- 10 承上題，中醫師投以處方，一週後回診時患者反應服藥一日後心悸、眩暈明顯減輕，脘腹痞脹較消，尿量增加。依中醫辨證論治的原則，下列何者是最可能讓病情改善的處方？
(A)桂枝湯 (B)養心湯 (C)真武湯 (D)八味地黃丸
- 11 有關肺痿的敘述，下列何者錯誤？
(A)以咳嗽胸痛，吐痰腥臭，甚至咳吐膿血為主證
(B)是肺臟的慢性虛損性疾患
(C)病因可分肺燥津傷和肺氣虛冷，使得肺氣失於濡養而日漸枯萎
(D)治療要注意保護津液，不可妄投燥熱之劑
- 12 患者嘔吐清水痰涎，胸悶不食，心悸頭眩，舌苔白膩，脈滑，應診斷為下列何種證型最適宜？
(A)外邪犯胃 (B)飲食停滯 (C)痰飲內停 (D)脾胃氣虛
- 13 患者腹痛綿綿，喜熱喜按，飢勞更甚，神疲乏力，氣短，畏寒，便溏，舌淡苔白，脈沉細，治以下列何方最適宜？
(A)良附丸 (B)小建中湯 (C)安中散 (D)痛瀉要方
- 14 有關「癰閉」的辨證，下列敘述何者錯誤？
(A)老年排尿無力、點滴而下者，為腎虛命門火衰
(B)口渴欲飲、咽乾氣促、小便難出者，為熱積膀胱
(C)小便不利兼有小腹重脹、肛門下墜，為中氣不足
(D)尿線變細，或時而通暢，時而不通，為尿路阻塞
- 15 患者大便時溏時瀉，水穀不化，飲食減少，稍進油膩之物，則大便次數明顯增多，面色萎黃，肢倦乏力，舌淡苔白，脈細弱。治以下列何方最適宜？
(A)四神丸 (B)參苓白朮散 (C)藿香正氣散 (D)胃苓湯
- 16 有關哮喘發作辨證論治之敘述，下列何者錯誤？
(A)寒哮喘痰色白、稀薄、泡沫或黏膩，咯吐不爽，主方以小青龍湯為主
(B)痰哮仍痰涎壅盛，喉如曳鋸，咯痰黏膩難出，主方以蘇子降氣湯或麥門冬湯為主
(C)熱哮喘黃或白，黏濁稠厚，咳吐不利，可使用越婢加半夏湯
(D)射干麻黃湯可用於治療寒哮
- 17 40 歲女性患者，自訴與朋友至冷飲店喝完綠奶茶後，胃痛不舒，食不下，上腹脹滿。診其舌淡紅苔白，脈弦緊。治以下列何方最適宜？
(A)黃耆建中湯 (B)安中散 (C)香砂六君子湯 (D)理中湯

- 18 患者嘔吐吞酸，噯氣頻繁，胸脅滿痛，舌邊紅，苔薄膩，脈弦。下列治法何者最適宜？
 (A)消食化滯，清胃止嘔 (B)疏肝理氣，和胃降逆
 (C)溫中化飲，治脾止逆 (D)溫養脾胃，降逆止嘔
- 19 56 歲女性患者主訴脅痛以脹痛為主，走竄不定，疼痛每因情志變化而增減，胸悶不舒，飲食減少，矢氣頻作。診其苔薄，脈弦。治以下列何方最適宜？
 (A)柴胡疏肝散 (B)旋覆花湯 (C)龍膽瀉肝湯 (D)一貫煎
- 20 53 歲女性患者，會診症見腹大脹滿，腹診按之如囊裹水，脘腹痞脹，得熱稍緩，精神困倦，怯寒懶動，尿少便溏，顏面及下肢浮腫，苔白膩。下列治法何者最適宜？
 (A)攻下逐水，清熱利濕 (B)行濕散滿，疏肝理氣
 (C)溫中健脾，行氣利水 (D)溫肺補脾，化氣行水
- 21 承上題，治以下列何方最適宜？
 (A)實脾飲 (B)胃苓湯合柴胡疏肝散
 (C)附子理中湯合濟生腎氣丸 (D)茵陳蒿湯合中滿分消丸
- 22 45 歲男性患者主訴眼瞼浮腫，繼則全身浮腫，伴有惡風、發熱、肢節痠楚，小便不利。診其舌紅、脈滑數，患者診斷以下列何證最適宜？
 (A)濕熱內蘊 (B)脾腎陽虛 (C)風水泛濫 (D)水濕浸漬
- 23 承上題，治以下列何方最適宜？
 (A)小薊飲子 (B)實脾飲 (C)五苓散 (D)越婢加朮湯
- 24 45 歲男性患者主訴小便淋瀝不已，時作時止，遇勞即發，腰膝痠軟，神疲乏力。診其舌淡、脈弱，治以下列何方最適宜？
 (A)無比山藥丸 (B)五淋散 (C)加味逍遙散 (D)補陽還五湯
- 25 58 歲男性患者，症見小便量少幾近全無，兼見手指顫抖、頭痛、齒齦腫痛糜爛，皮膚瘙癢，煩躁不安。診其舌光剝無苔，舌紅、卷縮，脈細弦數，治以下列何方最適宜？
 (A)知柏八味丸 (B)調肝散 (C)秦艽鱉甲散 (D)鎮肝熄風湯
- 26 50 歲男性因為頻尿看診，主訴尿多、尿濁、形體消瘦與口渴飲多。診其舌紅脈數，患者診斷以下列何者最適宜？
 (A)膏淋 (B)消渴 (C)熱淋 (D)虛淋
- 27 有關淋證之敘述，下列何者錯誤？
 (A)沉香散可同時用在「氣淋實證」與「肝鬱氣滯型癃閉」
 (B)八正散對於「膀胱濕熱型癃閉」與「熱淋」皆可用
 (C)腎氣丸可用在「腎陽衰憊型癃閉」與「膏淋」症
 (D)補中益氣湯使用在「脾氣不升型癃閉」與「氣淋虛證」均可
- 28 15 歲男性患者，一週前先是眼瞼面部水腫，最近兩日繼而全身浮腫。胸部 X 光檢查：心臟大小正常；尿液檢查：尿蛋白++、紅血球 10~15/HPF；血壓 150/100 mmHg。病人尚有惡風、發熱、四肢關節腰部痠楚、尿少、舌紅、脈滑數。治以下列何方最適宜？
 (A)越婢湯 (B)豬苓湯 (C)導赤散 (D)八正散

- 29 72 歲男性患者，主訴小便點滴而出，時常要跑廁所，大約每半小時一次，醫師診其舌淡脈沉細尺偏弱，腰膝痠軟無力，也易手腳冰冷，治以下列何方最適宜？
(A)五苓散 (B)補中益氣湯 (C)八正散 (D)金匱腎氣丸
- 30 50 歲男性患者，近來突發頭暈頭痛、記憶力減退、視力下降等情形，醫師診察時發現上肢發冷、麻木疼痛、脈搏動減弱並伴有局部身熱、乏力、肌肉關節痠痛、大便不順暢、舌質紅、苔黃膩、脈數，治以下列何方最適宜？
(A)黃耆桂枝五物湯 (B)桂附八味丸 (C)陽和湯 (D)四妙勇安湯
- 31 承上題，此病症最接近於中醫何者之範疇？
(A)骨痹 (B)脈痹 (C)肌痹 (D)皮痹
- 32 有關痹證與痿證的鑑別，下列敘述何者最正確？①痹證四肢均易罹患 ②痿證以下肢為主 ③痹證多有疼痛，痿證一般不痛 ④痹證與痿證一般都會有肌肉瘦削之症
(A)①②④ (B)①②③ (C)②③④ (D)①③④
- 33 66 歲女性硬皮症患者，症見顏面與肢體皮膚變硬變薄，伴有身倦乏力，頭暈腰痠，吞嚥不利，四肢冰冷，手足遇寒變白變紫，舌質淡，苔白，脈弱沉遲，下列證型診斷何者最適宜？
(A)寒濕壅肺 (B)痰瘀阻絡 (C)肺胃陰虛 (D)陽虛寒凝
- 34 承上題，治以下列何方最適宜？
(A)一貫煎 (B)陽和湯 (C)身痛逐瘀湯 (D)六味地黃丸
- 35 有關消渴病之敘述，下列何者錯誤？
(A)病變中心以脾虛最為重要
(B)本病最多三消合病並見
(C)因病多虛證，雖有火燥，不可過投寒涼攻下
(D)腎有水火陰陽，消證腎虛精耗，火浮為多
- 36 55 歲女性患者尿頻，泡沫多色黃，體重下降，腰痠，手足心熱，大便乾 2 個月，西醫診斷為糖尿病。診其口乾苦，舌嫩紅，有裂紋，少苔，脈沉細數，其診斷以下列何種證型最適宜？
(A)腎陰虛火旺 (B)腎陰虛夾濕熱 (C)腎氣陰兩虛 (D)肝腎陰虛
- 37 承上題，治以下列何方最適宜？
(A)甘露飲 (B)知柏地黃丸 (C)一貫煎 (D)八仙長壽丸
- 38 有關癰病的敘述，下列何者錯誤？
(A)《三國志·魏書》有「十人割癰九人死」是中國最早關於反對癰病進行手術的記載
(B)《肘後救卒方》中用昆布、海藻治療癰病，是中醫典籍之中最早使用含碘藥材治療癰病的記載
(C)《千金要方》中對癰病提出了石癰、肉癰、筋癰、血癰、氣癰等五種分類
(D)《陳無擇·三因極一病證方論》認為癰病主要應以內服藥治療，反對癰病施以刀針治療
- 39 25 歲孕婦因為頸前腫塊前來看診，觀察其腫塊位於頸部正中線，均勻對稱，觸感表面平滑，質地柔軟，可以隨吞嚥動作而活動，患者常常覺得胸脅悶，但沒有煩熱、眼突、指顫、急躁易怒等症狀，舌淡紅，苔白，脈弦，則下列何者治法最適宜？
(A)《外臺秘要》昆布丸 (B)《瘍醫大全》四海舒鬱丸
(C)《類證治裁》梔子清肝湯 (D)《儒門事親》化癰丹

- 40 53 歲男性患者，門診主訴眩暈反覆一年多，每因煩勞或惱怒而發作，面潮紅，急躁易怒，少寐多夢，口苦，舌質紅苔黃，脈弦。其證治以下列何者最適宜？
- (A)氣血虧虛，方用歸脾湯 (B)痰濁中阻，方用半夏白朮天麻湯
(C)腎陰虛內熱，方用左歸丸 (D)肝陽上亢，方用天麻鉤藤飲
- 41 28 歲女性患者，二個月前早產，近來常覺健忘，偶爾會恍惚，容易受驚嚇，頭暈心悸，食慾不振，常掛心小嬰兒，家人都說她臉色越來越差。診其舌質淡紅偏淡，苔白，脈細而無力，治以下列何方最適宜？
- (A)甘麥大棗湯 (B)歸脾湯 (C)丹梔逍遙散 (D)滋水清肝飲
- 42 7 歲男童，因神志昏迷會診，一週前高熱至今，口噤抽搐，全身肌肉張力上升。望其唇紅而乾、舌質紅絳，苔黃而乾甚，脈緊而數，觸之額頭及四肢均熱甚。依上證治以下列何方最適宜？
- (A)清宮湯送安宮牛黃丸 (B)羚羊鉤藤湯合安宮牛黃丸
(C)天麻鉤藤湯送服至寶丹 (D)安宮牛黃丸送服大黃末
- 43 25 歲患者於 10 天前淋雨後感到頭痛頭脹，往往頭如戴帽子的感覺，且四肢沉重，食慾變差。診其脈濡，苔白膩，治以下列何方最適宜？
- (A)川芎茶調散 (B)羌活勝濕湯 (C)柴葛解肌湯 (D)藿香正氣散
- 44 20 歲男性患者在中學求學時期就少與同學往來，於家中亦見其靜默少言，一年前因在服兵役時，常常神志痴呆，語無倫次或喃喃自語而提前退伍，就診時見其表情淡默，不思飲食，診其舌苔膩，脈弦滑，治以下列何方最適宜？
- (A)順氣導痰湯合控涎丹 (B)養心湯加減
(C)甘麥大棗湯加菖蒲、鬱金 (D)歸脾湯加減
- 45 積病是指腹內有結塊，或脹或痛的病證。依《丹溪心法·積聚痞塊》認為積病後期治療有培補氣血扶正攻瘀的治則，但不可用下列何藥？
- (A)清熱藥 (B)消積藥 (C)攻下藥 (D)化痰藥
- 46 58 歲女性，胃癌第三期患者，胃部手術切除，並進行化學治療。治療期間，納差，食不下，身體遽瘦，語音低微，氣短懶言，面色蒼白，寒熱交作。下列治療原則何者最適宜？
- (A)補益肺氣，調和營衛 (B)扶養脾胃，補氣益損
(C)平肝健肺，溫補腎陽 (D)疏肝理氣，和胃降逆
- 47 對於各類型耳鳴的敘述，下列何者最正確？
- (A)腎虛者耳竅轟鳴，攻逆陣作 (B)痰濁者耳鳴，時輕時重，煩悶不舒
(C)肝火者耳鳴聲細，如蟬持續，怒則加重 (D)陽虛者耳鳴時作，午後加重
- 48 34 歲女性患者大便秘結，欲便不得，噯氣頻作，胸脅痞滿，腹中脹痛，時作時止，納食減少，苔薄白膩，脈弦。治以下列何方最適宜？
- (A)麻子仁丸 (B)六磨湯 (C)大承氣湯 (D)調胃承氣湯
- 49 月經先期的患者，若經量多、經色紫紅、質稠黏。下列何者是最可能的證型？
- (A)氣虛血熱 (B)陰虛血熱 (C)陽盛血熱 (D)濕熱內蘊

- 50 40 歲患者，月經量多，色淡而質清稀，面色白，偶心悸，氣短懶言，舌質淡紅、苔薄白，脈弱。治以下列何方最適宜？
- (A)人參、黃耆、白朮、升麻、炙甘草 (B)當歸、川芎、熟地、白芍
(C)茜草、益母草、當歸、川芎 (D)白芍、龜板、黃芩、黃柏、椿根皮、香附
- 51 「月經過少」之治法，著重在下列何者？
- (A)利下化瘀 (B)濡養精血 (C)涼血清熱 (D)祛邪扶正
- 52 一般痛經病人，因痛發作的時間不同而有虛實不同的辨證，下列有關這些辨證的敘述何者最正確？
- (A)經前痛作者均屬虛 (B)經行痛甚者均屬實
(C)經後綿綿作痛者多屬虛 (D)經後始痛發作者多屬實
- 53 52 歲患者經期紊亂、經量少、色紫、頭暈目眩、耳鳴、潮熱、煩躁易怒、舌質紅、脈細數，下列辨證何者最適宜？
- (A)肝鬱化火 (B)腎虛肝旺 (C)腎陰陽兩虛 (D)肝腎兩虛
- 54 承上題，治以下列何方最適宜？
- (A)丹梔逍遙散合涼膈散 (B)右歸飲合理中丸
(C)二仙湯合二至丸 (D)知柏地黃湯合龍膽瀉肝丸
- 55 經血時下時止，閉經日久又突下，血量多、色紫黑、有血塊、小腹疼痛、拒按、脈弦緊、舌色紫瘀斑。治以下列何方最適宜？
- (A)當歸、熟地、黃耆、人參、白朮、炮薑
(B)生地、生白芍、花蕊石、棕櫚炭、藕節炭、煅牡蠣、側柏葉、地骨皮、石斛、黃芩、玄參
(C)當歸、生地、赤芍、川芎、蒲黃炭、五靈脂、茜草、烏賊骨、三七
(D)生地、當歸炭、生白芍、丹皮、槐花、旱蓮草、仙鶴草、炒蒲黃、熟軍炭
- 56 一婦人婚後久不受孕，經行延後，帶下量多，質黏稠，面色白，頭暈心悸，胸悶泛噁，苔白膩，脈滑，治以下列何方最適宜？
- (A)《景岳全書》毓麟珠 (B)《傅青主女科》開鬱種玉湯
(C)《濟生方》歸脾湯 (D)《葉天士女科》蒼附導痰湯
- 57 38 歲患者常常陰道氣出有聲，伴隨帶下量多色白質黏，口膩痰多，胃脘痞悶，舌淡紅苔白膩，脈滑。治以下列何方最適宜？
- (A)完帶湯 (B)豬膏髮煎 (C)補中益氣湯 (D)橘半桂苓枳薑湯
- 58 有關「臟躁」與「甘麥大棗湯」之敘述，下列何者最正確？①本病主要表現在神志的異常改變 ②本病屬內傷虛證，五志化火而成 ③《金匱心典》認為小麥為心之穀，而善養其氣 ④治宜清降瀉火
- (A)③④ (B)①② (C)①②③ (D)①②③④
- 59 因氣血虛弱引起之胎動不安，治以下列何方最適宜？
- (A)《醫學衷中參西錄》壽胎丸 (B)《景岳全書》胎元飲
(C)《景岳全書》保陰煎 (D)《金匱要略》膠艾湯

- 60 患者懷孕 36 週，出現面目及四肢浮腫，皮薄而光亮，膚色淡黃，問診發現病患還有胸悶短氣，不喜歡多說話，食慾不振，口淡無味，大便較稀軟。望其舌苔薄白，舌質胖嫩邊有齒痕，診其脈緩滑無力。治以下列何方最適宜？
- (A)黃耆、桔梗、升麻、知母、柴胡
(B)黨參、白朮、茯苓、甘草、陳皮、法半夏
(C)白朮、茯苓皮、大腹皮、生薑皮、陳皮
(D)茯苓、豬苓、砂仁、陳皮、木香、檳榔、大腹皮、白朮、澤瀉、蘇梗、木瓜、桑白皮
- 61 產後病，古人有「三急」、「三衝」、「三病」之說。下列何者不是「三急」之一？
- (A)痙症 (B)嘔吐 (C)盜汗 (D)泄瀉
- 62 患者臨產分娩時，陣痛微弱，宮縮時間短，間歇時間長，產程進展緩慢。診其面色蒼白，舌淡苔薄，病人且覺疲乏，四肢無力，氣短，脈大而虛。治以下列何方最適宜？
- (A)當歸、白芍、大腹皮、枳殼、白芷、益母草
(B)黃耆、黨參、白朮、陳皮、柴胡、升麻、當歸、甘草
(C)黃耆、當歸、黨參、白芍、川芎、茯苓、枸杞、醋炙龜板
(D)當歸、川芎、白芍、黃耆、艾葉、菟絲子、厚朴、羌活、荊芥穗、枳殼、川貝母、甘草、生薑
- 63 《景岳全書》歸腎丸與小營煎相同的藥物組成，下列何者最正確？①山藥、當歸 ②山茱萸、白芍 ③枸杞子、熟地
- (A)①② (B)①③ (C)②③ (D)①②③
- 64 下列那些是《傳青主女科》固本止崩湯之組成藥物？①人參、炙甘草 ②白朮、熟地 ③黃耆、當歸 ④炮附子、陳皮 ⑤炮薑、升麻
- (A)②③ (B)①③⑤ (C)①②④⑤ (D)①②③④⑤
- 65 依《醫宗金鑑·幼科雜病心法要訣》，盤腸氣痛，治以下列何方最適宜？
- (A)烏藥順氣散 (B)勻氣散 (C)白豆蔻散 (D)藿香正氣散
- 66 小兒水腫，稍有浮腫，或腫不明顯，小便黃赤短小，甚至血尿，舌苔黃或黃膩，質偏紅，脈偏數。治以下列何方最適宜？
- (A)杏仁、連翹、麻黃、赤小豆、生梓白皮、生薑、大棗、炙甘草
(B)黃柏、牛膝、蒼朮、燈心、淡竹葉、木通、生地黃、生甘草梢
(C)木通、滑石、淡竹葉、山梔、藕節、當歸、小蓳、炒蒲黃、炙甘草、生地
(D)滑石、澤瀉、茯苓、阿膠、豬苓
- 67 1 歲患者，咳嗽 1 日，咳有痰聲，鼻塞，流少量清涕，體溫 38.5℃，指紋浮紅。辨證為下列何種證候最適宜？
- (A)風寒 (B)風熱 (C)痰濕 (D)濕熱
- 68 承上題，治以下列何方最適宜？
- (A)金沸草散 (B)桑菊飲 (C)二陳湯 (D)清金化痰湯

- 69 依《醫宗金鑑·幼科雜病心法》，小兒腹痛有四，若「發熱惡寒腹痛兼，惡食嘔吐多啼叫」。則下列診斷何者最適宜？
(A)食痛 (B)蟲痛 (C)寒痛 (D)內食外寒痛
- 70 承上題，治以下列何方最適宜？
(A)治以桂枝加芍藥湯
(B)宜理中湯溫之，若四肢厥冷加附子
(C)先以錢氏安蟲散散之，痛久不愈者，加減理中湯治之
(D)治以藿香和中湯
- 71 6歲幼兒於五月中旬出現倦怠嗜睡，食慾減退、泛噁、熱勢不高，大便不調、小便頻數短赤，苔黃膩、脈濡等症狀，下列診斷何者最適宜？
(A)夏季熱 (B)暑溫 (C)疰夏 (D)陽明經熱
- 72 承上題，治以下列何方最適宜？
(A)醒脾化濕 (B)清暑益氣 (C)清熱通腑 (D)清熱解毒，辛涼透表
- 73 婦人寒冬於家中產子，因護理不當，後見嬰孩膚腫硬發涼、臀腿臂頰紅腫如凍傷，唇色暗紅、面色晦暗。治以下列何方最適宜？
(A)附子、乾薑
(B)附子、乾薑、蔥白
(C)附子、乾薑、蔥九支、炙甘草
(D)當歸、芍藥、細辛、桂枝、木通、吳茱萸、薑、棗
- 74 時痢是痢疾病，可先用「倉廩散」發散，緩解時令之邪氣，方中用下列那些風藥來發散時邪？
(A)荊芥、防風 (B)羌活、獨活 (C)薄荷、連翹 (D)金銀花、連翹
- 75 水痘出現壯熱不退，煩躁不安，口渴欲飲，面紅目赤，伴有牙齦腫痛、口舌生瘡，疹色紫暗，大便乾結，小便黃赤，苔黃糙而乾、質紅或紅絳，脈象洪數，下列辨證何者最適宜？
(A)風熱犯衛 (B)毒熱重證 (C)衛氣同病 (D)陽明經證
- 76 承上題，治以下列何方最適宜？
(A)銀翹散 (B)白虎湯 (C)清胃解毒湯 (D)銀翹白虎湯
- 77 依《醫宗金鑑》，小兒外感寒邪，脈浮發熱，惡風惡寒，頭疼身痛無汗，此表熱也，治以下列何方最適宜？
(A)麻黃湯 (B)十神湯 (C)杏蘇飲 (D)天水散
- 78 承上題，兼內熱者，治以下列何方最適宜？
(A)三一承氣湯 (B)調胃承氣湯 (C)涼膈散 (D)雙解通聖湯
- 79 依《醫宗金鑑·痘疹心法》麻疹見形證治，因熱毒而產生麻疹無法出透稱為熱閉，治以下列何方最適宜？
(A)黃連解毒湯 (B)三黃石膏湯 (C)麻杏石甘湯 (D)柴葛解肌湯
- 80 下列何者為發燒時，免疫系統細胞所分泌的內源性發熱質（endogenous pyrogens）？①白血球介質-1（interleukin-1） ②白血球介質-2（interleukin-2） ③白血球介質-5（interleukin-5） ④白血球介質-6（interleukin-6）
(A)①② (B)③④ (C)①④ (D)②③