

115年第二次專門職業及技術人員高等考試醫師中醫師考試分階段考試(第二階段考試)

代 號：1318

類科名稱：中醫師(二)

科目名稱：中醫臨床醫學(一)(包括傷寒論(學)、溫病學、金匱要略、中醫證治學、中醫診斷學)

考試時間：1小時30分鐘

座號：_____

※注意：本試題禁止使用電子計算器

※本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當答案。

1. 依《傷寒論》，有關抵當湯的脈證敘述，下列何者最不適宜？
 - A. 其人如狂
 - B. 結胸
 - C. 少腹硬滿
 - D. 脈微而沉
2. 依《傷寒論》，下列何者為「生薑瀉心湯」之脈證？
 - A. 傷寒病，心下痞硬而滿，乾嘔，心煩不得安，下痢，日數十行，穀不化，腹中雷鳴者
 - B. 傷寒解後，心下痞硬，乾噎食臭，脇下有水氣，腹中雷鳴，下痢者
 - C. 傷寒解後，心下痞硬，噎氣不除者
 - D. 傷寒病，服湯藥，下痢不止，心下痞硬者
3. 依《傷寒論》太陽與少陽合病，因少陽火鬱之邪內迫陽明，下趨大腸，症見肛門灼熱，瀉下黏穢，腹痛，裏急後重者，治以下列何方最適宜？
 - A. 葛根芩連湯
 - B. 黃芩湯
 - C. 白頭翁湯
 - D. 桃花湯
4. 依《醫宗金鑑·訂正仲景全書傷寒論注》下列有關梔子豉湯的敘述何者錯誤？
 - A. 發汗若下之，而煩熱胸中窒者
 - B. 傷寒下後，心煩腹滿，臥起不安者
 - C. 下痢後更煩，按之心下濡者，為虛煩也
 - D. 發汗吐下後，虛煩不得眠，若劇者，必反覆顛倒，心中懊憹
5. 依《醫宗金鑑·訂正仲景全書傷寒論注》，霍亂，吐已痢斷，汗出已止，脈平和者，食之小煩者，治以下列何法最適宜？
 - A. 解肌發汗以和之

- B.溫中散寒
- C.溫陽以勝陰
- D.節其飲食，自可愈
- 6.依《醫宗金鑑·訂正仲景全書傷寒論注》所述，關於麻黃湯的應用，下列何者錯誤？
- A.太陽病，十日以去，脈但浮者，宜麻黃湯
- B.太陽與陽明合病，喘而胸滿者，宜麻黃湯
- C.太陽病，下之微喘者，表未解故也，宜麻黃湯
- D.傷寒脈浮緊，不發汗，因致衄者，宜麻黃湯
- 7.依《醫宗金鑑·訂正仲景全書傷寒論注》所述，太陽蓄水證的治療，下列何者錯誤？
- A.發汗已，脈浮數，煩渴者，五苓散主之
- B.太陽病，發汗後，大汗出，胃中乾，煩躁不得眠，欲得飲水者，豬苓湯主之
- C.太陽病，發汗後，若脈浮，小便不利，微熱消渴者，五苓散主之
- D.傷寒，汗出不渴者，茯苓甘草湯主之
- 8.依《傷寒論》，有關炙甘草湯之證治，下列敘述何者正確？
- A.組成裡乾薑配桂枝能溫通血脈
- B.可應用於心陰陽兩虛的心悸症
- C.與醋水共煎
- D.組成裡有九味藥先煮
- 9.依《傷寒論》原文所述，下列何者可攻之？
- A.傷寒嘔多，雖有陽明證
- B.陽明病，心下硬滿者
- C.陽明病，面合色赤
- D.陽明病，大下後，煩不解，腹滿痛
- 10.依《傷寒論》所述，趺陽脈浮而澀，浮則胃氣強，澀則小便數，浮澀相搏，大便則硬，其脾為約，麻子仁丸主之。下列何者正確？
- A.麻子仁丸又稱脾約丸
- B.趺陽脈澀代表胃陰不足
- C.麻子仁丸是製成糊丸，使瀉下功效快速
- D.潮熱、譫語、煩躁、腹滿硬痛適合用麻子仁丸治療
- 11.依《傷寒論》，傷寒三日，陽明脈大之涵義，下列敘述何者錯誤？
- A.不兼少陽陽明之弦大

- B.不兼太陽陽明之浮大
- C.陽明為多氣多血，三日是確切之數
- D.此係邪熱入胃，而成內實之診
- 12.依《傷寒論》所述，有關陽明病下後餘熱留擾胸膈證治，下列何者錯誤？
- A.陽明病如屬腑實，下之當癒
- B.陽明病下後邪熱未盡，留擾於胸膈
- C.因鬱熱擾於胸膈，故心中懊憹，飢不能食
- D.邪熱蒸騰於上，但頭汗出，當先用白虎湯以宣胸膈鬱熱
- 13.依《醫宗金鑑·訂正仲景全書傷寒論注·厥陰篇》：手足厥寒，脈細欲絕者，下列何方主之？
- A.麻黃升麻湯
- B.當歸四逆湯
- C.通脈四逆湯
- D.四逆湯
- 14.依《醫宗金鑑·訂正仲景全書傷寒論注·辨厥陰病脈證並治》，下列敘述何者錯誤？
- A.傷寒，脈促，手足厥逆，可灸之
- B.諸四逆厥者，不可下之，虛家亦然
- C.下痢，有微熱而渴，脈弱者，死
- D.傷寒，發熱，下痢，厥逆，躁不得臥者，死
- 15.依《傷寒論》所述，太陰病與陽明病互相轉化之關係，下列何者錯誤？
- A.同屬中土
- B.同為裏證
- C.同為燥證
- D.燥濕可以互化，寒熱可以演變，虛實可以轉換
- 16.依《傷寒論》所述，有關白頭翁湯證之敘述，下列何者錯誤？
- A.可治厥陰熱痢
- B.下痢便膿血
- C.渴喜熱飲
- D.裏急後重
- 17.依《金匱要略·肺痿肺癰咳嗽上氣病脈證治第七》，肺脹證治的敘述，下列何者最不適當？
- A.其人咳喘，目如脫狀，脈浮大者，越婢加半夏湯主之
- B.煩躁而喘，脈浮者，心下有水，小青龍加石膏湯主之

- C.肺脹，喘不得臥，葶藶大棗瀉肺湯主之
- D.上氣喘而躁者屬肺脹，欲作風水，發汗則癒
- 18.依《金匱要略·腹滿寒疝宿食病脈證治第十》，腹滿，發熱十日，脈浮而數，飲食如故，下列何方主之最適宜？
- A.厚朴三物湯
- B.厚朴七物湯
- C.大柴胡湯
- D.大建中湯
- 19.依《醫宗金鑑·訂正仲景全書金匱要略注》，腎著之病，治以下列何方？
- A.乾薑苓朮湯
- B.小半夏加茯苓湯
- C.理中湯
- D.真武湯
- 20.依《金匱要略·中風歷節病脈證并治第五》，桂枝芍藥知母湯治歷節病，其組成除了「桂枝、芍藥、知母」之外，還包括下列那些藥物？①人參、細辛、乾薑 ②黃耆、當歸、川烏 ③防風、麻黃、附子 ④白朮、生薑、甘草
- A.①③
- B.②④
- C.①②
- D.③④
- 21.依《金匱要略》所述：「胸痹心中痞，留氣結在胸，胸滿，脅下逆搶心」，治以下列何方最適當？
- A.枳薤薤白白酒湯
- B.枳薤薤白半夏湯
- C.枳實薤白桂枝湯
- D.桂枝生薑枳實湯
- 22.依《金匱要略·臟腑經絡先後病脈證》之敘述，下列何者錯誤？
- A.病痼疾，加以卒病，當先治其卒病，後乃治其痼疾
- B.表裏同病，下痢清穀不止，身體疼痛者，急當救裏
- C.見肝之病，知肝傳脾，當先實脾，四季脾王不受邪，即勿補之。此為肝虛證治法
- D.病在臟，欲攻之，當隨其所得而攻之。強調治病當審因論治
- 23.依《金匱要略·驚悸吐衄下血胸滿瘀血》，下列敘述何者正確？
- A.吐血不止者，膠艾湯主之

- B.心氣不足，吐血、衄血，瀉心湯主之
- C.下血，先便後血，此遠血也，赤小豆當歸散主之
- D.下血，先血後便，此近血也，黃土湯主之
- 24.依《金匱要略·消渴小便利淋病脈證治》，症見小便不利，病機屬下焦陽虛、上焦燥熱者，治以下列何方最適宜？
- A.豬苓湯
- B.蒲灰散
- C.五苓散
- D.栝蒌瞿麥丸
- 25.依《金匱要略》所述，病患症見四肢腫，水氣在皮膚中，四肢聶聶動，治以下列何方最適宜？
- A.麻黃、附子、甘草
- B.防己、茯苓、黃耆、桂枝、甘草
- C.麻黃、石膏、生薑、大棗、甘草
- D.桂枝、黃耆、芍藥、生薑、大棗、甘草
- 26.依《醫宗金鑑·訂正仲景全書金匱要略注》，有關支飲之敘述，下列何者錯誤？
- A.心下有支飲，其人苦冒眩，豬苓湯主之
- B.支飲胸滿者，厚朴大黃湯主之
- C.支飲不得息，葶藶大棗瀉肺湯主之
- D.嘔家本渴，渴者為欲解，今反不渴，心下有支飲故也，小半夏湯主之
- 27.蔡女士最近常頻頻乾嘔，食慾不振，而且常吐出涎沫，治以下列何方最適當？
- A.半夏乾薑散
- B.小青龍湯
- C.理中湯
- D.小柴胡湯
- 28.有關《金匱要略》瘡癰腸癰浸淫病中方劑的敘述，下列選項何者最正確？①大黃牡丹皮湯為頓服之，有膿當下；如無膿，當下血 ②王不留行散之使用為小瘡可外敷，大瘡可內服之，惟產後禁服 ③排膿散方使用時，取雞子黃一枚，揉和令相得，飲和服之 ④黃連粉性苦寒，具有清熱燥濕解毒之功
- A.①②③
- B.①②④
- C.①③④
- D.②③④

- 29.某日小廖負責重症加護病房照護，發現一高熱患者，診察時發現，患者舌卷而兼見囊縮，此時應該作何思考，較為適宜？
- A.內風擾動，痰濁內阻
 - B.氣液不足，絡脈失養
 - C.病入厥陰，危險徵象
 - D.肝風發瘧之候
- 30.溫病很重視發熱型態，以利病情的判斷，下列敘述何者適宜？
- A.發熱夜甚，為餘邪留伏陰分
 - B.但熱不寒為熱鬱少陽
 - C.持續低熱，身熱面赤，手足心熱為肝腎陰虛
 - D.發熱惡寒為熱邪傳入營、血分
- 31.下列何者的症狀，最適合以溫病治法中的「辛寒清氣法」治之？
- A.身熱不退，口渴，口苦，煩躁不安，小便黃赤，舌診見舌紅苔黃
 - B.壯熱，汗出，心煩，口渴，舌診見舌紅苔黃燥
 - C.身熱，微渴，心中懊憹不舒，舌診見舌紅苔薄黃
 - D.身熱不退，口乾唇裂，大便秘結，舌診見舌紅苔乾燥
- 32.針對溫病治療，下列何治療方法可能具有抗感染、抗炎、抗毒、鎮靜以及增強毛細血管抵抗力、促進血液凝固、調整血管舒張功能等作用？
- A.通下法
 - B.清營法
 - C.開竅法
 - D.化濕法
- 33.下列何者為溫病理論建立完整體系的奠基者？
- A.薛生白
 - B.王孟英
 - C.吳又可
 - D.葉天士
- 34.「三焦」部位概念首見於下列何書？
- A.《溫熱論》
 - B.《溫疫論》
 - C.《傷寒論》

D.《內經》

35.陳先生年假出遊後出現身熱，咳嗽，口渴，腹瀉色黃味臭，肛門灼熱，腹不硬痛，舌紅苔黃，脈數，治療以下列何方藥最適合？

A.連翹，銀花，桔梗，薄荷，竹葉，甘草，荊芥穗，牛蒡子，淡豆豉，玄參

B.黃連，枯蘘，枳實，半夏

C.葛根，黃芩，黃連，甘草

D.生石膏，生大黃，杏仁，枯蘘皮

36.關於風溫病之敘述，下列何者最正確？①致病多在春夏季感受風熱病邪 ②本病初起以邪在肺胃為病變中心 ③葉天士所說「溫邪上受，首先犯肺，逆傳心包」即指風溫病肺衛之邪不解 ④病變過程易化燥傷陰，後期多肺胃陰傷之證，亦有少數肝腎陰傷證候

A.①②

B.③④

C.②③

D.②④

37.風溫證，身熱不已、煩躁不安、胸膈灼熱如焚、唇焦咽燥、口渴、便秘、舌心乾、四邊色紅，苔或黃或白，脈浮滑而數，下列敘述何者正確？

A.本證為痰熱阻肺

B.治宜宣肺化痰、泄熱攻下

C.本證病因是痰熱，病位在胸膈

D.宜用大黃、芒硝、甘草、山梔子、薄荷、黃芩、連翹、淡竹葉治療

38.《溫病條辨》之導赤承氣湯中用於清泄小腸火熱的藥物為何？

A.生地、赤芍

B.大黃、芒硝

C.黃連、黃柏

D.木通、竹葉

39.春溫病出現灼熱躁擾，甚或昏狂譫妄，斑疹紫黑，或吐血衄血，便血，舌質深絳，下列何者為最正確之病機？

A.熱入血分，熱與血結

B.熱毒熾盛，氣血兩燔

C.熱入血分，熱盛動血

D.熱入心包，毒熱灼陰

40.關於吳又可《溫疫論》對於溫疫病「急證急攻」，下列敘述何者錯誤？

- A.急證是指感受邪毒極盛，盤踞膜原，邪毒內潰，迅速傳入胃腑，出現種種急重證候
- B.邪在膜原，發熱已一二日，苔白如積粉，晨投達原飲一劑，至午前伏邪即潰
- C.傳入胃腸，證見胸膈滿痛，大渴煩躁，舌苔變黃等，即用白虎湯加大黃瀉之，則熱隨瀉減
- D.邪熱未盡，瘀積到胃，熱毒復熾，至午後則煩躁、發熱加重，鼻如煙煤，舌苔乾黑起芒刺，故急投大承氣湯
- 41.濕溫病中，證屬三焦升降失司，濕阻中焦氣機不暢，常以加減正氣散為主方治療，下列敘述何者正確？
- A.脘悶便溏，身痛苔白，脈象模糊的，宜一加減正氣散
- B.苔黃脘悶的，宜二加減正氣散
- C.脘腹脹滿大便不爽的，宜三加減正氣散
- D.苔白滑而脈緩的，宜四加減正氣散
- 42.下列何者非「伏暑」之診斷要點？
- A.好發於長夏
- B.起病急，病勢既重且纏綿
- C.發熱入夜尤盛，天明得汗稍減
- D.大便多溏而不爽
- 43.有一患者罹患伏暑，症見胸腹灼熱，嘔噦，大便溏而不爽，大便色黃赤如醬，苔黃垢膩，脈濡數，下列診治用藥之敘述何者錯誤？
- A.可用枳實導滯湯導滯通下，清熱化濕
- B.此乃暑濕病邪鬱蒸氣分，阻於腸道
- C.宜用三承氣湯苦寒瀉下直到邪盡，不可再下
- D.治宜「輕法頻下」直到邪盡
- 44.關於「爛喉痧」的病因病理，下列敘述何者正確？
- A.本病係人的正氣仍盛，適逢感觸溫熱時毒，正邪相搏而發病
- B.溫熱時毒自皮毛腠理而入，肺衛首先受病，故發肌膚丹痧
- C.感邪嚴重者，邪毒可內陷營血，出現氣血兩燔的重證
- D.本病症見爛喉與發痧，臨床預後良好
- 45.辨證論治為中醫普遍應用的診斷規律，下列何者屬於「證」？
- A.肝腎陰虛
- B.寒熱往來
- C.脈浮緊

D.肝不藏血

46.關於脈診的敘述，下列何者最不適宜？

A.三部九候診法，首見於《內經·素問》

B.三部診法，首見於《傷寒論》

C.寸口診法，始於《內經》

D.《診家樞要》持脈之要有三，曰：寸、關、尺

47.關於耳部之望診，下列敘述何者最不適宜？

A.耳部望診的重點包括耳色變化及外形變化

B.耳色白多屬寒，耳色青黑多屬痛

C.耳腫起多屬邪實，耳瘦削多屬正虛

D.久病血瘀多見耳輪青筋，下消證多見耳輪乾屑

48.關於目形主病的敘述，下列何者最不適宜？

A.眼突合併有頸部腫大，多為癭腫

B.昏睡露睛，多是脾胃虛極

C.瞳人散大，視物不清，多是肝血不足

D.眼瞼腫者，腫勢急而色紅，多是脾熱

49.中醫內科主任帶領實習醫學生進行「舌診」討論時，提到關於「舌下絡脈青紫粗張」的常見病機，下列何者最不適宜？

A.痰熱內阻

B.陰虛血燥

C.寒凝血瘀

D.臨床意義與青紫舌相似

50.課堂上老師帶領學生進行「望舌苔」討論時，四位同學分別提出不同重點，下列敘述何者正確？①

觀察舌苔剝落，可測胃氣、心陰之存亡 ②苔的消長，反映邪正相爭過程，可判斷疾病的進退預後

③膩苔為陽熱有餘，腐苔為陽氣被遏 ④舌苔偏於左右一側，為邪在半表半裡

A.①②

B.②③

C.①④

D.②④

51.一位40歲患者，患有頭痛已經10年，疼痛部位在兩側太陽穴附近，時痛時止，發作不定時。下列敘述何者最適宜？

A.太陽經頭痛

B.少陽經頭痛

C.陽明經頭痛

D.少陰經頭痛

52.有一患者善食易飢，兼見大便溏瀉，下列何者是此患者最可能之證型？

A.中氣已憊，胃氣已傷

B.脾胃氣滯

C.胃強脾弱

D.脾陰傷

53.小張在值班時，住院患者突感不適，此時趕緊過去診察，察覺脈搏時發現，脈在筋肉上，乍疏乍密，散亂無序，下列脈象何者最適宜？

A.彈石

B.蝦游

C.解索

D.麻促

54.下列脈象何者非僅主虛證？

A.微脈

B.散脈

C.細脈

D.伏脈

55.有關「格陽」病機之敘述，下列何者最適宜？

A.真熱假寒

B.上寒下熱

C.真寒假熱

D.上熱下寒

56.有關內經「諸暴強直，皆屬於風」之論述，下列何者最不適宜？

A.屬外風

B.病在經絡

C.多因陰液虧耗，陽升無制

D.破傷風是其典型表現

57.關於六經病證中心煩的表現，下列何者最適宜？①少陽證心煩成因是木火上逆 ②陽明經證心煩同時會有面赤身熱 ③少陰證心煩可因陽氣衰微

A. 僅①②

B. 僅②③

C. 僅①③

D. ①②③

58. 有關「風溫」在氣分時期出現的證候，下列何者最不適宜？

A. 氣分大熱

B. 肺胃熱盛

C. 濕熱留戀三焦

D. 熱結腸胃

59. 關於「燥邪犯肺」初起與「肺陰虛」的症狀比較，下列何者最適宜？ ①均可見惡寒發熱 ②均可見身體消瘦 ③均可見咯血 ④均可見數脈

A. ①②

B. ③④

C. ①③

D. ②④

60. 張先生，30歲，外送員，今天中午外送途中突然覺得左腰劇痛，因工作中就先忍著，但到了下午疼痛越來越嚴重，且疼痛感延伸到同側少腹，並有發熱、尿急，小便黃赤短少，灼熱刺痛，大便平，舌紅，苔黃厚膩，脈數，診斷為下列何證型最為合適？

A. 濕熱蘊脾

B. 肝經濕熱

C. 大腸濕熱

D. 膀胱濕熱

61. 因腎精不足導致眩暈，下列何者為臨床最常見的症狀？

A. 煩躁易怒，少寐多夢

B. 神疲懶言，飲食減少

C. 胸悶噁心，食少多寐

D. 多夢健忘，腰膝痠軟

62. 有關陽黃、陰黃之敘述，下列何者最正確？

A. 陽黃為陽盛熱重，濕從寒化發黃

B. 陰黃之人，陰盛濕重，瘀血阻滯發黃

C. 砂石、蟲體阻滯膽道，膽汁外溢而發黃，屬陽黃範圍

- D.陽黃之治療，熱重於濕者，治法為利濕化濁，溫脾和胃
- 63.李先生腹大脹滿不舒，甚則青筋暴露，口燥，舌紅絳少津，下列病機何者最適當？
- A.熱傷血絡，肝腎陰虛
 - B.水停血瘀，脾腎陽虛
 - C.水蓄不行，脾陽不振
 - D.邪熱內盛，濕阻氣機
- 64.67歲男性，中風住院恢復中，目前右側肢體痿軟無力，口角流涎，面色萎黃，言語謇澀，舌質淡紫有瘀斑，苔白，脈細，試問下列治法何者最為適當？
- A.活血祛風、通經活絡
 - B.育陰潛陽、鎮肝熄風
 - C.益氣活血、化瘀通絡
 - D.滋補肝腎、壯筋起痿
- 65.心悸中，有關「心陽不足」和「心氣不足」之證型，下列敘述何者錯誤？
- A.兩者均有形寒肢冷的症狀
 - B.心氣不足症見自汗懶言、頭昏頭暈
 - C.心陽不足症見面色蒼白、胸悶氣短
 - D.心陽不足脈沉細無力
- 66.42歲陳先生失眠2年多，每夜僅能入睡一個多小時，幾天不能入睡，症見胸滿、口苦、頭暈頭脹、全身乏力困重，性情急躁易怒，舌紅苔黃，脈弦數，下列處方何者最適當？
- A.歸脾湯
 - B.龍膽瀉肝湯
 - C.酸棗仁湯
 - D.保和丸
- 67.有關「癲狂」的轉歸及預後，下列敘述何者錯誤？
- A.癲證多因痰氣互結而成，若痰濁壅盛，鬱久化熱，則可轉化為狂證
 - B.氣血凝滯者多見癲證，如病久氣虛而血瘀者，則可轉為狂證
 - C.癲證屬痰氣鬱結而病程較短者，投以疏肝解鬱、化痰開竅之法每獲癒。若延誤治療，遷延日久，或癒後多次復發，則病情往往轉重，可轉變為氣虛痰結證，或氣血兩虛證
 - D.狂證驟起先見痰火擾心之證，急投瀉火逐痰之法，病情多可迅速緩解；如治不得法或不及時，致使真陰耗傷，則心神昏亂日重，其證轉化為陰虛火旺
- 68.風陽痰濁，蒙閉心竅，流竄經絡，是「癰證」發作的基本病理因素，下列有關「癰證」的辨證，何者最不常見？

- A.肝風痰濁
- B.肝腎陰虛
- C.脾胃虛弱
- D.寒飲伏肺

69.吐血纏綿不止，時輕時重，血色暗淡，神疲乏力，心悸氣短少寐，面色蒼白。舌質淡，脈細弱。治以下列何方最適當？

- A.附子理中湯
- B.溫脾湯
- C.歸脾湯
- D.生脈散

70.下痢赤白膿血，或下鮮血黏稠。臍腹灼熱疼痛，虛坐努責，食少，心煩口乾，舌質紅絳，苔光剝乏津，脈細數。治以下列何方最適當？

- A.白頭翁湯
- B.駐車丸
- C.桃花湯
- D.連理湯

71.關於咳血的中醫典籍論述，明確指出：「咳血即嗽血」，並將咳血分為「外感嗽血」及「內傷嗽血」兩類者為下列何本著作？

- A.《聖濟總錄·吐血門》
- B.《症因脈治·嗽血門》
- C.《血證論·咳血論治》
- D.《證治要訣·嗽血》

72.《金匱要略·痰飲咳嗽病脈證並治》關於四飲敘述，下列何者錯誤？

- A.其人素盛今瘦，水走腸間，瀝瀝有聲，謂之留飲
- B.飲後水流在脅下，咳唾引痛，謂之懸飲
- C.飲水流行，歸於四肢，當汗出而不汗出，身體疼重，謂之溢飲
- D.咳逆倚息，短氣不得臥，其形如腫，謂之支飲

73.60歲男性，10年前被西醫診斷為攝護腺肥大，曾接受傳統內視鏡電刀刮除手術，最近半年出現小便點滴而下，尿如細線，甚則阻塞不通，小腹脹滿疼痛，舌紫暗，瘀點，脈細澀，治以下列何方最適當？

- A.《三因極一病證方論》沉香散：沉香、石葦、滑石、當歸、王不留行、白芍、冬葵子、陳皮、炙甘草

B.《證治準繩》代抵當丸：大黃、芒硝、桃仁、當歸、生地、穿山甲、肉桂

C.《傷寒雜病論》桂枝茯苓丸：桂枝、茯苓、牡丹皮、白芍、桃仁

D.《醫林改錯》膈下逐瘀湯：五靈脂、當歸、川芎、桃仁、牡丹皮、赤芍、烏藥、延胡索、甘草、香附、紅花、枳殼

74.關格屬於危重病症，下列何者正確？

A.嘔吐不止名曰關；小便不通名曰格，大多由於脾陽虧虛，腎陽衰微，陽不化水，水濁逗留，濁邪壅塞三焦，氣化功能不得升降所致

B.關格病的前期階段以濁邪壅塞三焦為主，病患表現出食慾不佳，白天尿量減少，神疲乏力，腰背痠痛，舌質淡胖，邊有齒痕，俗稱玉石舌

C.關格病以濁邪侵犯中焦最為常見，若面黃、乏力、身重、水腫、神疲而兼有噁心嘔吐者為濁邪困脾，陽不化濁；若噁心頻作，嘔吐不止，舌苔厚膩而兼有面黃、乏力、納呆者為濁邪犯胃，濕困陽損

D.反覆水腫或是淋證遷延日久而發展到關格病者，多以脾腎陽虛為主，很少兼有腎陰虛症狀

75.有關耳鳴、耳聾的敘述，下列選項何者錯誤？①久聾是指逐漸地出現聽覺減退，或由耳鳴轉化而來，多屬虛證 ②無力倦怠，面色晄白耳鳴者屬氣虛；皮膚甲錯，唇白耳鳴者屬血瘀 ③《醫述·耳》提及「虛聾由漸而成，必有兼證可辨，如面頰黧黑者精脫；少氣喘乾者肺虛；目瞋善恐者肝虛；心神恍惚驚悸煩躁者心虛；四肢懶倦眩暈少食者脾虛。」 ④75歲男性，主訴耳鳴耳聾多年，伴見眩暈，腰膝痠軟，顴赤口乾，手足心熱，遺精，脈細弱，治以益氣升清，處方為《東垣》益氣聰明湯

A.①②

B.①③

C.②④

D.③④

76.有關《三因方·癭瘤證治》對癭病分類的敘述，下列選項何者正確？①堅硬不可移者，名曰石癭 ②皮包不變，即名肉癭 ③筋脈露結者，名血癭 ④赤脈交絡者，名筋癭 ⑤隨憂愁消長者，名氣癭

A.①②③

B.①②⑤

C.②④⑤

D.③④⑤

77.35歲男性病患因不慎感受風寒，之後引發全身水腫，肢節痠痛、略咳喘、二便量減、惡風發熱、脈沉滑。下列治則何者最適當？

A.溫化合利尿

B.發汗合健脾

C.利尿合發汗

D.理氣合逐水

78.《金匱要略·水氣病脈證並治》提到五種臨床可見之水證，下列相關敘述何者錯誤？

A.分別是風水、皮水、正水、石水、黃汗五類

B.石水其脈沉遲，外證自喘

C.黃汗其脈沉遲，身發熱，胸滿，四肢頭面腫，久不愈，必致癰膿

D.風水其脈自浮，外證骨節疼痛，惡風

79.痹證失治或誤治的常見原因，下列敘述何者錯誤？

A.病邪尚在肌表不能及時驅邪外出

B.濕邪盤踞體內成為邪氣入侵的內應

C.初起使用汗法

D.長期使用祛風燥濕散寒之藥

80.李東垣治療頭痛之用藥，以蒼朮、半夏、南星為主的是六經中那一經之頭痛？

A.太陽頭痛

B.陽明頭痛

C.少陰頭痛

D.太陰頭痛