

115年第二次專門職業及技術人員高等考試醫師中醫師考試分階段考試(第二階段考試)

代 號：3318

類科名稱：中醫師(二)

科目名稱：中醫臨床醫學(三)(包括中醫外科學、中醫傷科學、中醫五官科學)

考試時間：1小時30分鐘

座號：_____

※注意：本試題禁止使用電子計算器

※本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當答案。

1. 黃耆為瘡家之聖藥，下列何種情況最不適合使用黃耆治療？

- A. 背疽腐化，膿毒不暢惡肉不脫者
- B. 瘡瘍久敗，膿水淋漓之表虛之病
- C. 老人及形體欠實者罹患瘡瘍之病
- D. 瘡瘍之病伴隨上熱甚或胃納衰者

2. 《靈樞·癰疽》提到「發於尻……其狀赤堅大，急治之，不治之，三十日死矣。」此病相當於肛門直腸周圍膿腫，此病病名為何？

- A. 敦疽
- B. 銳疽
- C. 緩疽
- D. 調疽

3. 臀癰應與有頭疽及流注相鑑別，根據《中醫外科講義》，下列敘述何者正確？①臀癰為生於臀部肌肉豐厚處的急性化膿性疾病 ②有頭疽為發於肌膚之間的慢性化膿性疾病 ③臀癰初起紅腫熱痛，邊緣明顯，潰後流出膿血，伴腐肉脫落 ④有頭疽初起有粟粒膿頭，癢痛並作，腐爛時形如蜂窩 ⑤流注漫腫疼痛，不限於臀部一處，此處未癒，他處又起

- A. ①②③
- B. ①④⑤
- C. ③④⑤
- D. ①②④

4. 關於疔瘡位置與其所歸屬經絡，下列敘述何者錯誤？

- A. 反唇疔生於唇稜偏裏，上唇屬脾，下唇屬胃
- B. 鎖口疔為心脾兩經所屬
- C. 手丫疔歸屬大腸經
- D. 托盤疔歸屬手厥陰、手少陰

5. 根據《中醫外科講義》，下列關於風寒濕合而為病的敘述，何者錯誤？

- A.其病在筋骨者，可兼用針灸治療，則見效更速
- B.表現為筋骨麻痺不仁，或痛楚難受
- C.治應祛風和絡，活血通經，虛者兼補。可內服萬應膏加減
- D.可因三氣所受之輕重不同，是以見證亦各異
- 6.根據《中醫外科講義》，下列何者不是鵝掌風的起因？
- A.脾胃火熱
- B.楊梅餘毒未盡
- C.血燥復受風毒
- D.肝腎陰虧
- 7.下列那一種皮膚病的病因與真菌感染有關？
- A.桃花癬
- B.胎癬
- C.禿瘡
- D.蜘蛛瘡
- 8.45歲女性，皮損覆蓋有多層銀白色鱗屑，抓去鱗屑可見點狀出血，依《中醫外科講義》最可能的診斷為何？
- A.白屑風
- B.白疔
- C.癬瘡
- D.白駁風
- 9.有關風疹的病因，下列何者錯誤？
- A.汗出受風，風邪中表虛之人
- B.飲食不潔，毒邪內侵
- C.外感濕熱，滯於脾胃
- D.露臥乘涼，風邪中表虛之人
- 10.依《中醫外科講義》，治療白濁，若濕熱內蘊，使用下列那一藥方最適宜？
- A.八正散
- B.徙薪飲
- C.防風通聖散
- D.補中益氣湯
- 11.依據《中醫外科講義》，下列何者不是通乳導散法常用的中藥？

- A.貝母
- B.漏蘆
- C.木耳
- D.栝蒌

12.乳癰與漿細胞性乳腺炎之敘述，下列何者錯誤？

- A.漿細胞性乳腺炎通常發生於哺乳期婦女，與餵哺母乳方式不當有關
- B.漿細胞性乳腺炎腫塊發生於乳暈部，並大多伴有先天性乳頭凹陷內縮
- C.外吹乳癰腫脹疼痛部位在乳房部，並有結塊，乳汁分泌不暢
- D.即使經治療消退，漿細胞性乳腺炎仍可以復發或者經久不癒形成瘻管

13.根據《中醫外科講義》，下列中醫常見病因之敘述，何者正確？

- A.風為百病之長，且有定體
- B.四彎風、癩風屬風與燥結合為病
- C.白屑風屬風與濕結合為病
- D.痛風、鶴膝風屬風、寒、濕三氣合而為病

14.李先生，38歲，為某半導體公司工程師，工作常熬夜加班，精神壓力大，下班後常跟同事一起吃燒烤喝啤酒，近二個月來容易便秘，口乾舌燥，同時眉間與兩側鼻翼皮膚開始出現紅疹，脫屑，出油，下列何者是最合適的中醫診斷病名？

- A.油風
- B.黃水瘡
- C.面遊風
- D.肥瘡

15.30歲男性，半年來全身皮膚病灶皆生，初形如粟米，搔癢無度，抓破後脂水浸淫成片，血痕累累，依《中醫外科講義》最可能的診斷為何？

- A.癬瘡
- B.火赤瘡
- C.血風瘡
- D.膿窠瘡

16.關於濕瘡的敘述，下列何者錯誤？

- A.生於下身之皮膚疾病，癢而搔之流水
- B.亦名腳氣瘡
- C.治宜利濕為主，如犀角散

D.腫脹甚者可用五皮飲

17.依《中醫外科講義》，舌疳初起最主要症狀為何？

A.牙齦腫脹

B.舌強言蹇

C.喉嚨痛

D.唇部紅腫

18.依《中醫外科講義》，下列癭症何者屬於惡性癌症？

A.肉癭

B.石癭

C.氣癭

D.血癭

19.下列何者不是乳癌患者中醫常用治療之內服處方？

A.季芝鯽魚膏

B.散腫潰堅湯

C.神效枯萸散

D.清肝解鬱湯

20.依《中醫外科講義》梅瘡潰爛時，穢膿浸淫，成片而痛者，使用下列何種藥物最適宜？

A.防風通聖散

B.鵝黃散

C.楊梅一劑飲

D.麻黃一劑飲

21.關於傷後耳目失聰，下列敘述何者最適當？

A.《靈樞·脈度》：「腎氣通於目，腎和則目能辨五色矣」，表明了腎與視力關係密切

B.肝腎虧損之耳目失聰，多在損傷初期發生

C.損傷後，若見眼周青紫瘀血，目睛脹痛，頭額劇痛，視力衰退甚至失明，應轉專科診治

D.若見目睛淡白、眼花耳鳴、心悸怔忡、少氣懶言、四末少溫等證，杞菊地黃丸是合適之處方

22.患者胸脅部受到撞擊，來診時患處腫痛、青紫，壓痛位置清楚固定，患者感覺胸悶，咳嗽疼痛加劇，診其脈弦中帶澀。下列何處方最適當？

A.血府逐瘀湯

B.二陳湯

C.四君子湯

D.小柴胡湯

23.依《醫宗金鑑·正骨心法要旨》，傷損煩躁之證，煩躁而面赤，口乾作渴，脈洪大，按之如無者，治以下列何方最適宜？

A.當歸補血湯

B.獨參湯

C.加味歸脾湯

D.柴胡四物湯

24.患者如果在屈肘狀態下跌倒，肘尖著地受傷，下列何者為最不可能出現的臨床表現？

A.尺骨鷹嘴骨折

B.尺骨鷹嘴推移至肱骨前方

C.肘關節後脫位

D.肱骨下端插入尺骨橈骨間

25.中年患者，長期低頭工作，頸肩痠痛，偶覺一側肩臂作麻，勞累時加重，此患者頸椎X光片之表現，下列何者最少見？

A.骨質增生

B.椎間隙狹窄

C.椎間盤突出

D.椎間孔變小

26.依《諸病源候論·腰背病諸候》所述，凡腰痛病有五，下列敘述何者錯誤？

A.少陰，少陰腎也，十月萬物陰氣傷，是以腰痛

B.風痺，風寒著腰，是以痛

C.腎虛，役用傷腎，是以痛

D.腎腰，墜墮傷腰，是以痛

27.臨床急性腰部疼痛，下列何種損傷最少見？

A.腰部肌筋膜損傷

B.腰部韌帶損傷

C.腰椎間盤突出

D.腰椎骨關節炎

28.50歲男性，平日工作須負重，勞累時腰部有輕微痠痛，近日腰部疼痛加劇，行走時腰部疼痛、無力，雙下肢疼痛、麻木、無力，持續行走則症狀加劇，甚至無法行走，蹲下休息後症狀即緩解，最可能之原因為何？

A.僵直性脊椎炎

B. 腰椎椎管狹窄症

C. 腎痹

D. 梨狀肌症候群

29. 45歲男性，跌傷當日前來看診，腹、背疼痛，下肢瘀青，腫脹發熱。下列處方何者最適宜？①獨活寄生湯 ②膈下逐瘀湯 ③疏經活血湯 ④清營湯 ⑤補中益氣湯

A. ①③

B. ①④

C. ②④

D. ③⑤

30. 28歲男性建築工人急性腰痛，診斷為椎間盤突出，下列敘述何者錯誤？

A. 疼痛多伴隨腰痛及大腿後側、小腿外側痛，先腰痛而腿痛者多

B. 臨床根據髓核突出形式分類，以前突出、單側型為多

C. 多數患者有膝、跟腱反射異常

D. 發生脊椎側彎機率高

31. 有關脛骨結節骨骺炎之敘述，下列那些正確？①又稱為脛骨粗隆骨骺炎 ②好發於5~9歲的兒童 ③好發於11~18歲的族群 ④因髕韌帶牽拉脛骨結節骨骺導致 ⑤通常因為脛前肌收縮過度拉扯到脛骨結節引起


A. ①②⑤

B. 僅①③④

C. ①③④⑤

D. ②④

32. 如圖所示，測試者沿黑色箭頭給與大拇指指間關節一阻力，被測試者將大拇指從0度出力到70度，下列敘述何者最適宜？①測試大拇指的伸直（extension）肌力 ②主要為橈神經與尺神經支配 ③月狀骨脫位壓迫正中神經可能造成此動作無力 ④尺神經壓迫則此動作無力 ⑤頸椎第8神經根受壓迫則此動作無力



A. ①②③④

B. ①②⑤

C. ③⑤

D. 僅③

33. 有關下肢損傷與其檢查的敘述，下列何者正確？
 ①髖關節以前脫位最多見，患肢外形增長，呈外展外旋及輕度屈曲畸形
 ②測量腿長由肚臍測量到踝部內踝，若距離不等即表示真正腿長不等
 ③Thomas test為檢測髖部屈曲性攣縮之測試
 ④股骨頸過度前傾會造成腳尖向內的步態

A. ①②

B. ②③

C. ③④

D. ①④

34. 胸骨骨折最常發生在下列何處？

A. 劍突

B. 胸骨柄

C. 胸骨體部

D. 胸骨基底

35. 有關股骨轉子間骨折的敘述，下列何者最不適當？

A. 股骨轉子間骨折之定義為，股骨頸基部到小轉子水平以上之部位發生骨折，即稱之

B. 股骨轉子間的不完全或嵌插骨折，通常不需要復位，也不需要固定，僅需牽引即可

C. 股骨轉子間骨折，常因跌倒導致患處遭受過度外旋、內旋或內翻的傳導暴力造成

D.股骨轉子的血液循環豐富，極少會出現不癒合的狀況，但容易發生髌外翻

36.下列何者不是神經牽張的檢查法？

A.直腿抬高測驗（SLRT）

B.Hoover測驗

C.Kernig測驗

D.Beevor測驗

37.臀上皮神經炎最常見的壓痛點，與下列穴位何者最接近？

A.章門

B.急脈

C.居膠

D.承扶

38.有關類風濕性關節炎（rheumatoid arthritis）的敘述，下列何者正確？①流行病學發生率是女性多於男性 ②常見的表現是同時多處關節炎 ③約50%的患者類風濕因子（rheumatoid factor）呈陽性反應 ④證見關節腫大且紅腫熱痛甚及因風濕流注筋脈化熱傷陰，可用桂枝芍藥知母湯 ⑤如寒濕凝著關節且無熱象，可用烏頭湯治之

A.①②③

B.③④⑤

C.僅④⑤

D.①②④⑤

39.下列有關骨質疏鬆症的敘述，何者正確？①原發性可分為老年性骨質疏鬆症與更年期骨質疏鬆症等 ②骨密度T值（T-score）小於或等於-1.5即可診斷為骨質疏鬆症 ③骨質疏鬆症建議補充足量維生素D與鈣質 ④骨質疏鬆症常見的骨折部位為前臂、手腕、髖部與脊椎

A.①②③

B.①②④

C.①③④

D.②③④

40.下列何種理學檢查並非用於測試前十字韌帶損傷？

A.anterior drawer test

B.Lachman test

C.Pivot shift test

D.Clarke's test

41.關於跖趾外翻之敘述，下列何者最不適宜？

- A.可能原因為長期站立、經常穿緊小的尖頭鞋
- B.可能產生內側蹠趾關節（metatarsophalangeal joints）滑囊炎
- C.此畸形又稱為Pes Cavus
- D.可能造成全身骨骼和關節歪斜，如O型腿、膝蓋痛等症狀
- 42.關於臀中肌之敘述，下列何者錯誤？
- A.臀中肌無力，可出現特倫德倫堡步態（Trendelenburg gait）
- B.臀中肌止點在股骨大轉子外側面
- C.臀中肌由臀上神經支配
- D.志室穴直刺一寸五分即可觸及臀中肌
- 43.下列關於鎖骨關節脫位之敘述，何者最不適宜？
- A.胸鎖關節脫位臨床較少見，按鎖骨內端脫出方向，分為前脫位和後脫位，前脫位較後脫位為多
- B.肩鎖關節的穩定依賴肩鎖和喙鎖兩韌帶維繫，肩鎖韌帶尤為重要，破裂能引起全脫位
- C.勞動和運動中，經常性地使鎖骨外展，可能造成慢性勞損病因的胸鎖關節脫位
- D.肩鎖關節半脫位，觸診時肩峰與鎖骨不在同一平面；若全脫位則鎖骨外端明顯隆起，肩峰低陷
- 44.有關腳踝扭傷造成的傷害，下列敘述何者正確？
- A.若踝部在強力外翻（eversion）姿勢下扭傷，可能會波及足部造成第五蹠骨撕脫性骨折
- B.扭傷時若嚴重損及外側韌帶，在X光下可能會看到踝關節外側關節間隙增寬
- C.強力內翻（inversion）傷害若造成外踝骨折，多為撕脫性斜形骨折
- D.若後距腓韌帶及跟腓韌帶損傷明顯，X光可以看到內外踝間距增寬
- 45.患者膝蓋外側疼痛，有關局部解剖觸診之敘述，下列那些正確？①闊筋膜張肌，在髌骨外側，其遠端連接於腓骨外側，於患者伸膝時容易觸診 ②膝蓋外側副韌帶連接著股骨外上髁與脛骨平台外側，屈膝外展外旋髌部時容易觸摸到 ③股二頭肌肌腱遠端止於腓骨頭位置 ④前上脛腓韌帶位於脛骨與腓骨頭近端的關節縫
- A.①②
- B.②④
- C.①③
- D.③④
- 46.45歲男性，左手前三指麻1週，近1個月起從事保母工作，慣用左手抱幼童。關於其診療的敘述，下列何者正確？①進行Finkelstein test確認是否有正中神經壓迫 ②在腕關節的掌側進行敲擊看是否引發麻或電的不適感覺 ③檢查旋前圓肌是否有明顯的壓痛點 ④進行Phalen's test確認是否有橈神經壓迫 ⑤需再進一步確認麻木的分布區域是掌側或背側
- A.①②⑤

B. ①③④

C. ②③④

D. ②③⑤

47. 關於 de Quervain tenosynovitis 的敘述，下列何者錯誤？

A. 此病影響的是包覆在外展拇長肌腱和伸拇長肌腱的腱鞘結構

B. 急性期時，對患者施予 Finkelstein test 可誘發疼痛

C. WHAT test（腕部過度屈曲加拇指外展）也是此病的試驗之一

D. 懷孕是此病的危險因子之一

48. 20歲女性，跌倒以右手掌撐地，之後即覺手腕轉動有「卡卡」的感覺，中指無法伸直，握拳時第3掌骨頭明顯塌陷，最可能受傷的是下列那一個結構？

A. 月狀骨

B. 豆狀骨

C. 大多角骨

D. 鈎狀骨

49. 下列對於上肢傷筋、骨病的敘述，何者正確？

A. 大圓肌腱發炎，臨床表現會出現外展60~120度範圍的疼痛弧

B. 腕隧道症候群（carpal tunnel syndrome）有可能出現大、小魚際肌肉萎縮症狀

C. Tinel test 與 Allen test 被用於檢查腕隧道症候群（carpal tunnel syndrome）

D. 肘部的旋後動作會使用到肱二頭肌、旋後肌及肱橈肌

50. 下列何者為尺神經（ulnar nerve）支配的肌肉？

A. 喙肱肌

B. 肱橈肌

C. 尺側屈腕肌

D. 橈側屈腕肌

51. 70歲女性，2週前跌坐後臀部疼痛明顯坐姿疼痛，X光顯示左側坐骨骨折，因疼痛與嚴重便秘前來中醫骨傷科就診，證見腹滿腹脹、腹中堅實、疼痛拒按，按之痛甚，舌質紅，苔黃厚膩，下列敘述何者正確？①治宜攻下逐瘀 ②治宜養血潤燥 ③傷在骨盆用桃仁承氣湯 ④傷在骨盆用當歸雞血藤湯 ⑤可用增液承氣湯

A. ②④

B. ②⑤

C. ①③

D. ①④

52. 有關蹠趾關節脫位與損傷的敘述，下列何者正確？①第5蹠趾關節脫位較常見 ②多因外力導致，常迫使蹠趾關節過伸 ③常見近節趾骨基部脫向蹠骨頭的背側呈背側移位 ④《正骨心法要旨》：趾骨受傷，多與指骨相同，惟奔走急迫，因而受傷者多
- A. ①②
B. ②③
C. ①③
D. ②④
53. 有關脫位與神經損傷併發症的敘述，下列何者正確？①腕關節前脫位造成坐骨神經損傷 ②肩關節前脫位造成腋神經損傷 ③月狀骨脫位造成正中神經損傷 ④肘關節後脫位造成尺神經損傷 ⑤孟氏（Monteggia）骨折脫位造成正中神經損傷
- A. ②③⑤
B. ②③④
C. ①③④
D. ①②⑤
54. 老太太今日早上發生橈骨遠端骨折，因為不願開刀，欲以中醫徒手復位及夾板外固定。關於包紮及固定的敘述，下列何者最不適當？
- A. 繃帶纏繞包紮前臂時，爪甲處要露出以方便評估循環的好壞
B. 經徒手復位及夾板外固定後，隔天手部可能更為腫脹，因此外固定時綁帶不要綁太緊
C. 返家後若發生局部有腫脹、疼痛、麻木、冰涼等情況，屬疾病自然發展過程，可不予理會
D. 使用夾板做外固定時，可利用不同種類的壓力墊來加強外固定的效果，但要避免造成壓迫性潰瘍的情況
55. 關於骨折所造成的神經、血管損傷併發症，下列何者最不適當？
- A. 肱骨幹骨折－正中神經損傷
B. 肱骨髁上骨折－正中神經損傷
C. 伸直型肱骨髁上骨折－肱動脈
D. 肱骨外科頸骨折－腋動脈
56. 關於肱骨近端骨折的敘述，下列何者最不適當？
- A. 大多為間接暴力所導致
B. 肩關節脫臼可能造成肱骨大結節撕脫性骨折
C. 肱骨近端骨折因結構問題，最容易發生在肱骨解剖頸
D. 骨折後所導致的持續移位，大部分是因為肌肉牽拉所導致
57. 患者2天前於交通事故中撞擊左胸，患處疼痛，無呼吸困難等併發症。經診斷為第5肋骨骨折，下列

敘述那些適當？①此患者無須手法整復 ②此時用藥以黃耆五物湯加減為主 ③患者疼痛難耐，可加雲南白藥或三七 ④患者的胸廓會出現吸氣時向內凹陷，呼氣時向外凸出的現象

A. ①④

B. ①③

C. ②④

D. ②③

58. 關於脊椎骨折合併脫位造成脊髓損傷的敘述，下列何者最適當？

A. 《聖濟總錄》稱此問題為「體惰」

B. 脊髓震盪是指患者雖僅有功能上暫時性傳導中斷，但預後不佳

C. 外傷性截癱具明顯的外傷史，X光片不只能顯示骨折、脫位的部位和椎管內有無碎骨片，也能準確地反映脊髓本身的損害程度

D. 脊髓斷裂是指脊髓本身遭受骨折脫位或異物的損傷，發生神經細胞的破壞，神經纖維束的撕斷，甚至脊髓完全橫斷等病變

59. 有關髌骨骨折的敘述，下列何者正確？①《素問·骨空論》：「膝解為骸關，俠膝之骨為連

骸。」，故髌骨又名連骸骨 ②髌骨縱裂骨折，其周圍筋膜及關節囊多保持完整，故骨折多為無位移骨折 ③髌骨橫裂骨折，好發於髌骨下三分之一處，常導致筋膜及關節囊撕裂 ④髌骨骨折之治療，可使用「抱膝」進行屈曲固定

A. ①②④

B. ②③④

C. ①②③

D. ①③④

60. 有關距骨骨折之敘述，下列何者正確？①距骨體前寬後窄，踝關節蹠屈（plantarflexion）時，可往側向移動，背屈（dorsiflexion）時，關節穩定性增加而較無法往側向移動 ②距骨常因創傷而導致供應距骨的血管損傷，容易發生距骨缺血性壞死 ③距骨頸骨折合併距下關節脫位或合併距骨體後脫位，常導致骨折間隙增加 ④常因自高跌下，足呈背屈位著地，導致跟骨與脛骨上下撞擊距骨，而常見距骨體骨折

A. ①②③

B. ②③④

C. ①②④

D. ①③④

61. 小兒疳積後，初起暗處不能見物，繼而眼珠乾燥，黑睛混濁，甚至糜爛破損為特徵的眼病，《秘傳眼科龍木論》稱之為疳積上目，下列何者非其病因病機？

A. 肝脾虧虛，不榮頭面

B.脾虛肝熱，肝熱上攻

C.脾虛濕困，精氣不化

D.下焦虛寒，大便頻泄

62.依據五輪學說，兩眦屬於五輪中的何者？

A.肉輪

B.血輪

C.氣輪

D.風輪

63.下列眼與臟腑關係之敘述，何者錯誤？

A.脾胃為後天之本，胃納脾運，則目得養，若飲食不節，又後感外邪，內外交熾可產生針眼、瞼弦赤爛

B.脾主運化，若津液不得敷布，則濕從內生、聚而成痰，可導致胞腫如桃

C.如久病失養，或過用寒涼藥物可致脾陽不振，導致內障如雲霧移睛

D.肝膽二經互為表裏，臨床上難以截然分開，用藥也常肝膽同治

64.關於風赤瘡癢，下列敘述何者錯誤？

A.脾胃濕熱，復受風邪，風濕熱三邪結於胞瞼

B.胞瞼腫癢，皮色紅赤，少量丘疹，屬脾經風熱，治用除風清脾飲加減

C.外治可以西瓜霜眼藥水點眼

D.風火上攻者，眼瞼紅赤如塗硃，局部潰爛，治用普濟消毒飲加減

65.關於倒睫拳毛的敘述，下列何者正確？

A.皮緊弦鬆、疼痛

B.肝風脾熱相壅而成

C.治宜通脾瀉胃湯

D.大眦多虛，小眦實

66.《銀海精微》云：「初起麻木疼痛，汪汪淚出，病勢洶湧，卒暴之變莫測，……治稍遲，或控膿」應是下列何眼病？

A.突起睛高

B.黃膜上衝

C.異物入目

D.疳積上目

67.下列何書對「疳積上目」記載較早？

- A.《銀海精微》
- B.《秘傳眼科龍木論》
- C.《眼科心法》
- D.《審視瑤函》

68.關於鼻咽癌的臨床症候，下列何者較不常見？

- A.吞嚥疼痛
- B.耳鳴、聽力減退
- C.頸項惡核
- D.鼻衄

69.關於旋耳瘡的證治敘述，下列何者正確？①多發於耳前或耳後縫間 ②又稱為黃水瘡、月蝕瘡 ③以局部性的潮紅、糜爛、滲出黃色脂水、不易結痂為主要症狀 ④主要成因為風熱毒邪外侵或肝膽濕熱上蒸

- A.①②
- B.①③
- C.②③
- D.②④

70.鼻出血外用導引止血法中以大蒜搗爛敷於何穴，引熱下行減少上炎，以達止血？

- A.三陰交
- B.足三里
- C.湧泉穴
- D.陽陵泉

71.風熱乳蛾證屬邪熱傳裏，肺胃熱盛，治以下列何方最適宜？

- A.疏風清熱湯
- B.普濟消毒飲
- C.桑菊飲
- D.知柏地黃丸

72.口瘡若熱邪較盛，潰點多，甚者融合成小片，疼痛加重，甚或出現腮舌俱腫，以及大便秘結等裏熱蘊結症狀，應上清膈熱，下泄熱毒，宜涼膈散加何藥最適合？

- A.黃柏、知母
- B.黃柏、石膏
- C.黃連、石菖蒲

D.黃連、生地

73.患者黑睛周邊驟生白翳，漸漸厚闊，中間低陷，白睛混赤，畏光流淚，眼瞼難睜，舌紅苔薄黃，脈浮數。關於此患者的狀況，下列敘述何者正確？

A.最有可能的診斷為蟹睛症

B.本病在《秘傳眼科龍木論》即有記載

C.本病初起，多係熱熾腑實，治宜瀉熱通腑

D.本病以虛證為主

74.古籍中治療耳鼻咽喉口齒疾病的記載，下列敘述何者錯誤？

A.《千金翼方》上載有燒灼治療咽喉病的方法

B.《外臺秘要》上載有「升麻揩齒方」

C.《證類本草》上載有用汞合金鑲牙補牙的方法

D.《洪氏集驗方》有應用壓迫頸外動脈以止鼻衄的報導

75.下列何書最早將小兒耳鼻咽喉口齒疾病作專卷論述？

A.《金匱要略》

B.《諸病源候論》

C.《傷寒論》

D.《千金要方》

76.耳殼流痰宜祛痰散結，疏風通絡，治以二陳湯祛痰，為加強祛痰之力，應加入何藥為宜？

A.地龍、鬱金、柴胡

B.丹參、當歸、黃耆

C.竹茹、枳實、膽星

D.僵蠶、絲瓜、白朮

77.關於「鼻鼽」之外治，下列何者最適宜？

A.用滴鼻靈滴鼻，或以柴胡注射液滴鼻

B.辛夷花適量研末，每用少許吹鼻中，以通透鼻竅

C.宜用滋養潤燥藥物，可選用菴蓉滴鼻液、蜂蜜、芝麻油加冰片少許滴鼻，每日2~3次

D.宜用辛散風寒，行氣活血，兼以解毒通竅的藥物

78.患者，鼻內肌膜腫脹，甚至鼻甲硬實不消，凹凸不平，但鼻腔內無新生物堵塞，其診斷為何種鼻病？

A.鼻塞

B.鼻鼽

C.鼻槁

D.鼻息肉

79.關於「風熱喉痹」之敘述，下列何者錯誤？

A.常因氣候急劇變化，起居不慎，肺衛失固，而為風熱邪毒趁虛侵犯

B.針刺療法：選合谷、內庭、曲池為主穴，天突、少澤、魚際為配穴

C.病變部位主要在喉核，故喉核紅腫，有黃白色膿點

D.護理及預防：少食用煎炒炙燂之物

80.口齒唇舌病用藥粉吹布於患部，以達到清熱解毒，消腫止痛，祛腐生肌的目的，是局部常用的有效療法，下列何者是一般常用的藥方？

A.如意金黃散

B.冰硼散

C.龍眼白鹽散

D.四黃散