

115 年第一次專門職業及技術人員高等考試醫師牙醫師中醫師藥師考試分階段考試、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師考試

代 號：2317

類科名稱：中醫師(一)

科目名稱：中醫基礎醫學(二)(包括中醫方劑學、中醫藥物學)

考試時間：1 小時 30 分鐘

座號：_____

※注意：本試題禁止使用電子計算器

※本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當答案。

1. 關於辛溫解表劑之敘述，下列何者錯誤？

- A. 《傷寒論》麻黃湯為辛溫發汗重劑，適用於外感風寒表實證
- B. 《此事難知》九味羌活湯辛溫發汗，兼清裏熱，適用於外感風寒，鬱而化熱，熱重寒輕者
- C. 《醫學心悟》加味香蘇散為辛溫發汗之緩劑，適用於四時感冒，惡寒發熱不甚而無汗之表證
- D. 《傷寒論》小青龍湯發汗解表除寒飲，適用於素有停飲又感風寒

2. 下列何者為《溫病條辨》新加黃龍湯的組成內容？

- A. 火麻仁、當歸
- B. 麥門冬、當歸
- C. 麥門冬、白芍
- D. 火麻仁、白芍

3. 《傷寒論》十棗湯與《景岳全書》舟車丸之比較，下列敘述何者正確？

- A. 前者組成中去大棗、甘遂加大黃、黑丑、陳皮、青皮、木香、檳榔、輕粉即為後者之組成
- B. 前者為攻下逐水之峻劑，後者為攻下逐水之緩劑
- C. 後者可治療水熱內壅，氣機阻滯之證
- D. 依原書敘述，兩者服用時間均應在腎經主時，即酉時服用較佳

4. 關於中藥煎煮方法，下列何藥物最不宜先煎？

- A. 竹茹
- B. 砂仁
- C. 生石膏
- D. 糯稻根

5. 《小兒藥證直訣》瀉黃散組成中具有清熱瀉火的藥物，下列正確有幾項？①山梔子 ②黃連 ③石膏 ④知母

- A. 1
- B. 2

C.3

D.4

6.《溫病條辨》清營湯，有關其方義與臨床應用原則，下列何者最不適宜？

- A.本方含《溫病條辨》增液湯藥物組成，用之以養陰清熱
- B.入營猶可透熱轉氣，故以竹葉心與石膏清心火，使營分熱邪透出氣分而解
- C.若營熱逆傳心包，見竅閉神昏者，可加《溫病條辨》安宮牛黃丸，以清心開竅
- D.若熱盛引動肝風，見瘓厥抽搐者，可加羚羊角，以熄風止瘓

7.依《醫方集解》所述，下列何者不是《傷寒論》吳茱萸湯的主治證候？

- A.厥陰頭痛，乾嘔吐涎沫
- B.少陰吐利，手足厥冷，煩躁欲死
- C.心中大實痛，嘔不能食
- D.胃中虛寒，食穀欲嘔，胸膈滿悶

8.《外科全生集》陽和湯之敘述，下列何者最不適宜？

- A.以熟地、鹿角膠為主要藥物；麻黃：辛溫，宣通經絡，引陽氣，散寒結，故可用於陰疽
- B.白芥子：善治皮裏膜內外之痰，與麻黃配伍可以散寒通滯
- C.陽虛重，陰寒盛者，可加附子
- D.陽證者，得見瘡瘍紅腫焮熱仍可使用

9.下列何者不屬於方劑分類中的「十劑」？

- A.輕、重
- B.寒、熱
- C.澀、滑
- D.燥、濕

10.有關方劑之敘述，下列何者最適宜？①十棗湯與五苓散均治水飲壅盛 ②十棗湯主治飲停胸脇腹腔；五苓散主治水飲內停，膀胱氣化不利 ③十棗湯之功用為攻逐水飲；五苓散之功用為利水滲濕，溫陽化氣

- A.僅①
- B.僅①②
- C.僅②③
- D.①②③

11.關於《濟生方》歸脾湯之敘述，下列何者正確？①方中具有理氣作用的藥是香附 ②可治氣虛下陷之崩漏帶下 ③方中龍眼肉能補脾氣、養心血 ④可治心脾兩虛之失眠、盜汗 ⑤方中酸棗仁、遠志、合歡皮安神定志

A. ①②

B. ①③

C. ③④

D. ②⑤

12. 下列方劑中同時具有通任、督二脈之藥物組成者，有幾項？①《景岳全書》左歸丸 ②《景岳全書》右歸丸
③《醫方考》龜鹿二仙膠 ④《丹溪心法》虎潛丸 ⑤《醫方集解》七寶美髯丹

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

13. 《太平惠民和劑局方》涼膈散與《普濟方》普濟消毒飲共有的藥物有幾項？

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

14. 35 歲男性近 3 個月因工作壓力大，導致脇肋脹痛，嘈雜吞酸，口苦咽乾，舌紅苔黃，脈弦數，下列何方治療最適宜？

A. 《丹溪心法》左金丸

B. 《柳州醫話》一貫煎

C. 《傷寒論》四逆散

D. 《傷寒論》半夏瀉心湯

15. 有關《丹溪心法》大補陰丸的敘述，下列何者最適宜？

A. 由方中藥物組成劑量比例可知本方以降火清源為主，滋陰培本為輔

B. 本方與《溫病條辨》青蒿鱉甲湯均能清虛熱，但本方清虛熱較強，而青蒿鱉甲湯養陰之力較強

C. 本方與《小兒藥證直訣》六味地黃丸均有補肝腎、清虛火的作用，但本方滋陰降火之力較弱

D. 本方立方要旨是根據朱丹溪「陰常不足，陽常有餘」之理論所制定的代表方劑

16. 《傷寒論》白虎湯的主治病證，下列敘述共幾項正確？①表邪未解的無汗發熱，口不渴者 ②脈浮細或沉者
③血虛發熱，脈洪大無力 ④氣分實熱 ⑤暑熱煩渴，身熱，汗出，脈滑數

A. 2

B. 3

C.4

D.5

17.《傷寒六書》回陽救急湯的組成中，不含以下那一味中藥？

A.熟附子

B.黃耆

C.乾薑

D.人參

18.傷寒，8~9日，下之，胸滿煩驚，小便不利，譫語，身重不可轉側。當以下列何方治療最適宜？

A.《傷寒論》柴胡桂枝乾薑湯

B.《傷寒論》柴胡桂枝湯

C.《傷寒論》柴胡加龍骨牡蠣湯

D.《金匱要略》甘麥大棗湯

19.下列何者不是《醫方集解》金鎖固精丸的組成藥物？

A.龍骨

B.蓮蕊鬚

C.金櫻子

D.芡實

20.龜板常與黃柏配伍，以滋腎陰並清熱，下列何種方劑無此組合？

A.《丹溪心法》大補陰丸

B.《丹溪心法》固經丸

C.《蘭室秘藏》通關丸

D.《丹溪心法》虎潛丸

21.68歲男性患者，咳嗽反覆已3年，近日喘咳加重，胸悶不舒，痰多偏稀，小便可，大便微不暢，腰膝痠軟。

苔白膩、舌淡，脈弦滑。下列何處方治療最適宜？

A.《攝生眾妙方》定喘湯

B.《濟生方》濟生腎氣丸

C.《太平惠民和劑局方》蘇子降氣湯

D.《金匱要略》半夏厚朴湯

22.關於《醫學發明》復元活血湯之敘述，下列何者錯誤？

A.其功用以疏肝通絡、活血化瘀為主

B.組成有炮山甲因保育動物現已不用，與柴胡疏肝理氣，共為主藥

C.方中含有桃仁、紅花、當歸

D.方中瓜蔓根入血分消瘀血，續絕傷，清熱散腫消結

23.32 歲女性病患，抱怨月經不調已數年，想要懷孕。證見經期不準，或前或後，經前小腹冷痛，經來有血塊，或逾期不止，傍晚時覺身熱，口乾，舌淡，脈沉緊。下列何方最適宜？

A.《傅清主女科》生化湯

B.《金匱要略》溫經湯

C.《醫林改錯》血府逐瘀湯

D.《婦人大全良方》女科柏子仁丸

24.38 歲未婚女性患者，患有子宮內膜異位證，經來腹痛甚，血塊多色黯，舌紫黯，脈澀。下列何方治療最適宜？

A.《太平惠民和劑局方》加味逍遙散

B.《傷寒論》芍藥甘草湯

C.《金匱要略》桂枝茯苓丸

D.《傷寒論》四逆散

25.關於《普濟本事方》槐花散之敘述，下列何者最不適宜？

A.可治療腸風臟毒下血之證

B.以槐花、側柏葉涼血止血為方中主藥（君藥）

C.枳殼寬腸理氣為方中佐使藥

D.諸藥研為粉末，用清米飲調服，空心食前服

26.《傷寒論》旋覆代赭石湯之敘述，下列何者最適宜？

A.可治療因汗、吐、下後，雖表證已解，但胃氣已傷，痰濁內阻，胃失和降，虛氣上逆之證

B.以旋覆花、代赭石、半夏下氣化痰，降逆止嘔，為方中主藥（君藥）

C.可治療因汗、吐、下後，雖表證未解，但胃氣已傷，肝氣橫逆，胃失和降，胃氣上逆之證

D.其虛實互見主要責之脾與胃

27.下列何方，沒有使用任何與《太平惠民和劑局方》失笑散相同的藥物？

A.《醫林改錯》少腹逐瘀湯

B.《醫林改錯》膈下逐瘀湯

C.《醫林改錯》血府逐瘀湯

D.《丹溪心法》小薊飲子

28.關於祛風劑，下列何者錯誤？

- A.平息內風與疏散外風必須區別
- B.外風常與寒、熱、痰、濕、瘀兼夾致病；必須與祛寒、清熱、化痰、祛濕、化瘀等方法合併使用
- C.內風需辨別虛、實，寒、熱之不同；與滋陰、平肝、溫腎、清熱息風法配合使用
- D.川芎茶調散即為平息內風類祛風劑

29.77 歲女性，突發頭暈目眩，目脹耳鳴，腦部熱痛，心中煩熱，肢體漸覺不利，口角漸形歪斜，脈弦長有力，治以下列何組成最適宜？

- A.陳皮、半夏、枳實、竹茹、生薑、茯苓、甘草
- B.懷牛膝、生赭石、生龍骨、生牡蠣、生龜板、白芍、玄參、天冬、川棟子、生麥芽、茵陳、甘草
- C.柴胡、半夏、人參、甘草、黃芩、生薑
- D.黃耆、當歸、川芎、地龍、赤芍、桃仁、紅花

30.關於祛濕劑的敘述，下列何者正確？

- A.《太平惠民和劑局方》藿香正氣散屬於利水滲濕劑
- B.《華氏中藏經》五皮散屬於芳香化濕劑
- C.《朱氏類編輯驗方》雞鳴散屬於溫化水濕劑
- D.《丹溪心法》萆薢分清飲屬於祛濕清熱劑

31.下列那個方劑可用以治療濕溫初起，證見頭痛，惡寒，面色淡黃，胸悶不飢，午後身熱，身重疼痛，舌白不渴，脈弦細而濡？

- A.《傷寒論》茵陳蒿湯
- B.《太平惠民和劑局方》藿香正氣散
- C.《溫熱經緯》甘露消毒丹
- D.《溫病條辨》三仁湯

32.有關《和劑局方》川芎茶調散之敘述，下列何者最不適宜？

- A.主治風痰之證
- B.以川芎治厥陰頭痛、白芷治陽明頭痛、羌活治太陽頭痛，共為方中主要藥物
- C.治正偏頭痛或巔頂作痛，惡寒發熱，目眩鼻塞，舌苔薄白，脈浮者
- D.若屬氣虛、血虛、肝腎陰虧、肝陽上亢、肝風內動等所引起的頭痛，均不宜使用

33.下列那些藥物為《溫熱經緯》甘露消毒丹之組成？

- A.滑石、貝母、通草、大黃
- B.藿香、甘草、連翹、石菖蒲

C.茵陳、石菖蒲、黃連、貝母

D.藿香、連翹、薄荷、白豆蔻

34.有關《楊氏家藏方》牽正散之敘述，下列何者最不適宜？

A.主治風痰阻於頭面經絡

B.與《外科正宗》玉真散相比，皆有白附子化痰通絡

C.原書建議以熱酒調服

D.組成的三藥皆為有毒之品，用量宜慎

35.65 歲患者，外感後，咳喘反覆，伴見痰黏難咳，咽喉乾燥疼痛，上氣喘促，自訴咽喉乾燥，舌紅苔少，脈數，治以下列何組成最適宜？

A.半夏、陳皮、茯苓、甘草、枳實、竹茹

B.貝母、瓜蒌、天花粉、茯苓、陳皮、桔梗

C.紫菀、百部、桔梗、陳皮、荊芥、白前、甘草、生薑

D.半夏、茯苓、枳殼、風化硝、生薑

36.關於《千金》葶苈湯，下列敘述何者最不適宜？

A.肺熱甚者：可加魚腥草、金銀花，以加強清熱解毒之作用

B.氣虛：可加黃耆、人參

C.膿已成，痰量較多者：可加桔梗、甘草、貝母

D.脇痛：可加黃連、黃芩、黃柏

37.《金匱要略》大黃牡丹皮湯之敘述，下列何者最不適宜？

A.大黃：苦寒攻下，瀉腸中濕熱鬱結，去腸中瘀血；桃仁：苦平破血，共為主要藥物

B.寒濕瘀滯腸癰禁用

C.方中冬葵子清熱解毒，排膿消癰

D.氣滯腹脹者：加小茴香、木香行氣滯

38.10 歲男生，突然出現高燒 40℃，伴見寒顫，口乾口臭，咽喉腫痛，大便秘結，小便黃赤，經醫師檢查舌紅苔黃膩，脈滑數有力。最宜下列何方治療？

A.《疫疹一得》清瘟敗毒飲

B.《宣明論方》防風通聖散

C.《蘭室秘藏》清胃散

D.《溫疫論》達原飲

39.下列何者為《丹溪心法附餘引王隱居方》礞石滾痰丸之功用？

- A.瀉肺逐飲
- B.瀉火逐痰
- C.清氣化痰，理氣止咳
- D.消癭散結，化痰軟堅

40.下列何者為《婦人良方》導痰湯之主治？

- A.中風，痰迷心竅，舌強不能言，舌紅少苔，脈細數
- B.頑痰膠固，痰涎壅盛，胸膈痞塞，飲食少思以及肝風挾痰，眩暈痰厥，舌苔厚膩，脈滑
- C.風痰所致之眩暈頭痛，痰多胸悶，舌苔白膩者
- D.胸中痞滿脹痛，或咳嗽痰稠，口苦，舌苔黃膩

41.祛風除濕，通絡止痛，能用於風濕痹痛、肢體麻木，外用可治乳腺炎、腮腺炎，下列何藥最適宜？

- A.羌活
- B.桑枝
- C.防己
- D.威靈仙

42.下列何藥最不適用於風濕痹痛？

- A.麻黃
- B.木賊
- C.蒼朮
- D.藁本

43.下列何藥最能祛風勝濕，止癢、止血，為產後要藥？

- A.防風
- B.荊芥
- C.浮萍
- D.薄荷

44.有關防風的敘述，下列何者最不適宜？

- A.用於外感風熱，陰虛火旺，頭痛、目赤，以其發散表邪
- B.用於外感風寒，表證夾濕，頭痛，身疼，以其勝濕止痛
- C.用於風寒濕痹，關節疼痛、四肢攣急，以其祛風散寒
- D.用於角弓反張，牙關緊閉，抽搐痙攣，以其祛風解痙

45.有關胡椒主治，下列敘述何者最不適宜？

- A.陰寒腹痛，嘔吐泄瀉
- B.寒痰食積，腸滑冷痢
- C.陰虛內熱，咳嗽哮喘
- D.胃寒吐水，浮熱齒痛

46.有關滑石的功效，下列敘述何者最不適宜？

- A.明目退翳
- B.清解暑熱
- C.祛濕斂瘡
- D.利水通淋

47.下列何藥具有利水通淋、除濕退黃、解毒消腫之功效？

- A.金錢草
- B.瞿麥
- C.石韋
- D.篇蓄

48.有關海金沙的用途，下列敘述何者最不適宜？

- A.熱淋
- B.血淋
- C.氣淋
- D.砂淋

49.關於草豆蔻的敘述，下列何者最為適宜？

- A.燥濕、溫中作用類似砂仁，而其溫燥之性尤過之
- B.能解痰火氣血濕食六鬱
- C.化銅鐵骨哽
- D.化濕、和中功效與藿香相似

50.有關車前子的應用，下列何者最為適宜？

- A.內傷勞倦
- B.陽氣下陷
- C.腎虛精滑
- D.目赤翳障

51.善於化濕、行氣，醒脾和胃之良藥，下列何者最為適宜？

A.砂仁

B.半夏

C.茯苓

D.黃連

52.有關青葙子的功效，下列敘述何者最不適宜？

A.清肝火

B.明目退翳

C.祛風熱

D.寧心安神

53.下列何藥與檳榔同服，具有相使之效？

A.使君子

B.牽牛子

C.牛蒡子

D.千金子

54.下列何藥苦泄溫通，入肝經血分，能活血、散瘀、止痛，還可解蛇、蟲毒？

A.五靈脂

B.紅花

C.蘇木

D.地鱉蟲

55.善於瀉胸脇水飲，可治肝硬化腹水，下列何者最為適宜？

A.半夏

B.枯萆實

C.芫花

D.藜蘆

56.天花粉最適宜用於下列何病證？

A.陰虛發熱，而見骨蒸勞熱、日晡潮熱

B.溫熱病之口渴煩躁及消渴證之口渴

C.心火上炎所致口舌生瘡、心煩不眠

D.肝火上炎，目赤腫痛，兼有頭脹面熱

57.功效最類似火麻仁而較強，並具下氣利水，下列何藥最適宜？

A. 郁李仁

B. 白蔻仁

C. 柏子仁

D. 巴豆霜

58. 穀精草治喉痹、齒痛，陽明風熱，其何種功能在菊花之上？

A. 祛風濕

B. 殺蟲

C. 消脹

D. 明目退翳

59. 山豆根主治，下列何者最為適宜？

A. 氣凝血結、上下內外諸痛

B. 雙蛾喉痹、砂淋血淋

C. 喉癰喉風、齦腫齒痛

D. 結核、癰疽

60. 下列何藥生用：涼血、止血；乾品：收澀止血，可用於胃中瘀熱及肺熱咳血等證？

A. 藕節

B. 白茅根

C. 大小蓟

D. 艾葉

61. 下列能止血、止瀉藥物中，何者煎煮時採包煎或煎湯代水處理？

A. 五倍子

B. 明礬

C. 石榴皮

D. 伏龍肝

62. 下列何者苦寒瀉熱，能化痰止咳，用於肺熱咳嗽；也能用於熱結便秘？

A. 大黃

B. 車前子

C. 虎杖

D. 桃仁

63. 下列何者祛瘀散結而不傷正氣，可用於月經不調及產後小便不利、全身浮腫的治療？

- A.桃仁
- B.凌霄花
- C.澤蘭
- D.月季花

64.具有顯著涼血、止血功效，下列何藥物最為適宜？

- A.竈心土
- B.側柏葉
- C.艾葉
- D.棕櫚炭

65.枸杞代茶，可用於下列何證？

- A.水腫
- B.腳氣
- C.淋
- D.消渴

66.下列何藥，可除風濕，下三蟲，以其得坤土之精粹，久服不飢？

- A.紫菀
- B.白前
- C.黃精
- D.紫蘇

67.有關桔梗科黨參之敘述，下列何者最不適宜？

- A.味甘，微溫。歸脾、肺、腎經
- B.補中益氣，生津養血
- C.氣滯、火盛者，慎用
- D.胃有寒濕者，慎服

68.具有清肺降火、滋陰潤燥、潤腸通便之功效，下列何藥物最為適宜？

- A.北沙參
- B.石斛
- C.天門冬
- D.枸杞子

69.大便溏泄者須慎服、忌服之補虛藥，下列何者最不適宜？

- A.當歸
- B.扁豆
- C.熟地黃
- D.蜂蜜

70.下列何種藥物，外敷肚臍時，可用於小便不通及腸梗阻？

- A.麝香
- B.蟾酥
- C.牽牛子
- D.大黃粉

71.下列何種藥物，性味：苦，寒，具平肝潛陽、降逆、止血，用於心悸、耳鳴及熱結便秘？

- A.代赭石
- B.牡蠣
- C.龍骨
- D.石決明

72.下列何種藥物，生用：具軟堅散結，用於痰火鬱結；炮製後：收斂固澀，用於虛汗、遺精、帶下等證？

- A.海浮石
- B.牡蠣
- C.龍骨
- D.赤石脂

73.下列何藥具有燥濕化痰、祛風止癱，既祛風痰，又能止痛，尤擅治頭面部諸疾？

- A.白芥子
- B.禹白附
- C.關白附
- D.膽南星

74.下列何種藥物，為治肝風內動，驚癇抽搐的要藥，並有辟邪而解諸毒功用？

- A.天麻
- B.羚羊角
- C.艾葉
- D.石菖蒲

75.有關川貝母的敘述，下列何者最不適宜？

A.為百合科川貝母之乾燥根莖

B.用治肺熱燥咳

C.脾胃虛寒、風寒咳嗽，忌用

D.不可與烏頭類藥物同用

76.能用於虛汗不止、遺精，亦有收斂止血之功，下列何藥物最適宜？

A.五味子

B.肉豆蔻

C.烏梅

D.山茱萸

77.蜀漆為下列何藥之莖葉？

A.澤漆

B.芫花

C.常山

D.漆樹

78.大麥芽能化一切米、麵、果食積，並能：

A.通乳下胎

B.收自汗

C.縮小便

D.止消渴

79.能用於久泄不止、帶下、遺精，亦有安神之功，下列何藥物最適宜？

A.五倍子

B.訶子

C.蓮子

D.沙苑子

80.關於藥材的藥用部位，下列何者與其他三者不同？

A.薑黃

B.莪朮

C.鬱金

D.三棱