

107 年第二次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段考試、營養師、心理師、護理師、社會工作師考試、107 年專門職業及技術人員高等考試法醫師、語言治療師、聽力師、牙體技術師考試、高等暨普通考試驗光人員考試試題

代號：1102
頁次：6-1

等 別：高等考試

類 科：中醫師（二）

科 目：中醫臨床醫學（一）（包括傷寒論（學）、溫病學、金匱要略、中醫證治學、中醫診斷學）

考試時間：1 小時 30 分

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 1 依《醫宗金鑑·傷寒論》，有關小建中湯證治的敘述，下列何者錯誤？
(A)嘔家不可服 (B)組成裡，芍藥用六兩重
(C)主治傷寒二三日，心中悸而煩者 (D)服後須服熱稀粥，溫覆令汗
- 2 依《傷寒論》，有關小陷胸湯的脈症，下列敘述何者錯誤？
(A)心下硬滿 (B)按之則痛，不按不痛 (C)脈沉緊 (D)脈浮滑
- 3 依《醫宗金鑑·傷寒論》，有關茯苓桂枝白朮甘草湯的主要脈症，下列敘述何者錯誤？
(A)心下逆滿，氣上衝胸 (B)身為振振搖者 (C)起則頭眩 (D)脈滑數
- 4 依《醫宗金鑑·傷寒論》，症見心下痞，按之濡，其脈關上浮者，下列何方治療最適當？
(A)旋覆代赭石湯 (B)生薑瀉心湯 (C)附子瀉心湯 (D)大黃黃連瀉心湯
- 5 依《醫宗金鑑·傷寒論》，傷寒脈浮緩，身不疼，但重，乍有輕時，無少陰證者，下列何方治療最適當？
(A)桂枝湯 (B)葛根湯 (C)大青龍湯 (D)附子湯
- 6 依《醫宗金鑑·傷寒論·霍亂病篇》症見霍亂吐利汗出，發熱惡寒，四肢拘急，手足厥冷者，下列何方治療最適當？
(A)通脈四逆湯 (B)四逆湯 (C)四逆加人參湯 (D)吳茱萸湯
- 7 依《傷寒論》，通脈四逆加豬膽汁湯證與四逆加人參湯證皆屬於陽亡液竭的證候，下列敘述何者最適當？
(A)頭痛，發熱，身疼痛熱，多欲飲水，通脈四逆加豬膽汁湯主之
(B)「吐已下斷」後，「汗出而厥，四肢拘急乃不得緩解」，可用四逆加人參湯證回陽救逆，益陰和陽
(C)通脈四逆加豬膽汁湯證病勢較輕，只見惡寒、脈微、厥逆、下利止而亡血等證
(D)通脈四逆加豬膽汁湯是霍亂吐利致陽亡陰竭的證治
- 8 30 歲李先生因感冒發熱惡寒，頭痛項強無汗，自行先服西藥解熱鎮痛劑，得汗後，其症稍減。翌日就診於中醫，以為表虛，用疏邪實表之劑，服一劑汗出即止。再劑上證加重，自覺項背強几几，全身不適。以下列何方治之最適當？
(A)麻黃湯 (B)桂枝湯 (C)桂枝麻黃各半湯 (D)葛根湯
- 9 依《傷寒論》，有關豬苓湯的敘述，下列何者錯誤？
(A)該方組成五味藥為等分
(B)若脈浮發熱，渴欲飲水，小便不利者，豬苓湯主之
(C)組成為茯苓、桂枝、白朮、澤瀉、豬苓
(D)少陰病，下利六、七日，欬而嘔渴，心煩不得眠者，豬苓湯主之
- 10 依《傷寒論》，有關陽明外證的敘述，下列何者錯誤？
(A)陽明裡熱亢盛，蒸騰於外，故身熱 (B)裡熱太盛，迫津外泄，則汗自出
(C)外證惡風寒而裡熱實證 (D)病根是胃家實
- 11 依《傷寒論》所述，辨譫語、鄭聲及其危候，下列敘述何者錯誤？
(A)都是意識不清而妄言亂語 (B)譫語多由邪熱亢盛擾亂神明所致，屬實
(C)鄭聲為精氣消失而心神無主，屬虛 (D)病雖重，下利者猶可治
- 12 36 歲李先生，身體壯實。今因陽明病，醫以下法治之，下之後仍身熱四肢溫，但見心中懊憹，飢不能食，但頭汗出，治以下列何方最適當？
(A)白虎湯 (B)梔子豉湯 (C)調胃承氣湯 (D)麻子仁丸

- 13 依《傷寒論·少陰病》所述：「少陰病，但厥無汗，而強發之」，會發生下列何證？
(A)下竭上竭 (B)下竭上厥 (C)下厥上竭 (D)下厥上厥
- 14 依《傷寒論·厥陰病篇》所述：「下利腹脹滿，身體疼痛者」，病機屬虛寒下利兼有表證，下列治則何者最適當？
(A)表裏同治，溫裏以兼助發表祛邪 (B)先攻其表，復溫其裏
(C)先溫其裏，乃攻其表 (D)先攻其表，表邪去則裏陽自回
- 15 依《傷寒論》所述：「少陰病，身體痛，手足寒，骨節痛，脈沉者」，下列何者錯誤？
(A)本證之主要病理癥結為「陽氣虛弱」
(B)身體及骨節痛乃因「陽氣虛衰，水寒不化，寒濕留於經脈骨節」
(C)可用附子湯以溫經驅寒除濕
(D)主治之方亦用附子，但量略小於真武湯
- 16 依《傷寒論》所述，少陰病的治療原則，下列敘述何者錯誤？
(A)寒化證治宜溫經回陽，以四逆湯為主要代表方劑 (B)熱化證治宜育陰清熱，以黃連阿膠湯為代表方劑
(C)少陰寒化兼有表證，可用麻黃湯發汗 (D)少陰熱化兼裡實證，宜用大承氣湯以急下存陰
- 17 下列何者是暑熱病邪初起的病變中心？
(A)肺衛 (B)肺胃 (C)陽明胃 (D)陽明大腸
- 18 以淡滲之劑，分利濕邪的常用方，下列何者最適宜？
(A)藿朴夏苓湯 (B)三仁湯 (C)王氏連朴飲 (D)茯苓皮湯
- 19 關於溫病常用治法之敘述，下列那些最正確？①解表法多用於溫病初起，如無表證則不可使用 ②邪留三焦氣分，氣化失司、痰濕阻遏的證候治療宜寒涼清透，以泄熱透邪 ③小兒患者在病之初期階段因高熱而引起抽搐，不宜逕投涼肝熄風之品 ④邪熱盛而兼陰液不足仍可純用滋陰。但濕熱之證切忌使用本法，以免戀滯病邪膠著難解
(A)①② (B)①③ (C)②④ (D)③④
- 20 關於溫病學論點與醫家或著作配對，下列何者錯誤？
(A)余師愚說：胃為五臟六腑之海，位居中土，最善容納，邪熱入胃，則不復他傳，故溫熱病熱結胃腑，得攻下而解者，十居六七
(B)《溫熱論》中提出：大凡看法，衛之後方言氣，營之後方言血。在衛，汗之可也；到氣，才可清氣；入營，猶可透熱轉氣；入血，就恐耗血動血，直須涼血散血
(C)吳鞠通提出三焦治法：治上焦如羽，非輕不舉，治中焦如衡，非平不安，治下焦如權，非重不沉
(D)王孟英說：凡視溫證，必察胸脘，如拒按者……必挾痰濕
- 21 溫病在熄風法之應用，下列何者錯誤？
(A)小兒患者在病之初期階段，因高熱而引起抽搐，宜逕投涼肝熄風之品，防止病情持續惡化
(B)羚角鉤藤湯適用於溫病熱盛引動肝風，具有清熱涼肝、熄風定痙作用
(C)溫病後期肝腎陰傷，肝脈失養、虛風內動、甚或時時欲脫，宜用大定風珠治療
(D)心營熱盛，引動肝風，治療宜用清宮湯加羚羊、鉤藤、丹皮，清心開竅、涼肝熄風
- 22 舌診見陽明腑實熱盛，下列何圖為最正確？
(A)  (B)  (C)  (D) 
- 23 風溫證，症見灼熱肢厥、神識昏迷、手足痙攣，舌質紅絳，若以三焦病機辨證，下列何者最正確？
(A)手足厥陰同病 (B)足少陰厥陰同病 (C)足厥陰手陽明同病 (D)手厥陰足少陰同病
- 24 下列何者為風溫邪熱在營分階段的退熱主藥？
(A)銀花、連翹 (B)石膏、知母 (C)犀角(或以水牛角代)、黃連 (D)青蒿、鼈甲
- 25 春溫在病變發展過程中，下列何者錯誤？
(A)熱盛傷陰較突出
(B)易內陷營血，出現氣營(血)兩燔、熱盛動血及熱與血結等證候
(C)本病還易出現邪熱內陷手足少陰的病變，常見手足厥逆和動風驚厥的症狀
(D)本病發展至下焦肝腎，以真陰耗竭為主要特徵，可造成虛風內動

- 26 暑溫出現身熱，面赤，耳聾，胸悶脘痞，下利稀水，小便短赤，咳痰帶血，不甚渴飲，舌紅赤，苔黃滑，下列何方藥治療最適宜？
(A)麻黃、杏仁、石膏、甘草、蒲黃、側柏葉
(B)石膏、知母、甘草、粳米、蒼朮
(C)飛滑石、生石膏、寒水石、杏仁、竹茹、銀花、金汁、白通草
(D)麻黃、杏仁、石膏、甘草、葛根、黃芩、黃連
- 27 有關《溫病條辨》新加黃龍湯的敘述，下列何者錯誤？
(A)本方是從陶節庵之黃龍湯加減變化而成
(B)組成為細生地、麥冬、玄參、生大黃、芒硝、生甘草、人參、當歸、海膽、薑汁
(C)其病機為熱結腑實，應下失下，可見氣液兩虛證候
(D)其症見身熱，腹滿，便秘，苔焦黑，口乾咽燥，唇裂舌焦，倦怠少氣，撮空摸床，目不了了，脈沉弱或沉細
- 28 濕熱疫患者，初起憎寒狀熱，嗣後但熱不寒，晝夜發熱，日晡益甚，頭痛身痛，其脈不浮不沉而數，苔白如積粉，舌質紅絳，最宜用下列何方劑治療？
(A)普濟消毒飲 (B)柴葛解肌湯 (C)白虎加蒼朮湯 (D)達原飲
- 29 40 歲吳男，症見身冷，汗泄，胸痞，口渴，苔白膩，舌淡滑，脈沉細，其病機以下列何者敘述最正確？
(A)濕從寒化，寒濕重傷脾腎陽氣 (B)濕阻中焦，濕重於熱
(C)氣分濕熱俱微，餘邪未淨 (D)濕邪偏重而兼穢濁，陽氣被鬱
- 30 濕溫病致濕阻腸道，傳導失司，而表現為神識如蒙，少腹硬滿，大便不通，苔垢膩，下列何方治療最適宜？
(A)《溫熱經緯》甘露消毒丹 (B)《溫病條辨》宣清導濁湯
(C)《醫原》藿朴夏苓湯 (D)《時病論》雷氏芳香化濁法
- 31 燥邪為病，最易傷津，所以治療以滋潤為主。前人並歸納出秋燥初、中、末三期治療大法，其「下燥」治法為何？
(A)治氣 (B)增液 (C)治血 (D)養肝
- 32 下列關於「溫疫」之敘述何者錯誤？
(A)就性質而言，《溫疫論》所論溫疫屬於濕熱疫，《疫疹一得》所論則屬暑燥淫熱之疫
(B)吳又可認為「邪由皮毛而入，舍於伏膺之內，附近於胃」
(C)暑燥疫多見於久旱無雨，暑氣亢盛之年
(D)濕熱疫初起病在半表半裏，如病邪外出，可見太陽表證
- 33 38 歲江女士，平素運動量少，易疲倦，長時間說話後有明顯氣虛感，易出汗。昨日外出登山，返家後晚間即自覺身重感，小腿及足部水腫，胃部不適夾有氣逆感。依《金匱要略·痿濕喝病脈證治第二》，下列處方何者最適當？
(A)越婢湯加白朮生薑 (B)麻黃加朮湯加黨參半夏
(C)防己黃耆湯加芍藥桂枝 (D)桂枝附子湯加厚朴蔥白
- 34 依《金匱要略·奔豚氣病脈證治第八》所述：「發汗後，燒針令其汗，針處被寒，核起而赤者，必發奔豚」，下列敘述何者最適當？
(A)肝腎不足導致陽氣不守而上衝 (B)針刺驚恐導致氣衝逆向而上
(C)情志不遂復加針處被寒陽氣鬱滯導致氣逆 (D)汗後心陽不足導致下焦陰寒之氣乘虛上逆
- 35 依《醫宗金鑑·訂正仲景全書金匱要略注》，有關治療胸痹的用方，下列何方有使用附子？
(A)栝蒌薤白半夏湯 (B)人參湯 (C)烏頭赤石脂圓 (D)桂枝生薑枳實湯
- 36 依《金匱要略》所述，下列何者為附子粳米湯的藥物組成？
(A)附子、厚朴、白芍、甘草、粳米 (B)陳皮、甘草、茯苓、附子、粳米
(C)半夏、甘草、附子、大棗、粳米 (D)粳米、附子、白朮、甘草、人參
- 37 依《金匱要略》，下列選項何者為當歸散的藥物組成？①黃芩 ②白朮 ③芍藥 ④熟地
(A)①②④ (B)①②③ (C)②③④ (D)①③④
- 38 依《金匱要略》所述：「心下有痰飲，胸脅支滿，目眩」，治以下列何方最適當？
(A)小青龍湯 (B)澤瀉湯 (C)小半夏加茯苓湯 (D)苓桂朮甘湯

- 39 依《金匱要略·痰飲咳嗽》，假令瘦人臍下有悸，吐涎沫而癲眩，此水也，治以下列何方最適當？
(A)苓桂朮甘湯 (B)吳茱萸湯 (C)五苓散 (D)澤瀉湯
- 40 有關《醫宗金鑑·金匱要略》胃反的敘述，下列何者錯誤？
(A)胃氣無餘，朝食暮吐，變為胃反 (B)胃反嘔吐者，大半夏湯主之
(C)脈緊而澹、其病難治 (D)胃反乃因寒在於下，醫反吐之所致
- 41 依《醫宗金鑑·金匱要略》，虵厥者，以下列何方劑治療最適當？
(A)雞屎白散 (B)蜘蛛散 (C)甘草粉蜜湯 (D)烏梅丸
- 42 依《醫宗金鑑·金匱要略》，有關產後腹痛的敘述，下列何者錯誤？
(A)產婦腹中疔痛，當歸芍藥散主之
(B)產後腹痛，煩滿不得臥，枳實芍藥散主之
(C)產婦腹痛，法當以枳實芍藥散，假令不癒者，此為腹中有乾血著臍下，宜下瘀血湯主之
(D)產後七、八日，無太陽證，少腹堅痛，此惡露不盡，不大便，煩躁發熱，切脈微實，再倍發熱，日晡時煩躁者不食，食則譫語，至夜即癒，宜大承氣湯主之
- 43 依《金匱要略》所述，患者症見眼胞微腫，手足腫脹，按之沒指，惡風，診脈得寸口沉滑。此為下列何者？
(A)風水 (B)皮水 (C)石水 (D)正水
- 44 依《醫宗金鑑·金匱要略》，婦人之病，導致諸經水斷絕，至有歷年，其病因為下列那些最適當？
①虛 ②寒濕 ③積冷 ④鬱熱
(A)①② (B)①③ (C)②③ (D)③④
- 45 關於眩暈之病機相關敘述，下列何者錯誤？
(A)陽虛則易肝風內動，血少腦失所養，導致眩暈
(B)痰濕中阻，濁陰不降，引起眩暈
(C)肝陽上亢或長期憂鬱惱怒，皆可導致眩暈
(D)腎精不足，不能生髓，髓海不足，則發為眩暈
- 46 一位女性患者，脅肋脹痛，走竄不定，生氣時會更加疼痛，常常胸悶不舒，依據病況，下列敘述何者正確？
(A)屬肝氣鬱結之脅痛 (B)屬瘀血停著之脅痛 (C)屬肝膽濕熱之脅痛 (D)屬肝陰不足之脅痛
- 47 有關中風的辨證，下列敘述何者正確？
(A)中經是以半身不遂、口眼歪斜、偏身麻木，言語謇澀而神志不清為主症
(B)中風起病時嗜睡而半身不遂，治後而神志清醒，是先中經而後轉中腑，預後好
(C)中風經治療後，症狀先由中臟轉為中經絡，預後較好
(D)中臟是以肌膚麻木多偏一側、口眼歪斜為主症，病情屬重
- 48 根據明朝李中梓總結《內經》及前哲論述，將不寐分為五種證型，下列何證型宜治以酸棗仁一兩，生地黃五錢，米二台，煮粥食之？
(A)水停 (B)氣虛 (C)痰滯 (D)陰虛，血少心煩
- 49 以心痛性質來辨證，下列何者為臨床最常見的心痛？
(A)悶痛 (B)刺痛 (C)絞痛 (D)灼痛
- 50 有關癲癇之敘述，下列何者錯誤？
(A)羊癇風、胎病均為癲癇的別名
(B)癲癇形成的病因以痰邪作祟最為重要
(C)陽癇發作後到神志恢復的時間較陰癇長
(D)癇證病久，轉為陰癇，治以熄風滌痰瀉火為主
- 51 18 歲女性高中生，學測不幸名落孫山，此後善悲欲哭，神思恍惚，呆若木雞，肢體困乏，面色少華，飲食減少，舌質淡，脈細。下列有關患者證型，何者正確？
(A)痰氣鬱結 (B)虛火內擾 (C)肝鬱氣滯 (D)心脾兩虛
- 52 呃逆俗稱打嗝，古稱為下列何者？
(A)噦 (B)噫 (C)痞膈 (D)暗

- 53 某患者感覺胸脘不舒，痞塞滿悶，心煩易怒，兩脅作脹或時作嘆息，舌苔薄白，脈弦，宜用下列何種方藥治療？
(A)厚朴、枳殼、陳皮、甘草
(B)製半夏、蒼朮、陳皮、厚朴、茯苓、甘草
(C)山楂、神曲、萊菔子、半夏、陳皮、茯苓、連翹
(D)香附、川芎、蒼朮、神曲、山梔子
- 54 17 歲男性，因鼻有臭味前來就診，主述鼻涕膿稠，色黃而臭，微有噴嚏，鼻微塞，視其鼻腔紅腫，伴隨有頭昏脹，夜寐多夢，口苦咽乾，大便每天如廁但大便乾結，舌紅苔黃，脈弦數，其病機為下列何者？
(A)風熱犯肺，上犯清竅
(B)膽移熱於腦，火熱薰灼清竅
(C)濕熱薰灼，上干清竅
(D)髓海空虛，損及於腎
- 55 下列有關於痰飲的敘述，何者正確？
(A)痰惟停積於肺，飲則無處不到
(B)五臟之傷皆能致痰
(C)黏稠者為飲，清稀者為痰
(D)飲多為熱邪所致
- 56 感冒多見兼挾之證，必須詳細辨認，下列何者錯誤？
(A)挾濕者多見於梅雨季節，以身熱不揚，頭脹如裹，骨節疼重，胸悶，口淡為特徵
(B)挾暑者多見於炎夏，以身熱有汗，心煩口渴，小便短赤，苔黃膩為特徵
(C)挾燥者多見於秋季，以身熱頭痛，鼻燥咽乾，咳嗽無痰，口渴舌紅為特徵
(D)挾痰者多見於節日之後，以身熱納呆，胸脘脹悶，泛噁腹瀉苔膩為特徵
- 57 因思慮憂鬱，損傷心脾，病及陽明沖脈。脾胃虛致氣血不足，宗筋失養，而導致的陽痿其病因病機為下列何者？
(A)命門火衰
(B)心脾受損
(C)恐懼傷腎
(D)濕熱下注
- 58 小便不禁，宜辨別虛證的輕重，下列敘述何者屬病重？①有夢而遺尿 ②夜有遺尿而晝有不禁者 ③咳嗽或談笑而不禁者 ④無故不禁者
(A)①②
(B)②③
(C)①③
(D)②④
- 59 有關水腫相關見症與臟腑關係之配對，下列何者錯誤？
(A)心水—心悸怔忡
(B)肝水—脘腹煩悶
(C)腎水—腰膝酸軟
(D)肺水—咳逆喘促
- 60 陳姓 60 歲老翁，煩渴多飲，尿多，舌赤苔黃，善飢，體型消瘦，脈滑數偏細，下列何處方最為對治？
(A)六味地黃丸
(B)白虎加參湯
(C)竹葉石膏湯
(D)清營湯
- 61 下列關於痿證的敘述，何者錯誤？
(A)治痿獨取陽明，純指補益後天
(B)風藥表藥對本病當慎用
(C)痿證臨床上虛證居多，實證較少
(D)虛證之痿，病勢纏綿，短期不易獲效
- 62 關於痺證之敘述，下列何者正確？
(A)關節變形、僵硬者，為著痺，其治當以利濕為主
(B)熱痺因症見汗出、口渴、關節腫痛，故稱白虎病
(C)風邪所致痺證一般多在局部或上肢
(D)體質陰血不足之人易受寒凝，所患痺證多屬寒痺
- 63 李東垣治療風濕頭痛之主方為何？
(A)清空膏
(B)白朮半夏天麻湯
(C)九味羌活湯
(D)川芎茶調散
- 64 有關腰痛、腰酸之敘述，下列何者錯誤？
(A)腰重痛，臥時不能轉身，行時重痛無力者，濕也
(B)日輕夜重，不能動搖者，瘀血也
(C)有形作痛，皮肉青白者，虛寒也
(D)《脈經》認為腰痛脈診的重要部位在於尺部
- 65 中醫依據病邪，侵襲部位、病機、病形而定診斷，下列何者是以病機命名？
(A)水腫
(B)肺癰
(C)百合病
(D)中暑
- 66 某患者因皮膚有搔癢刺痛感來就診，經診察發現病灶局部有密集的尖狀紅色小粒，後乾燥成細小鱗屑，則下列何者較符合本病的表現？
(A)陰斑
(B)麻疹
(C)風疹
(D)疥子

- 67 關於下列形體與病證，何者敘述最適當？
(A)胸如圓桶狀，多為素有伏飲積痰，以致肺氣耗散，或傷及腎氣，致腎不納氣
(B)若胸廓扁平者，多屬心腎陰虛或心血不足之證
(C)若單腹腫大，四肢反瘦，為臌脹，多屬胃腸乾癟，為臟腑精氣衰敗之惡候
(D)腹皮甲錯，著於背而成深凹者，曰脊痞
- 68 某男性患者，經望診發現其齒齦腫脹，局部並有出血，患者感覺疼痛，下列何證型最適宜？
(A)腎虛，虛火上炎 (B)脾虛，脾不統血 (C)胃火，灼傷血絡 (D)肝燥，失於濡潤
- 69 診察舌苔以辨胃氣之有無，主要依據舌苔的那項性質？
(A)苔之厚薄 (B)苔之潤燥 (C)苔之有根無根 (D)苔之偏全
- 70 關於「黃苔」之敘述，下列何者錯誤？
(A)《舌鑒辨正》黃苔見于全舌，為臟腑俱熱，見于某經，即某經之熱
(B)《敖氏傷寒金鏡錄》舌見尖白根黃，其表症已罷，無須解表，可直攻之
(C)《傷寒舌鑒》黃苔者，裏證也，傷寒初病無此舌，邪傳少陽也無此舌
(D)《傷寒指掌》白苔主表，黃苔主裏，太陽主表，陽明主裏，故黃苔專主陽明裏證
- 71 有關小便的診斷，下列敘述何者最適當？
(A)尿臊臭者為熱證 (B)小便頻數者為腎陽虛 (C)腎陽虛者小便必清長 (D)夜尿者為腎陰虛
- 72 臨床若發現一婦人其帶下有腥味，則下列何項最不可能發生此婦人身上？
(A)平日飲食生冷過多 (B)大便水瀉但臭穢 (C)下腹喜熱敷 (D)帶下多而稀
- 73 下列有關頭痛六經分證的敘述，何者錯誤？
(A)太陽經頭痛，痛時後連項背 (B)陽明經頭痛，痛在前額或連眉稜骨等處
(C)太陰經頭痛，頭痛連腦齒、指甲青 (D)厥陰經頭痛，痛在巔頂，牽引頭角
- 74 患者因出現心煩、不眠、咽乾、口燥等症狀求診，醫師診斷是少陰病，偏於陰虛，其最可能出現下列那種脈象？
(A)微脈 (B)弱脈 (C)濡脈 (D)細數脈
- 75 「傷食」、「腸胃積滯」與「脾虛夾食」是食積的三種主要證型，下列敘述何者錯誤？
(A)「腸胃積滯」除了「傷食」症狀外，還可見脘腹痞硬或疼痛拒按
(B)三種證候皆不思飲食
(C)「脾虛夾食」舌苔可不厚膩
(D)三種證候皆腹痛明顯
- 76 有關「濕邪致病」的敘述，下列何者錯誤？
(A)濕阻中焦者，多見胸腹脹滿，飲食不運，渴不欲飲，便溏，四肢困倦，舌苔厚膩，治宜燥濕健脾
(B)濕屬陰邪治宜陽藥，以辛熱之藥為主
(C)濕邪寒化者，多有脾陽不振的基礎，症見腹滿、便瀉，或為痰飲、水腫
(D)濕邪熱化者，多有胃火熾盛的基礎，患者經常過食肥甘
- 77 某 46 歲男性患者外感寒邪後十餘日，今就診時自訴口燥咽乾，易作心煩，夜間不易入睡。問之已無惡風寒，二便平，但見舌尖紅赤，舌邊苔略少，脈細數。若依六經辨證而言，則下列何證最適宜？
(A)太陰虛熱證 (B)少陰寒化證 (C)少陰熱化證 (D)厥陰熱化證
- 78 下列關於六經辨證中「陽明病」之敘述何者錯誤？
(A)本病主要病機為「邪熱亢盛，中氣大傷」
(B)陽明病主症以「身熱汗出，不惡寒反惡熱、煩躁、口渴」為特徵
(C)陽明腑證較陽明經證為重
(D)「熱結腸腑」與否是陽明經證、腑證兩者在病機上的主要區別
- 79 55 歲男性肺結核患者，長期乾咳少痰，音啞，咽乾口燥，形體消瘦，潮熱顴紅，舌紅少津，脈細數，下列診斷何者最適宜？
(A)肺氣虛 (B)肺陰虛 (C)燥邪犯肺 (D)風熱犯肺
- 80 某 63 歲男性職業駕駛，來診時主訴陣發性頻尿已十年，因工作關係經常要憋尿。近年來反覆發作頻尿，發作時感覺下腹有明顯脹熱感，尿急，尿色黃，澀味重，偶排尿不利時尿道口有痛感；舌苔薄乾，舌質稍紅，脈數。請問本病的臨床辨證以下列何者最適宜？
(A)腎陰虧虛 (B)腎氣不固 (C)脾虛下陷 (D)膀胱濕熱