

107 年第二次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段考試、營養師、
心理師、護理師、社會工作師考試、107 年專門職業及技術人員高等考試法醫師、
語言治療師、聽力師、牙體技術師考試、高等暨普通考試驗光人員考試試題

代號：2102
頁次：6-1

等 別：高等考試

類 科：中醫師（二）

科 目：中醫臨床醫學（二）（包括中醫內科學、中醫婦科學、中醫兒科學）

考試時間：1 小時 30 分

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 1 許老先生為慢性心臟衰竭患者，左心室射出率 23%，近 1 個月逐漸出現喘咳、平臥呼吸困難、胸悶心悸、咯痰清稀、肢體浮腫、肢冷、尿少、舌淡胖、脈沉細，治以下列何方最適合？
(A)養心湯 (B)真武湯 (C)金匱腎氣丸 (D)小青龍湯
- 2 王女士平時容易感冒，近因勞累後出現惡寒甚、發熱、無汗、咳嗽、身楚倦怠，苔淡白，脈浮無力等臨床表現，治以下列何方加減最適宜？
(A)參蘇飲 (B)荊防敗毒散 (C)葳蕤湯 (D)麻黃湯
- 3 林先生因罹患慢性鼻竇炎就診，症見反覆涕多黏稠色白、鼻塞不利、食少、倦怠、大便溏軟，舌淡、苔薄白，脈緩無力，治以下列何方最適宜？
(A)溫肺止流丹 (B)丹溪鼻淵方 (C)補中益氣湯 (D)辛夷散
- 4 王小姐咳嗽已多年，而且容易感冒，語音乏力，身倦，舌淡紅偏淡白、薄白苔，脈濡而乏力，治以下列何方最適宜？
(A)百合固金湯 (B)止嗽散 (C)沙參麥冬飲 (D)補中益氣湯
- 5 36 歲吳姓男性患者，來診主訴咳嗽已三月餘，經過數位中醫師和西醫師診療皆效果不佳，經朋友介紹來診，患者自訴咳勢頻又急，咳時牽引右脇疼痛，平時心情抑鬱不舒，痰白量較多，診其苔薄白、有津液，脈弦，處以下列何藥物組成之方劑最適宜？
(A)蘇葉、半夏、茯苓、麻胡、桔梗、枳殼、橘皮、杏仁、大棗、甘草
(B)羌活、藁本、防風、川芎、蔓荊子、獨活、甘草
(C)當歸、炒白芍、白朮、茯苓、柴胡、法半夏、杏仁、旋覆花、紫蘇梗、款冬花、甘草
(D)陳皮、川芎、枳殼、炒白芍、柴胡、川芎、生地、麥冬、前胡、甘草
- 6 45 歲康姓女性患者，乾咳無痰已二個月，今日來診訴說身熱，鼻子乾燥，口渴，心煩，咳嗽氣逆感，咽喉乾燥，舌診苔薄白，乾燥無津，舌邊尖紅赤，脈診虛大數，處以下列何方最適宜？
(A)加減萎蕤湯 (B)清燥救肺湯 (C)沙參麥冬湯 (D)桑杏湯
- 7 83 歲陳先生 1 個多月前急性中風，現今偏廢不仁，患側筋骨痠軟，足難任地，伴見眩暈耳鳴，虛煩失眠，面赤唇紅，舌瘡不語。舌質紅絳苔少，脈弦細數。下列何者錯誤？
(A)此肝腎虧虛，筋骨失養 (B)治法為滋補肝腎，壯筋起痿
(C)中經絡之半身不遂 (D)治以補陽還五湯
- 8 65 歲黃先生長期罹患哮喘，併發肺動脈高血壓及肺心症。就診時症見短氣息促，難以接續，動則為甚，吸氣不利，面色蒼白，形寒肢冷，動則心慌，腰酸腿軟，頭暈耳鳴，遺精早泄，咳逆，痰吐起沫。治法以下列何者最適合？
(A)益氣養陰 (B)補腎攝納 (C)補脾化痰 (D)降氣平喘
- 9 63 歲彭先生罹患高血壓，近因眩暈就診，症見頭重如裹，胸悶噁心，食少多寐，舌苔白膩，脈濡緩。治以下列何方最適宜？
(A)半夏天麻白朮湯 (B)天麻鉤藤飲 (C)歸脾湯 (D)左歸丸
- 10 58 歲男性病患因長期吸菸（2 包/天 35 年）導致右心室心肌梗塞與右心衰竭，面浮身腫，腰以下尤甚，心悸氣短，尿少，四肢厥冷，怯寒神疲，面色灰滯，舌質淡胖、苔白，脈沉遲。治以下列何方最宜？
(A)實脾飲 (B)十棗湯 (C)導水茯苓湯 (D)金匱腎氣丸

- 11 56 歲男性平日下班後經常打牌且常熬夜，身體微胖，面色白晳，有高血壓但常忘按時服藥。某日清晨醒來後發現肌膚不仁，手足麻木，口眼歪斜，口角流涎，肢體拘急、關節痠痛，腦部斷層掃描發現有腦出血，下列敘述何者錯誤？
(A)病因病機為絡脈空虛，風邪入中 (B)證屬中經絡
(C)可治以補氣活血、化瘀通絡 (D)可酌用鉤藤、防風、石菖蒲
- 12 承上題，治以下列何方最適合？
(A)黃耆桂枝五物湯 (B)補陽還五湯 (C)大秦芫湯 (D)地黃飲子
- 13 38 歲吳先生剛從國外旅遊回來，主述出國時常吃生冷食物，回國後開始腹痛腸鳴，腹瀉清稀，脘悶食少，自覺惡寒頭痛，肢體酸痛。自行服用四君子湯後，覺得腹更脹痛，治療改以下列何方最適當？
(A)葛根黃芩黃連湯 (B)藿香正氣散 (C)胃苓湯 (D)理中湯
- 14 25 歲許先生，過完年後來門診，主述過年期間吃了一塊 12 盎司的牛排之後，覺上腹脹滿，打嗝時口中有酸腐味道，大便黏臭，舌苔厚膩、質紅，脈滑，治以下列何方最適當？
(A)保和丸 (B)柴胡疏肝散 (C)平胃散 (D)半夏瀉心湯
- 15 65 歲蔡女士，主述每次吃完東西後不自主會反覆嘔吐，但嘔吐量不多，有時只有乾嘔，口乾，胃中嘈雜，常覺餓但又不想吃東西，舌紅、苔少、少津，脈細數，下列診斷何者最適當？
(A)胃火上炎 (B)濕熱中阻 (C)肝胃不和 (D)陰虛胃熱
- 16 35 歲男性患者至東南亞旅遊，期間飲冷食辣後上腹脹悶不舒。看診時症見發燒約 37.5℃，欲嘔、水瀉日 4-5 行，上腹悶脹痛，因恐懼患 H1N1 流感，故來院門診治療。診其苔白膩、質淡紅，脈浮濡。以下列何方治之最適當？
(A)平胃散 (B)藿香正氣散 (C)香蘇飲 (D)新加香薷飲
- 17 外邪犯胃之胃痛，發病之病因以下列何邪最為常見？
(A)風邪 (B)寒邪 (C)暑邪 (D)濕邪
- 18 37 歲黃小姐有萎縮性胃炎病史，就診時主述胃脘隱痛，乾嘔，無泛酸，口乾，少苔，質絳，脈細數。治以下列何方最適當？
(A)半夏瀉心湯 (B)安中散 (C)香砂六君子湯 (D)益胃湯
- 19 肝硬化屬於臌脹之範疇，下列症狀何者非肝硬化臌脹之常見症狀？
(A)腹部脹大如鼓 (B)蜘蛛痣 (C)皮膚蒼黃 (D)腹內腸鳴
- 20 臨床上黃疸性肝炎，症見婦人傷寒熱入血室，以及瘧疾，黃疸等。以下列何方治之最適宜？
(A)大柴胡湯 (B)茵陳蒿湯 (C)小柴胡湯 (D)柴胡疏肝散
- 21 45 歲謝女士因排尿異常就診，尿液常規檢查正常，但自覺小腹墜脹疼痛，小便淋瀝不暢，溲無灼熱感，口乾而不苦，每因情緒過度波動時病情加重，舌質淡紅，苔薄白，脈弦。證型下列何者最適當？
(A)濕熱下注 (B)脾腎虧虛 (C)肝鬱氣滯 (D)陰虛火旺
- 22 68 歲王先生為耳鳴困擾多年，兩耳蟬鳴，時輕時重，有時耳塞聽力下降，胸悶痰多，口苦，兩脅痛，有梅核氣感，二便不暢，苔薄黃膩，脈弦滑，治以下列何方最適當？
(A)滌痰湯 (B)益氣聰明湯 (C)龍膽瀉肝湯 (D)耳聾左磁丸
- 23 82 歲男性攝護腺肥大患者，主述小便難解、點滴不利，尿畢仍有殘尿感。尿色清澈，解尿時無痛感。患者面色萎黃，腰膝乏力而行走緩慢，胃脘食少，飽食偶發無痰之乾咳，勞動時常有胸悶喘促感，易身倦。觸診患者足部膚冷，脈沉細弱，舌淡紅、苔白。治以下列何方最適當？
(A)五淋散 (B)越婢加朮湯 (C)濟生腎氣丸 (D)萆薢分清飲
- 24 《丹溪心法·腰痛》把發病原因分為五種，其中以下列何者最重要？
(A)濕熱 (B)瘀血 (C)腎虛 (D)痰積
- 25 紅斑性狼瘡患者發病期若見煩躁不眠，全身肌肉關節疼痛，口渴喜冷飲，目赤唇紅，口舌生瘡，少苔，舌紅絳，脈細數，治以下列何方最適當？
(A)銀翹散 (B)涼膈散 (C)六味地黃丸 (D)玉女煎

- 26 68 歲林先生，反覆口腔潰瘍及生殖器潰瘍，下列敘述何者錯誤？
(A)若合併有關節疼痛，眼病變及皮膚病變，可以診斷為貝塞氏症（Behcet's disease）
(B)金匱要略惑之為病，蝕於喉為狐，蝕於陰為惑，不欲飲食，惡聞食臭，其面目乍赤、乍黑、乍白
(C)蝕於上部者，甘草瀉心湯主之，蝕於下部者，苦參湯洗之，蝕於肛者，雄黃熏之
(D)甘草瀉心湯之組成中含有黃連、乾薑
- 27 46 歲郭女士因手部關節不適，經治療 3 個月後，手部關節仍不適，症見身倦，肌膚麻木，肢體關節重著，苔白膩，脈濡。治以下列何方最適當？
(A)身痛逐瘀湯 (B)薏苡仁湯 (C)獨活寄生湯 (D)當歸拈痛湯
- 28 下列有關痹證之敘述，何者錯誤？
(A)風氣勝者為行痹，寒氣勝者為痛痹，濕氣勝者為著痹
(B)關節灼熱紅腫，發熱口乾，舌紅，苔黃燥，脈滑數，可選用白虎桂枝湯
(C)久痹不癒，肢體倦怠，腰脊冷痛，舌淡，苔白，脈細，為濕困經絡，可選用羌活勝濕湯
(D)紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎、乾燥症皆可能出現痹證
- 29 68 歲陳先生男性左膝腫脹疼痛反覆作已一、二十年，骨科檢查為退化性關節炎，抽血可見 RF < 20，ESR:16，Anti-CCP:-，就診時症見關節腫大變形，屈伸不利，舌有瘀點、斑塊，苔白膩，脈澀，治以下列何方最適當？
(A)薏苡仁湯 (B)烏頭湯 (C)蠲痹湯 (D)身痛逐瘀湯
- 30 下列有關痹證的敘述何者錯誤？
(A)痹證是由風、寒、濕、熱等外邪侵襲人體，閉阻經絡，氣血運行不暢所導致
(B)以肌肉、筋骨、關節發生疼痛、麻木、重著、屈伸不利或關節腫大灼熱為主要表現
(C)古代醫書中，有因疼痛常於夜間發作或痛如虎咬，而稱為白虎歷節之名，和現代醫學的痛風急性發作症狀相似
(D)古代醫家對痹證最早的論述，可見於東漢張仲景之《金匱要略》
- 31 42 歲王女士診斷出甲狀腺腫大，頸前腫塊光滑柔軟，易胸悶，喜太息，腫塊隨情緒波動而變化，脈弦，下列何者診斷最適當？
(A)氣鬱痰阻 (B)肝火亢盛 (C)心肝陰虛 (D)痰結血瘀
- 32 承上題，下列處方何者最適當？
(A)散腫潰堅湯 (B)天王補心丹 (C)梔子清肝湯 (D)四海舒鬱丸
- 33 32 歲陳小姐近日診斷出甲狀腺機能亢進，就診時症見緊張時明顯心悸不舒，心煩，眠差，目眩，手顫，舌紅、少苔，脈弦細數，下列何者證型診斷最適當？
(A)氣鬱痰阻 (B)肝火亢盛 (C)心肝陰虛 (D)痰結血瘀
- 34 48 歲陳姓女教師，近日發現血壓偏高約 155/85mmHg，因教書壓力大，時常急躁易怒，血壓偏高時伴隨頭痛目赤、頭部烘熱感，舌紅苔黃，脈弦。下列診斷何者最適當？
(A)肝鬱氣滯 (B)肝鬱化火 (C)肝風上擾 (D)肝腎陰虛
- 35 承上題，下列處方何者最適宜？
(A)龍膽瀉肝湯 (B)柴胡疏肝散 (C)知柏地黃丸 (D)天麻鉤藤飲
- 36 22 歲陳女甲狀腺腫柔軟，心煩易怒，面部烘熱，口苦，多汗，舌紅苔黃，脈弦數，治以下列何方最適宜？
(A)梔子清肝湯合藻藥散 (B)一貫煎合海藻玉壺湯
(C)四海舒鬱丸合溫膽湯 (D)知柏地黃丸合二陳湯
- 37 43 歲陳女士，主訴因家庭因素導致兩星期來輾轉難眠。伴隨有心煩，心悸，頭暈，耳鳴，腰背痠等症狀。食慾可，口乾但不苦，大便一日一行。望其舌質微紅，舌苔薄白稍乾，脈細數，觸之掌心微發熱。治以下列何方最適當？
(A)歸脾湯 (B)黃連阿膠湯 (C)溫膽湯 (D)安神定志丸
- 38 王先生突然中風，意識不清，四肢癱軟，大小便失禁，脈細微弱，電腦斷層顯示中大腦動脈大量出血，治以下列何處方最適當？
(A)局方至寶丹 (B)安宮牛黃丸 (C)蘇合香丸 (D)參附湯

- 39 中風，下列有關歷代醫家對中風病因學說之敘述，何者錯誤？
(A)唐宋以前醫家多以內風立論 (B)王履提出真中風與類中風之論點
(C)張景岳提出了中風非風的論點 (D)李中梓將中風明確區分為閉、脫兩證
- 40 72 歲女性患者近日突然小便量極少，其色黃赤，不思飲食，腰膝酸軟無力，倦怠乏力，苔薄黃膩而乾燥，脈細數。診斷以下列何證型最適合？
(A)肝膽濕熱 (B)陰虛濕熱 (C)氣陰兩虛 (D)濕阻中焦
- 41 腦中風之病因病機下列何者最少見？
(A)痰 (B)飲 (C)風 (D)瘀
- 42 下列有關便秘之敘述，何者錯誤？
(A)平素喜食辛辣厚味，煎炒酒食者，多致腸胃積熱而成熱秘
(B)大便乾硬者，多屬氣虛秘或冷秘
(C)便秘古有便閉、陰結之稱
(D)張景岳認為此證當辨者惟二，乃陰結與陽結
- 43 肺癌患者常見呼吸困難，動則喘甚，精神疲憊，形體消瘦，自汗出，手足不溫，腰膝痠軟，苔白滑，脈沉弱。治以下列何方最適當？
(A)止嗽散 (B)定喘湯 (C)金匱腎氣丸 (D)三子養親湯
- 44 46 歲王先生罹患胃癌，就診主訴近幾天胃脘灼熱疼痛，痛勢急迫，煩躁易怒，泛酸嘈雜，口乾口苦，舌紅、苔黃，脈弦數，證型以下列何者最適當？
(A)胃陰虧虛 (B)脾胃濕熱 (C)肝胃鬱熱 (D)飲食積滯
- 45 65 歲汪先生罹患膀胱癌，近出現血尿就診，症見小便短赤帶血，頭暈，耳鳴，神疲體倦，腰膝痠軟，顴紅潮熱，舌紅，脈細數，治以下列何方最適當？
(A)知柏地黃丸 (B)小蓴飲子 (C)無比山藥丸 (D)歸脾湯
- 46 61 歲黃先生罹患胃癌而長期接受化學治療，主述平時胃口不開，飲食不暢，近來常會有突然昏倒，不省人事，四肢厥冷的現象，又見面色蒼白，呼吸微弱，舌質淡，脈沉微。證型以下列何者最適當？
(A)氣厥實證 (B)氣厥虛證 (C)血厥實證 (D)血厥虛證
- 47 58 歲謝女士罹患肺癌並接受化療中，主述平時易疲勞，短氣自汗，聲音低怯，易外感，畏風，面色白，舌質淡，脈弱。治以下列何方最適當？
(A)百合固金湯 (B)金匱腎氣丸 (C)理中湯 (D)補肺湯
- 48 57 歲劉女士因第三期胃癌切除三分之二的胃部，在化學治療期間發作噁心嘔吐，食不下咽，胸口悶，身體劇瘦，語音低微，不欲多言，面色蒼白，肢冷畏寒。治以下列何方最適當？
(A)沙參麥冬飲 (B)益胃湯 (C)橘皮竹茹湯 (D)香砂六君子湯
- 49 依《校注婦人良方》，婦人勞損「不嗜食」的原因，下列何者正確？
(A)肝腎陰虧 (B)心病不能養脾 (C)脾肺氣虛 (D)虛不能納氣
- 50 張山雷不贊同以膠艾湯治療血崩，其原因為其中那味藥物過度辛溫助動的緣故？
(A)當歸 (B)川芎 (C)艾葉 (D)香附
- 51 依《傳青主女科》，下列何者錯誤？
(A)「經前腹痛數日，而後經水行者，其經來多是紫黑塊」，宜宣鬱通經湯
(B)「少腹疼於行經之後者」，宜調肝湯
(C)「經水將來三五日前而臍下作疼，狀如刀刺者，或寒熱交作，所下如黑豆汁」，宜溫經湯
(D)「經未行之前一二日忽然腹痛而吐血」，宜順經湯
- 52 24 歲女性，月經前易衄血，色紅量多，容易煩躁與口苦咽乾，頭暈耳鳴，舌紅苔黃，脈弦數，對此病患之診治，下列何者最為恰當？
(A)宜以熱者清之與逆者平之為治療大法 (B)為肺腎陰虛，虛火上炎，損傷肺絡而衄血
(C)治療需滋陰潤肺與清熱涼血 (D)可用《傳青主女科》健固湯治療

- 53 34 歲王女，出現經期大便溏泄，經量多且色淡質稀，身倦無力、面目浮腫，舌淡苔白、脈濡緩，關於此病患之診療，下列何者最不恰當？
(A)病機為脾氣虛弱
(B)可以白扁豆、人參、白朮、茯苓、甘草、蓮子肉、山藥、桔梗、苡仁、縮砂仁等藥組方治療
(C)若其瀉前必腹痛，且瀉後痛止挾噯氣不舒，為肝旺侮土
(D)若出現鴨溏清徹冷痛且畏寒肢冷，宜香砂六君子湯治療
- 54 有關崩漏血熱型的病因病機，下列敘述何者錯誤？
(A)陰虛肝旺，或平素體質陽氣亢盛
(B)過食溫熱，辛辣食物
(C)精神激動，怒氣傷肝
(D)平日思慮過多，傷於心脾
- 55 有關婦女「更年期」之敘述，下列何者錯誤？
(A)月經將絕未絕，為腎氣漸衰的過渡時期
(B)從能夠生育到不能生育的過渡時期
(C)經水一月經行一度必有氤氲之時
(D)七七任脈虛，太衝脈衰，天癸漸竭之候
- 56 22 歲陳小姐帶下量多水樣綿綿不止，腰酸如折，小腹悶脹，夜尿頻數，脈沉細。治以下列何方最適宜？
(A)完帶湯
(B)當歸芍藥散
(C)八味帶下方
(D)桂附八味丸
- 57 根據《景岳全書·婦人規》，下列何者為婦人瘀血留滯作癥之原因？①積勞積弱 ②內傷生冷 ③外受風寒
(A)僅①②
(B)僅①③
(C)僅②③
(D)①②③
- 58 造成「子腫」的病機，下列何者最不常見？
(A)氣滯
(B)痰凝
(C)脾虛
(D)腎虛
- 59 下列何者為婦人「臟躁」的症狀？①精神憂鬱 ②情志煩亂 ③哭笑無常 ④呵欠頻作
(A)僅①③
(B)僅②④
(C)僅①②③
(D)①②③④
- 60 下列有關妊娠疾患的敘述，正確的有幾項？①妊娠三個月以後，胎兒已成形而墜者，稱為「墮胎」 ②懷孕初期出現陰道少量出血，但無腹痛者，稱為「胞漏」 ③小產連續發生三次或三次以上者，稱為「滑胎」 ④妊娠腹痛，稱為「胞阻」
(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4
- 61 患者產後惡露過期不止，淋漓不爽，且量少，其色紫黯有塊，小腹疼痛，按之不舒。望其舌質紫黯，脈沉實有力。下列何者最宜治療此病患？
(A)人參、白朮、黃耆、升麻、陳皮、當歸、柴胡、鹿角膠、艾葉炭、炙甘草
(B)當歸尾、赤芍、地龍、川芎、紅花、桃仁、黃耆
(C)當歸、川芎、桃仁、炮薑、益母草、炒地榆、炙甘草
(D)生地、熟地、白芍、山藥、續斷、黃芩、阿膠、旱蓮草、烏賊骨、甘草
- 62 下列關於乳癰之敘述，何者正確？
(A)乳癰最早見於晉代記載，隋代便提出了乳汁蓄積是產生乳癰的重要病機
(B)依《外科正宗》謂：內吹，因胎氣旺而上衝，致少陽乳房結腫
(C)乳癰之病多為肝鬱胃熱之實證，臨床治療應先清胃熱，再疏肝理氣，以防乳汁鬱積
(D)外吹乳癰較內吹乳癰發展慢，收口亦難
- 63 某患者產後有輕微外感，周身關節疼痛，屈伸不利，疼痛劇烈，宛如錐刺，見其舌淡，苔薄白，脈細緩，最適宜以下列何方治療？
(A)獨活寄生湯
(B)麻黃湯
(C)柴葛解肌湯
(D)羌活勝濕湯
- 64 《醫學衷中參西錄》記載之壽胎丸的藥物組成中不包括下列何者？
(A)菟絲子
(B)黨參
(C)續斷
(D)桑寄生
- 65 治療痘疹用溫補學派的創始人為下列何者？
(A)陳文中
(B)錢乙
(C)萬全
(D)薛己
- 66 所謂「稚陰稚陽」，在說明小兒生理的體質為何？
(A)純陽
(B)臟氣清靈
(C)生機蓬勃，發育迅速
(D)臟腑嬌嫩，形氣未充

- 67 關於小兒肺炎喘嗽之敘述，下列何者錯誤？
(A)「肺炎喘嗽」一名最早見於清朝《謝玉瓊麻科活人全書》
(B)以清脾益肺、清熱解毒為主要治療原則
(C)以風熱閉肺最為常見
(D)正虛邪戀可見陰虛肺熱或肺脾氣虛
- 68 依《醫宗金鑑·幼科雜病心法要訣》，疳證門方劑「肥兒丸」的組成，下列何者錯誤？
(A)黃連 (B)蓮肉 (C)使君子 (D)胡黃連
- 69 依據《醫宗金鑑·幼科雜病心法要訣》，驚風八候為搐、搦、掣、顫、反、引、竄、視。其中「竄」的意思是：
(A)肘臂伸縮 (B)肩頭相撲 (C)目直似怒 (D)手足動搖
- 70 有關夏季熱的敘述，下列何者正確？①發育營養較差者，或病後失調氣陰不足者易患本病 ②如一般暑邪致病而入營入血的傳變規律 ③病屬暑傷肺胃者，治以王氏清暑益氣湯 ④秋涼後多能自癒
(A)①②③ (B)①③④ (C)②③④ (D)①②④
- 71 吳小妹妹，今年 3 歲半，上週開始家屬發現眼瞼水腫，繼而四肢、全身水腫，皮膚光亮按之凹陷即起，小便少併有發熱、肢體痠痛，苔薄白，脈浮，下列治療何者最適宜？
(A)麻黃連翹赤小豆湯 (B)三妙丸合導赤散 (C)真武湯 (D)溫膽湯合附子瀉心湯
- 72 疫痢毒邪內閉出現的症狀，包括下列何者？①突然壯熱，煩躁譫妄 ②抽風，反覆驚厥 ③汗出不溫，脈細數無力 ④惡心嘔吐，神志昏迷
(A)①②③ (B)②③④ (C)①②④ (D)①③④
- 73 疳腮，輕微發熱惡寒，一側或二側耳下腮部漫腫疼痛，咀嚼不便，或有咽紅，舌苔薄白或淡黃、質紅，脈浮數。此病程階段，下列治法何者不適當？
(A)疏風清熱 (B)散結消腫 (C)涼營解毒 (D)外治調敷
- 74 關於小兒吐血，根據《醫宗金鑑·幼科雜病心法要訣》，下列敘述何者錯誤？
(A)吐血不咳嗽者，宜以麻杏石甘湯主之
(B)勞傷吐血兼咳嗽者，先用桃仁承氣湯以破逐之，次用加味四物湯和之
(C)勞傷吐血者兼咳嗽，痰中帶血有熱者，雞蘇散主之
(D)勞傷吐血者兼咳嗽，無熱者，救肺散主之
- 75 8 歲沈小妹妹，紫癍反覆出現，癍點、癍斑色淡紫，證見精神萎軟，神倦乏力，畏風怕冷，四肢欠溫，腰酸足軟，面色蒼白，舌淡，脈弱，治以下列何方最適宜？
(A)歸脾湯 (B)人參養榮湯 (C)大補陰丸 (D)全鹿丸
- 76 依《醫宗金鑑·幼科雜病心法要訣》瀉證門，內熱或傷暑，暴注下迫腹痛疼，煩渴瀉黃小便赤，其證屬火瀉，以下列何法何方治療？
(A)先用香薷飲清其暑，再用四苓湯利其水 (B)先用新加香薷飲清其暑，再用豬苓湯清其熱
(C)先用清熱甘露飲利其水，再用四苓湯清其熱 (D)先用玉露散清其熱，再用四苓湯利其水
- 77 依《醫宗金鑑·痘疹心法》，麻疹若毒熱內攻金氣受尅，出現喘急者，其治療以下列何方最適宜？
(A)麻杏石甘湯 (B)清氣化毒飲 (C)柴胡清熱飲 (D)三黃石膏湯
- 78 下列何者不包含在五軟之中？
(A)口軟 (B)筋軟 (C)肌肉軟 (D)手軟
- 79 依《醫宗金鑑·幼科雜病心法要訣》，有關小腸氣的治療，下列何者正確？①引腰而痛者，烏頭桂枝湯溫散之 ②痛而衝心氣者，加味失笑散主之 ③少腹中有形如卵，上下往來，痛不可忍者，宜胡蘆巴丸主之
(A)僅①② (B)僅①③ (C)僅②③ (D)①②③
- 80 有關兒童腦膜炎 (meningitis) 的敘述，下列何者錯誤？
(A)發燒、頭痛、嘔吐是典型症狀
(B)病原可能是細菌、病毒、黴菌、立克次體、原生蟲感染
(C)眼底鏡檢查時發現視乳突水腫表示腦壓增加
(D)有腦壓增加狀況時要立即做脊髓穿刺以降腦壓