

112年第一次專門職業及技術人員高等考試醫師牙醫師中醫師藥師考試分階段考試、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師考試

代 號：3318

類科名稱：中醫師(二)

科目名稱：中醫臨床醫學(三)(包括中醫外科學、中醫傷科學、中醫五官科學)

考試時間：1小時30分鐘

座號：_____

※注意：本試題禁止使用電子計算器

※本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當答案。

1.有關清代中醫外科學的著作發展，下列著作何者是集各家所說於一爐？

- A.醫宗金鑑·外科心法要訣
- B.外科精義
- C.外科理例
- D.外科準繩

2.下列有關中醫外科開刀法的敘述，何者錯誤？

- A.除了特殊情況，切口避免橫斷切法
- B.一般瘡瘍，宜循經直開，刀頭向下，免傷血絡
- C.乳部宜放射形切開，免傷乳囊
- D.手指膿腫，從側方切開，免傷伸屈功能

3.關於風疽之敘述，下列何者錯誤？

- A.生於脛骨及曲凹之處
- B.癢搔皮損，津黃汁極其黏稠
- C.可因風濕之氣搏於血脈，鬱滯阻塞而成
- D.外用如聖金刀散

4.關於大小腸癰，下列敘述何者正確？

- A.初起疼痛，小便不利，不發寒熱者險
- B.已成小腹腫而堅硬，小便數而不利者輕
- C.已潰時時下膿，裏急後重，日夜無度，疼痛不減者，將癒
- D.潰後膿腥臭穢或流敗血濁液，虛弱更增而不進飲食者，死候

5.牙癰生齒盡頭者，又名下列何者？

- A.托腮癰
- B.銳毒
- C.穿牙毒

D.牙齦癰

6.厲癰生足背兩旁，足趾之側，下列有關證治，何者正確？

A.若紅腫熱痛，潰破有膿，腐脫無黑氣，為險證難治

B.若微紅微腫，潰出膿水，凝結不能化膿，為順證易治

C.若黑暗漫腫，痛不潰膿，煩熱作渴，小水淋漓，為善證易治

D.若色黯不痛，可用桑柴烘法，內服十全大補湯兼桂附地黄丸

7.生於牙縫齦肉上，由胃經火毒引起，若失治可成穿牙毒，下列何者正確？

A.水蛇頭

B.蛇背疔

C.蛇腹疔

D.牙疔

8.依《中醫外科講義》，赤白遊風滯於血分者，則發赤色，滯於氣分者，則發白色，初期俱宜用下列何方疏解之？

A.浮萍丸

B.四物消風飲

C.補中益氣湯

D.荊防敗毒散

9.有關紫白癰風，色紫者多起因於血滯，色白者大多起因為何？

A.血虛

B.氣滯

C.血熱

D.風寒

10.下列何種疾病，在手掌出現紫色斑點，類似西方醫學二期梅毒的表現？

A.花斑癬

B.痼瘡

C.旋指疔

D.鵝掌風

11.依《中醫外科講義》有關黃水瘡的敘述，下列何者錯誤？

A.初起時如粟米大小，搔癢抓破流出黃水，浸淫成片，隨處可生。治宜祛風涼血清熱藥內服

B.熱甚者，可用青蛤散外敷

C.濕盛者，可用碧玉散外敷

D.痂厚者，可以清水洗之

12.張先生感冒後腰間出現帶狀疱疹，皮疹顏色淡，疱疹鬆弛，腹脹，食欲不佳，舌淡苔白膩，脈沉緩，下列處方何者最適合？

A.除濕胃苓湯

B.龍膽瀉肝湯

C.柴胡清肝湯

D.四妙散

13.關於黧黑斑的病因，下列何者最適當？

A.火鬱於孫絡之血分，風邪外搏而發

B.熱體風邪濕氣，侵入毛孔，與氣血凝滯，毛竅閉塞而成

C.平素血燥，過食辛辣厚味，以致陽明胃經濕熱受風而成

D.憂思抑鬱，血虛不華，火燥結滯而生

14.下列疾病何者非生發於小腿？

A.爛腿

B.癩瘡

C.臙瘡

D.風疽

15.有關奶癬的敘述，下列何者正確？

A.不具傳染性

B.面上風癬，婦人多有之

C.好發於乳房

D.亦名桃花癬

16.外痔初起時，肛門重墜、熱痛、發癢，大便燥結者，內服下列何方劑最適當？

A.消痔止痛方

B.活血補中湯

C.聖愈湯

D.枯痔散

17.有關石瘰的敘述，下列何者錯誤？

A.生於結喉正中附近

B.近似西方醫學的甲狀腺囊腫

C.因情志內傷、肝脾氣逆所致

D.多見於40~70歲的人

18.疳瘡若因男子慾念萌動，淫火猖狂，未經發泄，以致敗精濁血，留滯中途結而為腫。症見淋漓溲溺澀痛，次流黃濁敗精，陽物漸損者，以下列何方劑內服治療最適當？

A.鳳衣散

B.八正散

C.旱螺散

D.礪砂散

19.婦女陰戶外部生瘡，初癢如蟲行，酸麻徹骨，漸至焮腫異常。除內服方劑之外，亦可外用薰洗，外用薰洗以下列何藥最適宜？

A.九龍丸

B.蘆薈丸

C.濕癢湯

D.銀杏散

20.有關評估燒傷面積和深度的方法，下列敘述何者正確？


A.手掌法，是以傷員五指張開時的手掌面積占其全身體表面積的1%進行燒傷面積估算

B.九分法，是將全身體表面積分為11個9等分，其中雙上肢為 $2 \times 9\%$ ，而雙下肢包括臀部則為 $5 \times 9\% + 1\%$

C.兒童燒傷計算法，年齡越小，頭部與下肢體表面積越大，而上肢體表面積越少

D.燒傷深度計算法，若採用三度四分法，即為Ⅰ度、Ⅱ度和淺Ⅲ度、深Ⅲ度燒傷

21.依附圖所示之大腿伸肌群，下列何者正確？



A.17為內收長肌

B.27為半腱肌

C.19為熊足

D.18為縫匠肌

22.下列何者非屬惱人三重傷（unhappy triad）或名膝關節三聯症？


A.內側副韌帶

B.內側半月軟骨

C.前十字韌帶

D.外側副韌帶

23.依附圖所示，下列敘述何者錯誤？



A.此為檢查踝關節外側不穩定

B.前距腓韌帶會被影響

C.跟腓韌帶會被影響

D.後脛腓韌帶會被影響

24.下列何者不是外踝扭傷常見的三條韌帶？

A.前距腓韌帶

B.跟腓韌帶

C.深距腓韌帶

D.後距腓韌帶

25.56歲病人主訴左腳穿拖鞋容易掉下，但是其他手脚無力狀況沒有發生過。有關足背屈無力之相關敘述，下列何者正確？

A.薦1、2為負責之神經

B.脛骨前肌有相關

C.內收大肌也相關

D.內收長肌位於最深層

26.腕隧道症候群常引起手指麻痛乏力，主要是因為何者在腕隧道中受壓？

A.橈動脈

B.拇長屈肌腱

C.橈神經

D.正中神經

27.老人家的骨關節炎，在遠端指骨間關節背面與側面常有可觸摸到的骨性結節，稱之為何？

A.Bouchard's node

B.Boutonniere deformity

C.Swan-neck deformity

D.Heberden's node

28.一名38歲搬家工人，長年雙肩背重物，最近發現上臂難以高舉，且推牆時，肩胛骨有如翅膀狀突出，極可能是何束肌肉無力引起？

A.前鋸肌（serratus anterior）

B.提肩胛肌（levator muscle of scapula）

C.肩胛下肌（musculus subscapularis）

D.大圓肌（teres major muscle）

29.關於肚臍是那個神經機能階層的分界點？

A.T9-T10

B.T10-T11

C.T11-T12

D.T12-L1

30.關於髂腰肌肌力測試的方法，下列敘述何者錯誤？

A.病患採坐姿，雙腿自然下垂於床緣呈懸空狀

B.檢查者固定受檢者的髂嵴以穩定其骨盆

C.請受檢者抬高大腿並離開床面

D.檢查者對受檢者大腿近鼠蹊部施予對抗力

31.有關慢性腰痛의 病因病機約可分為三類：外感風寒濕邪、內傷腎之精氣、外傷筋骨血脈等，下列何者正確？

A.長期負荷過重引起脊椎病理性骨折

- B.慢性炎症引起椎間盤突出
- C.姿勢不良引起後天性脊椎側彎
- D.更年期障礙引起尿路結石

32.患者出現肩外側疼痛，且放射至三角肌，同時靜態下三角肌前緣有一個囊性腫塊，關於此患者之診斷，下列何者最適宜？

- A.肱二頭肌長頭腱鞘炎
- B.肱二頭肌肌腱斷裂
- C.肩峰下滑囊炎
- D.肩關節周圍炎

33.一位30歲木工長期勞動，近1個月出現勞累後手肘外側疼痛，扭轉毛巾時感到疼痛乏力，休息時則無特殊不適，關於此患者之診斷，下列何者最適宜？

- A.肱骨外上髁炎
- B.俗稱高爾夫球肘
- C.鷹嘴滑囊炎
- D.俗稱牽拉肘

34.30歲女性於昨日摔倒，當時手掌著地，就診時檢查發現腕關節尺側腫脹，旋轉動作加重疼痛，關於其診治之敘述，下列何者最不適宜？

- A.受傷部位可能是腕三角纖維軟骨
- B.損傷初期應固定腕關節於功能位4至6週
- C.月狀骨無菌性壞死，其壓痛點多在陽谷穴，可作為鑑別
- D.若發現尺骨小頭移動度增加，可能是下尺橈關節韌帶斷裂

35.關於橈骨莖突腱鞘炎之診斷與治療，下列敘述何者最不適宜？

- A.橈骨莖突部有外展拇長肌腱與伸拇短肌腱的共同腱鞘，為病變所在
- B.理學檢查時常見Tinel試驗為陽性
- C.針灸可以陽谿穴為主穴
- D.方藥可選桂枝湯加當歸、何首烏、威靈仙


36.關於腱鞘囊腫之敘述，下列何者最不適宜？

- A.內含凝膠的液體
- B.古稱筋聚、筋結
- C.部分可能自行消散
- D.屬細胞變異增生性的腫瘤

37.關於手指傷筋之鑑別，下列敘述何者最適宜？


- A.固定患指中節，如患者無法屈遠側指間關節，是屈指淺肌腱斷裂
- B.固定患指外其他三指於伸直位，如無法屈患指近側指間關節，是指伸肌腱斷裂
- C.末節手指下垂屈曲，不能自動伸直，為蚓狀肌受損
- D.中央束斷裂，遠側指間關節可能反被側韌束拉成過伸畸形

38.在門診中進行如下之理學檢查：指導患者握拳，將拇指掩藏於其他手指內部。然後醫師以一手固定其前臂，並用另一手將其腕部偏向其尺側，結果導致患者橈骨莖突附近痛劇。如圖依據以上資訊，下列敘述何者正確？①此檢查通常用於佐證橈骨莖突狹窄性腱鞘炎 ②此檢查之名稱為Phalen's test ③該患者之患病原因較大可能是因腕部長期過度使用所致 ④陽池穴常有明顯壓痛



- A.①②
- B.①③
- C.②④
- D.③④

39.手麻患者經檢查已排除頸椎病變，其右手掌顯示異狀如下圖白圈處，關於該臨床表現，下列敘述何者最適宜？



- A.拇指外展無力

B.此為橈神經病變

C.常併見爪狀手變形

D.手部理學檢查Tinel試驗陽性最可能

40.關於橈骨莖突狹窄性腱鞘炎，下列何者正確？①患者多見有急性外傷史 ②與外展拇長肌（*musculus abductor pollicis longus*）及伸拇短肌（*musculus extensor pollicis brevis*）有關 ③Finkelstein's test通常為陽性 ④抗阻力伸腕試驗通常為陽性

A.①②

B.②③

C.③④

D.①④

41.關於橈骨與其相關肌肉的敘述，下列何者正確？

A.依《醫宗金鑑·正骨心法要旨》橈骨為肱骨，又名肱膊骨

B.肱二頭肌起於橈骨頭，終點橈骨粗隆和肱二頭肌腱膜到前臂的筋膜

C.Yergason test主要測試肱二頭肌短頭肌腱的穩定性

D.依《醫宗金鑑·正骨心法要旨》橈骨骨折時內服四物湯

42.30歲男性喜歡重訓，近1個月出現胸腹痛悶的症狀，根據《醫宗金鑑·正骨心法要旨》中有關於胸腹痛悶的治療，下列敘述何者正確？

A.如果出現胸腹怕被手摸到的症狀，證型為肝經血滯，可用桃仁承氣湯治療

B.如果出現胸腹不利，食慾減退睡眠變差，證型為脾氣鬱結，可用四君子湯治療

C.如果出現胸脅悶痛，身體發熱，證型為肝經血傷，可用加味逍遙散治療

D.如果出現胸腹喜歡手摸按的症狀，證型為肝火傷脾，可用六君子湯加青皮治療

43.35歲男性在浴室滑倒，頭部枕骨處撞到浴缸，倒臥失去意識，緊急送醫後，在急診室恢復意識，但頭暈目眩噁心不欲飲食，依《醫宗金鑑·正骨心法要旨》下列敘述何者正確？

A.枕骨傷損可內服正骨紫金丹，外敷萬靈膏，洗以海桐皮湯

B.枕骨的古名為旋臺骨

C.枕骨傷損，可能有耳鳴，項強咽直，坐臥不安，四肢無力等症狀

D.撞到枕骨昏迷不省人事，少時或明者，其人不可治

44.45歲男性，約5年前於位在山上的家中摔倒並撞傷膝蓋，當時經休養後雖大致痊癒，但之後每逢天冷潮濕時總覺膝蓋痠痛難忍，且活動較為不順，甚至略感麻木，但可以透過熱敷舒緩症狀。根據以上描述，治以下列何方最適宜？

A.獨活寄生湯

B.柴胡疏肝散

C.和營止痛湯

D.黃連解毒湯

45.關於傷後發熱中「邪毒熱」之論述，下列何者正確？

A.證見發熱、惡寒、頭痛、全身不適、苔白微黃、脈浮數時，最合適之方劑為仙方活命飲

B.若患者出現腹部脹痛拒按，腹壁板硬、腹部反彈疼痛之表現，應考慮鑑別急腹症

C.若出現煩躁不安，神昏譫語，此為火毒傷肝之表現

D.若毒邪壅於肌膚積瘀成膿時，可見局部皮膚紅腫灼熱疼痛，可用犀角地黃湯消腫潰堅

46.關於損傷疼痛的辨證診斷，下列何者正確？

A.血瘀痛：脹痛為主，疼痛走竄，痛無定處。咳嗽、呼吸、解大小便閉氣時，可使疼痛加重

B.寒濕痛：痛處固定於損傷、腫脹之處，不走竄，刺痛，痛處拒按

C.骨傷疼痛：深層且劇烈的疼痛，或深部的震動疼痛

D.傷筋痛：疼痛逐漸開始，陰雨天發作或加重，喜熱畏冷，得熱則減

47.依《醫宗金鑑·正骨心法要旨》，傷損之外挾表邪者，其脈證各為何？

A.弦緊；寒熱往來

B.沉滑；四肢厥冷

C.浮緊；發熱體痛

D.滑數；發熱煩渴

48.有關胸部內傷的敘述，下列何者錯誤？

A.胸部遭受外力擊打時，要先排除是否有肋骨骨折

B.患處腫痛、青紫、壓痛部位固定，咳喘疼痛加重，偶痰中帶血，多屬傷血型

C.胸部、脅肋部遭受外力擊打，導致患者呼吸困難逐漸加重，要儘快確認是否有氣胸情況

D.氣胸的理學檢查：傷側呼吸運動減低、呼吸音減弱、叩診濁音

49.關於股骨順轉子間型骨折敘述，下列何者正確？

A.骨折近端外展、外旋

B.骨折線自小轉子斜向外下方

C.屬於不穩定骨折

D.若股骨上端保持完整，髁則明顯內翻

50.35歲女性跌倒右手掌著地，右手背腫脹瘀青疼痛明顯就醫，X光如附圖所示，下列敘述何者正確？



- A.X光顯示右手第四第五掌骨幹骨折
- B.確認骨折處位移與成角程度，需再拍攝手部側位（lateral view）X光檢查
- C.該處骨折常因骨間肌與屈指肌牽拉使骨折向掌側成角
- D.該處骨折一般需固定4~6週
- 51.關於腕舟狀骨骨折，下列敘述何者最適宜？
- A.腕舟狀骨骨折通常因直接暴力造成
- B.腕舟狀骨骨折時按壓陽谿穴可能有明顯壓痛
- C.如果懷疑腕舟狀骨骨折，當下拍攝X光可馬上確定或排除骨折
- D.腕舟狀骨血液供應充足，較少發生不癒合或延遲癒合
- 52.關於遠端橈骨骨折，下列敘述何項正確？①伸直型骨折為手掌著地造成，又名Colles' fracture ②屈曲型骨折為手背著地造成，又名Smith's fracture ③屈曲型骨折常會有餐叉狀畸形 ④伸直型骨折常會有鍋鏟狀畸形
- A.①②
- B.③④
- C.①③
- D.②④
- 53.關於膝關節脫位的敘述，下列何者正確？
- A.如外力由前方作用在脛骨上端，可造成脛骨向後脫位
- B.如外力由外側作用在脛腓骨上端，可造成脛骨向外側脫位
- C.如外力由前方作用在股骨下端，可造成脛骨向後脫位
- D.多因暴力作用於脛骨下端而脫位
- 54.關於掌指關節與指間關節脫位之敘述，下列何者正確？

- A.掌指關節脫位患處最常見為指間關節過伸、掌指關節屈曲畸形
- B.當用掌指關節脫位復位法處理掌指關節掌側脫位時，先拔伸牽引後過伸患側關節復位
- C.指間關節脫位方向最常見是近端指骨向背側移位
- D.指間關節脫位整復最常見是拔伸牽引後屈曲患指復位
- 55.《內經·痹論》提到：「……善脹，尻以代踵，脊以代頭。」其中描述有關脊椎的變形，在X光的表現最接近於下列何者？
- A.Lordosis
- B.Kyphosis
- C.Scoliosis
- D.Syndesmophytes
- 56.承上題，內經文中所描述之症，其定義為何病？
- A.胞痹
- B.肝痹
- C.肺痹
- D.腎痹
- 57.當四肢或軀幹肌肉豐富的部位被外部重物長時間擠壓，或長期固定體位的自壓解除後，有時會形成擠壓症候群（Crush syndrome），有關擠壓症候群之敘述，下列何者錯誤？
- A.擠壓症候群在病理中可累及多個器官和系統而發生病變
- B.出現肌紅蛋白尿（Myoglobinuria），是診斷擠壓症候群的一個重要條件
- C.肌紅蛋白在尿中的濃度在傷後3～12小時達到高峰
- D.會導致電解質紊亂，見高血鈣、高血鈉、高血磷
- 58.遇肩關節前脫位時，單人採用牽引回旋法做復位動作時，除了疼痛的問題之外，尚須特別注意力道，以防止有骨質疏鬆的患者發生骨折。這個動作最常發生的骨折位置在下列何處？
- A.肩胛喙突骨折
- B.肱骨頭撕裂性骨折
- C.肱骨幹骨折
- D.肱骨外科頸骨折
- 59.承上題，右肩關節前脫位採牽引回旋復位動作之順序為何？①醫者右手向下牽拉，同時外展外旋患者上臂 ②醫者右手握患側肘部，左手握住手腕 ③醫者左手迅速內旋上臂使肱骨頭滑入關節盂內 ④維持牽拉力道，同時逐漸內收肘部，使患者手肘與胸壁前方相接
- A.①②④③

B.②①③④

C.②①④③

D.①②③④

60.有關橈尺骨幹雙骨折的整復方法，下列敘述何者正確？

A.經牽引後重疊未完全糾正者，可用擠捏分骨手法加以復位

B.如骨折在上1/3，則先整復橈骨；如骨折在下1/3，則先整復尺骨

C.若斜形骨折或鋸齒形骨折有背向側方移位者，應用回旋手法進行復位

D.若橈尺骨骨折斷端互相靠攏時，可用折頂手法

61.依據中醫眼科，五輪學說與五臟間的關聯，下列敘述何者正確？

A.肉輪為眼眥內紅色肉狀隆起，五臟屬於心

B.風輪指白睛，五臟屬於肺

C.腎五色主黑，指黑睛，五輪學說中屬氣輪

D.瞳神位於黃仁中央，內含神水，五輪學說中屬水輪

62.胞臉腫脹，虛軟如球，皮色如常，《眼科臨證筆記》稱之為胞虛如球，下列何者非其病因病機？

A.脾肺氣虛，濕邪上泛

B.脾腎陽虛，水不化氣

C.心脾兩虛，無力化濕

D.心有伏火，脾蘊濕困

63.中醫名稱「目系」相當於現代醫學下列何者？

A.視神經

B.眼瞼

C.玻璃體

D.水晶體

64.關於白澀症，下列敘述何者錯誤？

A.白澀症之病名首見於《諸病源候論》

B.本病類似西醫學之淺層點狀角膜炎

C.暴風客熱或天行赤眼治之不徹，以致目乾澀不爽者，可選用桑白皮湯加減治療

D.本病白睛不紅不腫，或隱見淡赤血絡，甚則視物昏朦

65.關於兩眦赤脈的敘述，下列何者正確？

A.大眦多虛，小眦實

B.實者用九仙散

- C.虛者用洗心散
- D.眦赤病多屬心經火
- 66.關於金疳與火疳之比較，下列何者錯誤？
- A.金疳位於白睛表層；火疳位於白睛裏層
- B.金疳病程較長；火疳病程較短
- C.金疳顆粒較小，呈灰白或白色小泡樣；火疳為侷限性紫紅色結節
- D.金疳不波及瞳神，預後較火疳好
- 67.若患者黑睛破裂，視力驟降，疼痛劇烈，畏光流淚，健眼無礙，用下列何方加減治療最適宜？
- A.除風益損湯
- B.還陰救苦湯
- C.瀉腦湯
- D.經效散
- 68.患者黑睛起翳如星，邊緣不清，表面污濁，如覆薄脂，抱輪紅赤，羞明流淚，珠痛頭痛，視力下降，舌紅苔薄黃，脈浮數。關於此患者的狀況，下列敘述何者錯誤？
- A.最有可能的診斷為凝脂翳
- B.可選用新製柴連湯加減來治療
- C.本病病程發展緩慢，一般預後良好
- D.此患者之辨證分型屬風熱壅盛
- 69.一位鼻咽癌的男性患者，近日頭痛劇烈，心煩失眠，咳嗽痰稠，口氣臭，口乾苦，耳鳴甚，小便赤，舌質紅，脈弦滑數，應以下列何種方式處理較為適宜？
- A.宜燥濕健脾，化痰散結，可選用加味二陳湯
- B.宜祛痰濁，散結聚，和脾胃，可選用清氣化痰丸
- C.宜行氣活血，軟堅散結，和肝養陰，可選用丹梔逍遙散
- D.宜瀉火解毒，疏肝健脾，可選用柴胡清肝湯
- 70.若治療耳鼻咽喉口齒科腫瘤的過程中，見病人津液耗傷，則治療宜養陰益氣。下列何藥之藥效不屬於此種效用？
- A.蘆根
- B.沙參
- C.雪梨乾
- D.山豆根
- 71.某患者耳部灼熱疼痛，張口時疼痛加劇，檢查見耳膜無穿孔，耳道瀰漫性紅腫兼見黃白色分泌物，最可能診

斷為下列何病？

- A.耳癰
- B.旋耳瘡
- C.耳瘡
- D.耳疳

72.患者耳內流膿，纏綿日久，流膿量多而清稀，局部檢查見耳膜中央穿孔，全身倦怠乏力、納少腹脹、面色萎黃無華、苔白濕潤、脈緩細弱，治以下列何方最適合？

- A.附桂八味丸
- B.托裏消毒散
- C.蔓荊子散
- D.地黃飲

73.耳鳴係因肝火上擾時，下列敘述何者錯誤？

- A.《醫學準繩六要》提到：「右脈弦急而數，屬肝火，其人必多怒，耳鳴或聾」
- B.治宜清肝泄熱，開鬱通竅，方以龍膽瀉肝湯加石菖蒲
- C.肝火盛者可選用龍薈丸
- D.肝氣鬱結火熱尚輕者，用逍遙散加減

74.關於「鼻鼈」之針灸療法－艾灸，下列方法何者最不適宜？

- A.取百會、上星、身柱直接灸
- B.取膏肓、命門、氣海直接灸
- C.取足三里、三陰交、曲池直接灸
- D.取神闕、湧泉、風府直接灸

75.關於膽腑鬱熱所造成的鼻淵，下列敘述何者最正確？

- A.全身主要症狀包含頭暈頭重、小便黃、咳嗽、痰多
- B.鼻涕黏白且量多，由鼻道上方流下
- C.外治可採冰連散吹入鼻腔，以疏風清熱通竅
- D.內治宜用托裏消毒散加黃芩、菊花、葛根、連翹

76.鼻甲腫實色暗，呈桑椹樣，鼻塞無歇，涕多或黃稠，或黏白，咳嗽多痰，舌質紅或有瘀點，屬鼻塞，為何病因之主證？

- A.肺經風熱，邪毒外襲
- B.肺脾氣虛，邪滯鼻竅
- C.脾胃失調，濕熱鬱蒸

D.邪毒久留，氣滯血瘀

77.關於石蛾的成因，下列何者錯誤？

A.先天稟賦不足

B.後天肺脾氣虛

C.邪毒所染

D.氣血凝滯

78.肺陰虛喉痹，若見唇淡無華，頭暈目眩，肢麻消瘦者，除養陰清肺外，最宜用下列何方藥？

A.四君子湯加黃耆、大棗

B.二陰煎加首烏、阿膠

C.四物湯加首烏、阿膠

D.知柏地黃丸加川芎

79.唇風的護理及預防，下列何者最不建議？

A.宜服健脾滲濕飲料

B.以白朮、防風煲湯服

C.少食辛辣厚味之品

D.減少菸酒刺激

80.有關牙痛的病因病理敘述，下列何者錯誤？

A.齒病風痛者，遇風發作浮腫，隨後生痛，以消風散治之

B.陽明濕熱，能致齒病

C.牙齒痛甚不可忍，涕淚俱出者，此乃臟腑之火旺，上行於牙齒而作痛也

D.牙齒疼痛，至夜而甚，呻吟不臥者，以胃火上衝之故也