

等 別：高等考試

類 科：臨床心理師

科 目：臨床心理學特論(二) (包括心智功能不全疾病之心理衡鑑與心理治療、精神病之心理衡鑑與心理治療、兒童與青少年發展障礙之心理衡鑑與心理治療)

考試時間：2 小時

座號：_____

※注意：禁止使用電子計算器。

甲、申論題部分：(50 分)

(一)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在申論試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

(二)請以黑色鋼筆或原子筆在申論試卷上作答。

一、小明就讀幼稚園大班，家長在老師的建議下帶他前來接受專業評估。老師表示小明在上課時經常不專心，會自己玩自己的東西，有時會坐不住起身走動；跟同學相處也常有問題，有時會拒絕與同學玩，偶而會有爭執而出手推打同學；除此之外語言及智力表現都跟其他小孩差不多。媽媽表示小明是家中獨子，經常都是自己玩，個性比較倔強，有時會鬧點小脾氣，但沒有明顯大問題。請問針對這些敘述你有那些鑑別診斷上的考量？請具體說明針對這些考量你會用那些程序及工具來進行評估？(20 分)

二、請問你贊成「Schizophrenia 目前已知與腦部的異常運作有關，因此心理社會介入的效果有限」這句話嗎？為什麼？請根據實徵研究結果來說明你的論點。(15 分)

三、請問「正常老化」、「Mild Cognitive Impairment」與「Dementia」三者如何界定？在心理衡鑑可以用那些程序及工具來評估與區分？(15 分)

乙、測驗題部分：(50 分)

代號：5107

(一)本測驗試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)共 40 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題或申論試卷上作答者，不予計分。

- 1 已退休的陳教授是一個輕度失智症患者，因為患者強烈要求，所以目前依然獨居於家中；針對此個案，臨床心理師較不會提出以下何種建議？
(A)提供家中環境各種記憶線索，如貼上物品名稱等
(B)儘量以寵物的力量來幫忙，如養小狗、小貓等
(C)依然維持原先固定的宗教與休閒活動，如星期日上教堂、與朋友唱卡拉 OK 等
(D)尋找恰當的記憶輔具，如不同時間會有不同提醒聲音的 PDA、規劃良好的電腦桌面等
- 2 有關中度失智症患者之衡鑑，下列何種測驗工具較不適用？
(A) TPT (Tactual Performance Test)
(B) CDR (Clinical Dementia Rating)
(C) CASI (Cognitive Abilities Screening Instrument)
(D) MMSE (Mini-Mental State Examination)
- 3 過去話多且樂於助人的 86 歲王老太太最近呈現意態闌珊、話語減少、生活功能下降之狀況，家人很著急地帶她就醫。測驗結果 MMSE 分數為 16 分，下列何者與此分數的解釋最無關聯？
(A)結婚次數與生產次數
(B)寡居年數與獨居年數
(C)用藥歷史與就醫次數
(D)過去是否具備讀寫能力

- 4 下列何組行為是老年期罹患失智症的患者相對較少見的？
(A)酗酒、濫交、攻擊他人、刷爆信用卡 (B)家居環境髒亂、不修邊幅、生活習慣改變
(C)日夜顛倒、睡眠混亂、收藏他人二手物品 (D)隨意購物、與鄰居爭執、喜藏金錢和鑰匙
- 5 下列何者比較不會呈現譫妄狀態？
(A)王先生從急診室入院，確診為出血型中風 (B)急診入院的張太太，確診為飲食中毒
(C)骨科住院的劉婆婆，確診為早期失智症 (D)外科病房的吳先生，確診為梗塞型中風
- 6 下列有關老年人的敘述，何者最正確？
(A)憂鬱症是老年人的譫妄的危險因子 (B)憂鬱為阿茲海默型失智症的危險因子
(C)憂鬱症是老年人失語症的危險因子 (D)憂鬱症是老年人血管性失智症的危險因子
- 7 下列何者較不是譫妄常見的臨床表現？
(A)注意力監控的能力下降、無法持續 (B)對親人展現冷漠與拒絕
(C)對環境刺激的辨識能力降低 (D)對時間的定向力改變
- 8 有關 ADHD 性別差異的敘述，下列何者正確？
(A)若一位女童在年幼時出現 ADHD 症狀，若同時又伴隨反抗性行為，相較男童，較不容易被大人帶來看診
(B)一般相信，臨床轉介來的 ADHD 女童，她們的預後會比同樣屬性的男童要好些
(C)患 ADHD 的男女兒童比例約為 3：1，這種比例到了青少年期，雖總人數下降，但比例仍類似
(D)女性個案會出現較屬於注意力不足/無組織的行為（不包括白日夢、懶散的行為）
- 9 關於失憶性疾患（Amnesic Disorders）的相關臨床特徵，下列何者錯誤？
(A)失憶性疾患會發生在譫妄之後
(B)失憶性疾患早期可能會出現虛談現象
(C)失憶性疾患不常會喪失自我定向感（disorientation to self）
(D)失憶性疾患不常會喪失地點定向感（disorientation to place）
- 10 下列何者並非失憶性疾患（Amnesic Disorders）中記憶力損傷的臨床特徵？
(A)失憶的表現，常與腦損傷的區域有關 (B)立即覆誦訊息的能力受損
(C)延宕回憶的表現也常不佳 (D)失憶的表現，與腦損傷的嚴重程度有關
- 11 下列那一個腦血管所供給的流域產生病變時，最易造成典型的失憶症候群（Amnesia Syndrome）？
(A)前交通動脈 (B)前大腦動脈 (C)脊椎動脈 (D)後大腦動脈
- 12 下列何者並非 DSM-IV-TR 中的腦震盪後疾患（Postconcussional disorder）相關的臨床特徵？
(A)失嗅症（Anosmia） (B)命名困難（Anomia）
(C)聽覺異常（Hearing impairments） (D)視覺異常（Visual impairments）
- 13 如果臨床上一名患者有明顯的命名困難，且講話不流利。然而，他的口語理解與句子覆誦表現尚可。他最有可能屬於何種失語症？
(A)跨皮質感覺型失語症（Transcortical Sensory Aphasia）
(B)跨皮質運動型失語症（Transcortical Motor Aphasia）
(C) Broca 型失語症
(D)皮質下失語症（Subcortical Aphasia）
- 14 根據 Frick 等人（1993）在品行問題（conduct problems）上的分類，說謊和偷竊是屬於下列何種問題？
(A)外顯性行為問題 (B)內隱性行為問題 (C)非衝動性行為問題 (D)過度反應行為問題
- 15 根據大腦發展的觀點，下列何者不是精神分裂症好發於青少年或年輕成人可能的因素？
(A)前額葉的發展需到青少年時期以後才逐漸成熟
(B)多巴胺的活動在青少年階段特別旺盛
(C)腦部發展時產生了過多的突觸修剪（synapse pruning）
(D)腦部萎縮的程度到了青少年階段正好達到產生症狀的臨界點

- 16 有關兒童和青少年的反社會行爲（antisocial behaviors）之敘述，下列何者錯誤？
(A)爲一廣泛與年齡不符，違反家庭期待、社會常模，造成自身或他人財產損害的行爲或態度
(B)一般正常兒童和青少年，極少出現反社會行爲
(C)反社會行爲不論在兒童時期與青少年時期，皆十分常見
(D)有些反社會行爲會隨著年齡的增加而增加，有些則反之
- 17 依據 DSM-IV-TR，有關注意力缺失／過動疾患（主要爲過動－易衝動型）伴隨品行問題兒童之敘述，下列何者正確？
(A)有適當的自我知覺（self-perceptions）與人際互動技巧
(B)有適當的自我知覺與缺乏適當人際互動技巧
(C)有正向的錯覺偏誤（a positive illusory bias）
(D)有負向的錯覺偏誤（a negative illusory bias）
- 18 有關對家中有注意力缺失／過動疾患兒童的母親之敘述，下列何者錯誤？
(A)較常有憂鬱症狀
(B)較常有畏避性性格疾患（avoidant personality disorder）
(C)有較高的親職壓力
(D)有較高的親子衝突
- 19 DSM-IV-TR 中，下列何者不是學習障礙之診斷？
(A)閱讀障礙 (B)書寫障礙 (C)數學障礙 (D)理解障礙
- 20 關於兒童期口吃（stuttering）之敘述，下列何者正確？
(A)發生於 2 到 7 歲兒童 (B)高峰期爲 7 歲
(C)女生比男生多 (D)兒童期口吃大部分不會自行恢復
- 21 有關智能不足的器質性（organic）病因敘述，下列何者錯誤？
(A)通常在中重度智能不足較常見 (B)通常發生於低社經地位家庭
(C)通常會合併其他的生理疾患 (D)可能是懷孕期、生產過程或腦傷等因素造成
- 22 根據 DSM-IV-TR，的分類方式，中度智能不足占所有智能不足的比例爲：
(A) 5% (B) 10% (C) 15% (D) 20%
- 23 有關亞斯柏格症的特徵敘述，下列何者錯誤？
(A)亞斯柏格症的特徵是自我中心、缺乏同理心
(B)亞斯柏格症的語言功能及認知功能無明顯遲緩
(C)亞斯柏格症者對社交主動但怪異
(D)最新研究趨勢指出，亞斯柏格症和自閉症是兩種不同疾患
- 24 有關自閉症兒童的智力功能之敘述，下列何者正確？
(A)大約 50%合併有智能不足 (B)語文智力中以詞彙表現最差
(C)智能不足者以輕度智能不足最多 (D)約有 5%具有遠超乎一般兒童的特殊才能
- 25 有關拒學症（school refusal）之敘述，下列何者錯誤？
(A)男生比女生多
(B)多半發生在 5 到 11 歲之間
(C)這些兒童多半會抱怨頭痛、肚子痛等而不想去上學
(D)大部分拒學兒童的認知功能與學業表現在平均水準或以上
- 26 在一般正常發展中，與父母親的分離焦慮通常在幾歲後較不常見？
(A) 2 歲 (B) 3 歲 (C) 7 歲 (D) 12 歲
- 27 關於兒童期的焦慮疾患的心理病理解釋模式，下列何者較不適合？
(A) Mowrer's 二因素理論（two-factor theory） (B)心智理論（Theory of mind）
(C)行爲抑制理論（Behavioral inhibition theory） (D) Bowlby's 依戀理論（theory of attachment）

- 28 對兒童青少年憂鬱症的治療敘述，下列何者正確？
(A)三環抗憂鬱劑（tricyclic antidepressant）與血清素再回收抑制劑（SSRI）的療效是相同的
(B)行為治療不是好的心理治療方法
(C)人際心理治療是較常用在兒童的好方法
(D) SSRI 藥物只有中度程度的療效
- 29 有關精神分裂症患者中自殺比例頗高之敘述，下列何者正確？
(A)自殺風險與患者的就業無關
(B)患者終其一生均有自殺風險
(C)女性患者自殺風險較男性患者高
(D)自殺風險與患者是否曾入院治療無關
- 30 對精神分裂症患者及家人進行家族治療時，往往會針對疾病及抗精神藥物的作用進行衛教，這除了可預防復發外，另一個最主要的目的為何？
(A)增進問題解決的技巧
(B)提升家人間的溝通能力
(C)降低家人對患者的敵意與批評
(D)確認家庭中的壓力源
- 31 下列何者為精神分裂症的負性症狀之一？
(A)靜呆狀態（catatonic stupor）
(B)字句拼盤（word salad）
(C)語言貧乏（alogia）
(D)離題（tangentiality）
- 32 先前的青春型精神分裂症（hebephrenic Schizophrenia）定義，與下列何種 DSM-IV-TR 精神分裂症亞型的定義類似？
(A)妄想型（paranoid type）
(B)僵直型（catatonic type）
(C)混亂型（disorganized type）
(D)未分化型（undifferentiated type）
- 33 精神分裂症患者往往在眼球追蹤作業（eye tracking task）上呈現出缺損，這些缺損和下列那些大腦的區域有關？
(A)額葉、頂葉、枕葉
(B)額葉、顳葉、小腦
(C)額葉、頂葉、小腦
(D)額葉、顳葉、頂葉
- 34 根據 DSM-IV-TR，下列何者不是抗精神藥物惡性症候群（Neuroleptic Malignant Syndrome）的症狀？
(A)發燒
(B)緘默（mutism）
(C)心跳過速（tachycardia）
(D)焦慮
- 35 下列何種疾患之遺傳性最高？
(A)雙極性疾患
(B)憂鬱症
(C)精神分裂症
(D)焦慮症
- 36 有關鋰鹽的敘述，下列何者錯誤？
(A)在預防躁症發作比預防憂鬱症發作上更為有效
(B)服用鋰鹽之後，多數病人仍持續會有一些躁狂與憂鬱症狀
(C)有嚴重副作用，鋰中毒症狀有心律不整、心臟病發、甚至死亡
(D)由於新型抗癲癇藥物 divalproex 在預防自殺上更有效果，目前鋰鹽已漸少被使用
- 37 依 DSM-IV-TR，產後初發特性說明（Postpartum Onset Specifier）不適用在下列何種情感性疾患？
(A)重鬱病（Major Depressive Disorder），單次發作（Single Episode）
(B)第一型雙極性疾患（Bipolar I Disorder），最近一次屬躁狂發作（Most Recent Episode Manic）
(C)第一型雙極性疾患（Bipolar I Disorder），最近一次屬憂鬱發作（Most Recent Episode Depressed）
(D)第一型雙極性疾患（Bipolar I Disorder），最近一次發作未註明（Most Recent Episode Unspecified）
- 38 依 DSM-IV-TR，兒童循環性情感疾患（Cyclothymic Disorder）的病程所需時間至少為：
(A) 6 個月
(B) 9 個月
(C) 1 年
(D) 2 年
- 39 要符合分裂情感性疾患（Schizoaffective Disorder）的診斷，分裂情感性發作（Schizoaffective Episode）的所需時間最低要求為多少個星期？
(A) 2
(B) 4
(C) 6
(D) 8
- 40 有關類精神分裂疾患（Schizophreniform Disorder）與精神分裂疾患之區別敘述，下列何者錯誤？
(A)前者的病程比後者的病程更短暫
(B)前者不須在發病時有社會功能損害的要求，後者則必須有此損害要求
(C)前者只包括後者活躍期準則中的正性症狀，不包括負性症狀
(D)前者可以完全康復，後者甚難回復病前功能水準