

107 年第二次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段考試、營養師、
心理師、護理師、社會工作師考試、107 年專門職業及技術人員高等考試法醫師、
語言治療師、聽力師、牙體技術師考試、高等暨普通考試驗光人員考試試題

代號：4106
頁次：8-1

等 別：高等考試
類 科：護理師
科 目：產兒科護理學
考試時間：1 小時

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 1 依我國「人工生殖法」規定，下列何者錯誤？
(A)禁止從事代理孕母行為
(B)未婚者可為受術者
(C)精卵捐贈不得為四等親內之旁系血親
(D)男性捐贈生殖細胞者應介於 20~49 歲之間
- 2 有關臺灣家庭結構改變的敘述，下列何者錯誤？
(A)晚婚晚育造成高齡產婦的問題日增
(B)女性在兼顧家庭與職場的衝突下，易延後適婚年齡
(C)雙薪家庭的增加及經濟能力的提升，因而提升我國目前的生育率
(D)離婚造成單親家庭日增，對家庭結構與性別角色造成衝擊
- 3 懷孕 8 週的婦女，經常反覆思考「繼續工作」或「擔任專職母親」，此種心境較屬於下列何種孕期心理反應？
(A)接受懷孕事實 (B)注意力集中在自己 (C)不切實際的幻想 (D)矛盾心理
- 4 潛伏期待產婦最可能有的行為反應為何？
(A)會不自主想要向下用力 (B)將注意力及能量集中在產痛上
(C)顯得疲累失去自我控制感 (D)精力充沛、興奮、有信心接受分娩挑戰
- 5 有關雌性素（estrogen）對懷孕早期生殖系統所造成的變化，下列何者錯誤？
(A)子宮頸長度增加 (B)產生黏液塞 (C)陰道黏膜變厚 (D)子宮壁厚度增加
- 6 採全素食之孕婦，容易缺少下列何種營養素？
(A)維生素 B₁₂、鋅、維生素 D (B)維生素 B₁₂、鐵、鋅
(C)維生素 C、維生素 B₁₂、鐵 (D)維生素 C、鈣、維生素 D
- 7 針對胎兒胚胎發育成身體各器官及構造中，下列何者是由中胚層發育而來？
(A)皮膚上表皮 (B)心臟 (C)肝臟 (D)神經組織
- 8 下列何種情況最常利用超音波偵測胎兒臍帶動脈血流，以評估胎兒之生長發育？
(A)妊娠糖尿病 (B)妊娠高血壓 (C)過期妊娠 (D)紅斑性狼瘡
- 9 有關海洋性貧血之敘述，下列何者錯誤？
(A)海洋性貧血屬於體染色體顯性遺傳
(B)監測平均紅血球體積（MCV）為海洋性貧血篩檢的第一步驟
(C)若夫妻為同一型的帶因者，則孕婦可接受羊膜穿刺以利產前診斷
(D)若夫妻為同一型的帶因者，胎兒可能罹患重型海洋性貧血的機會是 1/4

- 10 有關第一孕期唐氏症篩檢的敘述，下列何者錯誤？
(A) 檢測項目包括母血的 β -hCG 與妊娠關聯之血漿蛋白 A (PAPP-A) 以及超音波掃描測量胎兒頸部透明帶厚度
(B) 若胎兒頸部透明帶厚度大於 6 毫米，則可懷疑唐氏症或其他染色體異常
(C) 此項母血篩檢可提早至妊娠 11~14 週左右執行
(D) 唐氏症四指標篩檢的正確偵測率為 50%
- 11 有關妊娠期婦女甲狀腺分泌功能變化的敘述，下列何者正確？
(A) 妊娠期婦女基礎代謝率增加，甲狀腺素 (thyroxine, T4) 的分泌會受到抑制
(B) 妊娠期甲狀腺功能亢進的婦女，易發生自發性流產
(C) 甲狀腺結合血清蛋白平均值在第二妊娠期達到最高
(D) 妊娠期甲狀腺素值會升高，但三碘甲狀腺素 (triiodothyronine, T3) 值則下降
- 12 子宮生理性收縮環在肌肉上的變化為何？
(A) 子宮上段變薄，下段變厚
(B) 子宮上段變薄，下段沒有變化
(C) 子宮上段變厚，下段變薄
(D) 子宮上段沒變化，下段變薄
- 13 王女士 G₂P₁，在待產活動期時接受腰椎硬膜外麻醉，護理師發現王女士的血壓突然降低，下列護理措施何者最不適宜？
(A) 增加靜脈輸液輸入量
(B) 協助採左側躺
(C) 評估胎心率狀況
(D) 評估子宮收縮情況
- 14 楊女士目前子宮頸口全開且完全變薄，當子宮收縮時感到非常疼痛。有關此時生產疼痛的主要來源，下列何者正確？
(A) 疼痛來自於子宮韌帶的伸張，陰道及會陰肌肉的伸展
(B) 疼痛位置主要在下腹部及下背部
(C) 疼痛來自於子宮體下段伸展及宮縮肌肉細胞缺氧
(D) 疼痛的神經衝動由 T₁₀~L₁ 傳導進入脊髓
- 15 陳女士待產時感到疼痛不安並要求止痛藥物，護理師依醫囑給與 meperidine (demerol) 50mg 肌肉注射，下列護理措施何者較不適宜？
(A) 告知產婦藥物的常見副作用，包括尿滯留、噁心、嘔吐等
(B) 觀察產婦的頭暈嗜睡狀況，確保使用床欄
(C) 每小時監測陰道出血情形
(D) 密切監測胎心率的變異性
- 16 自然產的胎頭娩出後將進入下列何項分娩機轉？
(A) 下降 (decent)
(B) 外迴轉 (external rotation)
(C) 屈曲 (flexion)
(D) 伸展 (extension)
- 17 陳女士 G₂P₀ 獨自來待產，下列何種情況需立即通知醫師？
(A) 主訴先生在外島工作，一直哭泣
(B) 宮縮時胎心率為 110~120 bpm
(C) 破水 2 小時內，無規則性宮縮
(D) 宮縮間歇時的壓力為 50 mmHg
- 18 王女士第一胎，目前子宮頸開 6 公分，當宮縮時，閉眼睛不理人，下列何種護理措施較不適當？
(A) 引導放鬆呼吸技巧
(B) 提供音樂分散注意力
(C) 手握產婦雙手陪伴在旁
(D) 提供止痛藥或麻醉劑訊息以供選擇

- 19 當待產婦使用 PGE_2 陰道栓劑後，護理師需要監測下列何種變化？
(A)子宮頸平滑肌收縮 (B)胎兒肺部成熟 (C)子宮頸軟化成熟 (D)子宮頸水腫
- 20 張女士 G_2P_2 ，陰道生產後第 2 天，向護理師表示：「餵母乳時，我的肚子會痛！」。下列護理指導何者適宜？
(A) 2 星期後疼痛情況就會改善 (B)因母乳哺餵造成泌乳激素分泌而引起
(C)適當活動可以改善疼痛 (D)先停止母乳哺餵以緩解疼痛
- 21 陰道生產剛結束的婦女若有尿瀦留的現象，最主要的原因為何？
(A)膀胱內括約肌收縮 (B)胎兒通過產道時壓迫膀胱
(C)產後雌性素濃度增加所致 (D)第一節薦椎神經受損
- 22 有關結紮手術之敘述，下列何者正確？
(A)女性結紮可於產後 24~48 小時內實施 (B)女性結紮後不會再製造卵子
(C)男性結紮後立即有避孕效果 (D)男性結紮後容易有腹腔沾黏的情形
- 23 楊女士產後第 10 天，仍有輕微足踝水腫情形，其他的生理徵象均正常，護理師給予的指導何者最適宜？
(A)採低鹽飲食 (B)穿緊縮的襪子促進血液回流
(C)坐著時不要交叉雙腿 (D)多臥床休息，並減少活動
- 24 有關產後性行為 (sexual intercourse) 的護理指導，下列敘述何者最適當？
(A)建議惡露乾淨與會陰傷口癒合後才有性行為
(B)母乳哺餵的母親因泌乳激素較高易導致陰道乾燥
(C)產後陰道潤滑性減少，可用脂溶性潤滑劑促進潤滑
(D)因會陰傷口復原之需要，故產後八週後才能有性行為
- 25 有關 REEDA 評估會陰切開傷口的內容，下列何者正確？
(A) R 為 Redness，發紅 (B) E 為 Edege，邊緣
(C) D 為 Drain，引流 (D) A 為 Abscess，膿瘍
- 26 下列何者為產後霍曼氏徵象 (Homan's sign) 的評估方式？
(A)以兩手食指水平對稱下壓乳房，從乳暈處向上、下牽拉，再向左、右牽拉，檢查乳頭是否突出
(B)一手支托膝膕，另一手置於腳掌將其足部向背側屈曲，腓腸肌有無疼痛感
(C)將大腿靠近腹部，足底靠近臀部，伸直後再放回床面，大腿前側有無疼痛感
(D)雙膝彎曲，雙腳平放，兩手支托雙膝移向左側，再向右側，腰部是否疼痛
- 27 劉女士第一胎，依據魯賓 (Rubin) 對產後婦女行為態度之研究結果判斷，下列敘述何者表示劉女士處於接受期 (taking-in phase)？
(A)寶寶為什麼一直睡覺？ (B)我要怎麼樣才能讓奶水量增加？
(C)生小孩好痛，下次再也不要生了 (D)我的先生晚上照顧寶寶，現在他很累
- 28 有關新生兒出生 2~6 小時過渡期常出現的生理現象，下列何者異常？
(A)心跳及呼吸速率變化大 (B)腸蠕動增加
(C)解胎便 (D)黃疸出現
- 29 有關新生兒黃疸之敘述，下列何者正確？①黃疸最先出現於額頭 ②黃疸症狀漸漸由頭往下，由身體中心向外發展至四肢 ③新生兒出生第 3 天血中膽紅素大於 14 mg/dL，不需處理 ④可輕壓鼻尖觀察皮膚黃疸的情形 ⑤新生兒黃疸照光應保護眼睛與生殖器
(A)①②⑤ (B)②③⑤ (C)①④⑤ (D)②④⑤

- 30 有關新生兒神經成熟度評估之描述，下列何者是早產兒的特徵？
(A)四肢表現出高張性屈曲 (B)方形窗徵象角度為 0 度
(C)腳跟無法拉到耳朵 (D)手肘可以超過身體中線
- 31 有關子宮外孕之敘述，下列何者錯誤？
(A)血中 hCG 濃度有上升情形 (B)臨床處置只能採腹腔鏡手術
(C)出血時易有腹痛情形 (D)主要好發於輸卵管壺腹部
- 32 有關硫酸鎂 (MgSO_4) 在安胎使用的敘述，下列何者錯誤？
(A)需監測尿量 (B)用藥過量時可能抑制深部肌腱反射
(C)可利用生化檢驗監測血中濃度 (D)血中濃度過高可使用 halothan 拮抗
- 33 以比夏計分法 (Bishop's score) 評估產婦引產的難易度，下列何者錯誤？
(A)子宮頸擴張 (B)胎兒體重 (C)胎頭位置 (D)子宮頸堅硬度
- 34 有關評估 32 週妊娠糖尿病孕婦過去一個月間血糖控制之成效，下列何項檢測最佳？
(A)飯前空腹血糖值是否均在正常範圍內
(B)飯後一小時之血糖值是否均在正常範圍內
(C)糖化血色素值是否均在正常範圍內
(D)胎兒體重的變化，是否能維持在妊娠週數之 50 百分位
- 35 正在接受第 2 次腹腔內化學治療的卵巢癌病人，主訴一直覺得噁心，下列回應何者最適當？
(A)「噁心是化學治療副作用之一，過幾天就會好了」
(B)「我了解您的心情，聽說吃人蔘可緩解噁心，您要不要試試看」
(C)「噁心是最輕微的副作用之一，接下來還有其他的副作用會出現」
(D)「少量多餐，攝取高熱量、高蛋白質飲食可逐漸減緩噁心的現象」
- 36 有關女陰癌之敘述，下列何者正確？
(A)是臺灣女性較常見之生殖器官惡性腫瘤之一
(B)早期病變不明顯常被忽略
(C)第一期以放射線治療為主
(D)以基底細胞癌居多
- 37 王女士第一胎，目前在第一產程的過渡期，隨著越來越密集的字宮收縮，王女士顯得很焦慮不安。在床邊陪伴的王先生詢問護理師：「我的太太很不舒服，我也不知道怎麼幫忙，我最好到產房外面等待？」，此時護理師最適當的回答為何？
(A)「這個時候王太太最需要你，你怎麼可以離開呢？」
(B)「因為你的擔心會干擾生產，你最好到外面休息。」
(C)「我知道你的壓力很大，我們一起來幫忙王太太好嗎？」
(D)「我知道陪產很辛苦，你確實需要好好休息，寶寶出生後再告訴你。」
- 38 常導致愛滋病患肺部感染的病原體為何？
(A)肺炎鏈球菌 (B)黴漿菌 (C)結核桿菌 (D)肺囊蟲
- 39 朱女士，29 歲，主訴上週做過流產手術，因發燒和下腹部壓痛前來就診，內診時見子宮頸有膿狀分泌物，細菌培養結果為淋病雙球菌、披衣菌和黴漿菌感染，最有可能的診斷為何？
(A)子宮外孕 (B)巴氏腺囊腫 (C)卵巢囊腫 (D)骨盆腔炎
- 40 下列何種治療方式，最常用在子宮頸糜爛時的治療？
(A)電燒灼術 (B)冷凍治療 (C)雷射手術 (D)子宮內膜破壞術

- 41 下列何者是丹佛嬰幼兒發展篩檢測驗 II (DDST II) 的評估項目之一？
(A)對於新事物的趨避性 (B)對物體恆存的概念
(C)遇到挫折的容忍度 (D)語言與社會適應力
- 42 有關瀕死兒童的呼吸與心臟血管生理反應，下列敘述何者錯誤？
(A)會出現陳施式呼吸或喎嘆式呼吸 (B)喉頭肌肉緊縮，可自行將分泌物咳出
(C)四肢末梢脈搏變弱且不易觸診 (D)皮膚濕冷、蒼白、四肢發紺
- 43 張太太懷孕 30 週，因早期破水產下重 2,400 公克女嬰，其體重與妊娠週數的關係屬於：
(A) LGA：大於妊娠週數應有體重 (B) AGA：體重符合妊娠週數
(C) SGA：小於妊娠週數應有體重 (D) VLBW：非常低出生體重
- 44 琳琳，9 個月大，因細支氣管合併肺炎再度住院，醫囑需要胸腔物理治療，有關協助家屬進行出院準備，下列護理指導何者正確？
(A)示範家人如何確認痰堆積部位，先進行姿位引流再行噴霧治療
(B)確定痰液堆積部位後，每個姿位宜連續姿位引流約 15~30 分鐘
(C)過程中若琳琳出現呼吸窘迫、躁動不安等現象，仍可繼續執行
(D)最佳的姿位引流時間，宜安排在飯前 1 小時或飯後 2 小時執行
- 45 為嬰幼兒進行胸腔物理治療的叩擊 (percussion) 時，下列何項步驟不適當？
(A)叩擊宜在姿位引流後執行，以達更佳效果
(B)以手指併攏、弓為杯狀，規律地叩擊胸壁
(C)為達鬆動痰液的較佳效果，可直接拍擊病童裸露的皮膚
(D)每部位的叩擊時間建議約為 1~2 分鐘，可視病童情況而增減
- 46 鎌狀細胞貧血 (sickle cell anemia) 病童不會出現下列何項臨床表徵？
(A)顳骨變大、顳骨隆起 (B)末端肢體腫脹與疼痛
(C)視網膜病變以致失明 (D)肝、脾腫大
- 47 小玉，罹患先天性甲狀腺功能低下 (congenital hypothyroidism)，長期服用甲狀腺藥物，下列何者不是甲狀腺毒性反應之症狀？
(A)心跳減緩 (B)腹瀉 (C)呼吸困難 (D)痙攣
- 48 協助罹患腦瘤病童之家庭正向因應疾病時，下列護理照護何者較不適當？
(A)評估病童及家屬對診斷治療及預後的了解程度
(B)教導病童及家屬評估病童的神經功能、腦壓上升及感染之徵象
(C)教導家屬評估病童在生長發展技能上的情形
(D)避免讓病童知道疾病情況，以免焦慮與緊張
- 49 婷婷，9 個月大，體重 9 公斤，母親主訴最近一天解水便數次，現體重為 8 公斤，此屬於下列何種情況？
(A)正常體液流失 (B)輕度脫水 (C)中度脫水 (D)重度脫水
- 50 小珊，10 個月大，因中耳炎合併熱性痙攣住院治療，下列護理措施何者正確？
(A)定時給與退燒劑，將體溫控制於攝氏 38 度即可
(B)小珊發作後有嗜睡情形，故應協助其適當休息
(C)必須終身服用抗痙攣藥物，以免造成腦部傷害
(D)小珊並非全身性發作，所以不必使用床欄護墊

- 51 10 歲的阿偉出現發燒、頭痛、頸背僵硬等症狀，經評估有腦膜炎徵象，下列何者不是腦膜炎的徵象？
(A)歐氏徵象（Ortolani's sign） (B)柯林氏徵象（Kernig's sign）
(C)布魯辛斯基氏徵象（Brudzinski's sign） (D)角弓反張（opisthotonic）
- 52 幼年型類風濕性關節炎兒童的護理措施，下列敘述何者正確？
(A)評估身體外觀有無異常出血點、關節皮膚冰冷蒼白情形
(B)清晨易有關節僵硬疼痛，可以熱敷及止痛藥減輕不適
(C)宜鼓勵多臥床休息，以改善肌無力、預防關節攣縮情形
(D)類固醇及免疫抑制劑為最常用的長期治療藥物
- 53 在嬰幼兒期自閉症的症狀表現，易與下列何種障礙混淆？
(A)味覺障礙 (B)肢體障礙 (C)聽覺障礙 (D)觸覺障礙
- 54 根據兒童及少年福利與權益保障法（2015），醫事人員發現兒童遭受猥褻行為或性交，需於多久時間內通報主管機關？
(A) 24 小時內 (B) 48 小時內 (C) 72 小時內 (D)一週內
- 55 陳小妹，2 歲，12 公斤，被人從火場中救出，全身 30% 的部分皮層燒傷，至今已過 1 小時，現以靜脈輸液幫浦提供輸液，輸液的速度每小時應為幾 mL？
(A) 60 mL (B) 69 mL (C) 90 mL (D) 103 mL
- 56 小倫，1 個月大，接種 B 型肝炎疫苗。下列何者是適合肌肉注射的部位？
(A)左上臂三角肌中央 (B)腹直肌 (C)股外側肌 (D)腹臀肌
- 57 小華，2 歲，護理師在給與左耳用藥時，下列護理措施何者正確？
(A)給藥前向右側呈半側臥姿 (B)給藥前將耳垂往上往後輕拉
(C)給藥時直接滴於鼓膜上 (D)給藥後以棉棒塞住小華耳道
- 58 惠惠，4 歲，護理師預計在 30 分鐘內完成 2c.c. 的抗生素靜脈滴注，目前以每小時 60c.c. 的速度接受靜脈輸液，應該如何處置？
(A)加在 58 c.c. 輸液中維持 60 gtt./min (B)加在 28 c.c. 輸液中維持 60 gtt./min
(C)加在 38 c.c. 輸液中維持 40 gtt./min (D)加在 58 c.c. 輸液中維持 30 gtt./min
- 59 運用感官對事物所得的心像來了解世界，但卻仍不能以質量保留以及長度保留來認知事物，此兒童之認知發展處於：
(A)感覺動作期 (B)運思前期 (C)具體運思期 (D)形式運思期
- 60 為 1 歲兒童測量生命徵象，下列敘述何者正確？
(A)呼吸、脈搏均需測量完整一分鐘 (B)體溫測量以量口溫為佳
(C)壓脈帶的寬度應為上臂的 1/3 長度 (D)橈動脈是測量脈搏常使用的部位
- 61 小美，6 個月大，由媽媽抱來接種五合一疫苗，下列護理措施何者適當？
(A)利用布偶及空針，說明即將注射的程序 (B)注射後請媽媽擁抱，並提供安撫奶嘴
(C)注射時盡可能的緩慢推注藥劑 (D)注射後，部位貼上小膠布
- 62 兒童在瀕死過程中，出現呼吸逐漸由深變淺時，下列護理措施何者正確？
(A)避免給與止痛藥，以防呼吸抑制 (B)出現臨終嘎聲時可抬高頭部或採側臥
(C)提供昏暗的環境，以減少光線刺激 (D)嚴格限制絕對臥床休息，避免任何活動
- 63 有關罹患先天性梅毒的嬰兒皮膚丘疹及脫屑的護理措施，下列何者不適當？
(A)接觸個案時需穿著隔離衣及戴手套 (B)鼓勵家人探視，但避免觸摸或擁抱
(C)皮膚丘疹及脫屑部位可予以嬰兒油塗敷 (D)評估是否有皮膚丘疹造成的不適或乾燥

- 64 小鳴，6 個月大，腋下、鼠蹊、頸部長出膿疱後結痂脫屑，求醫確診為膿疱病，下列處置何者不適當？
(A)因膿疱病具高度傳染力，避免清洗患部及引流膿疱
(B)依醫囑局部塗抹新黴素（neomycin）抗生素藥膏
(C)協助患嬰清潔及剪短指甲，以保護患處被抓破
(D)指導照顧者適當隔離、維持清潔，預防感染
- 65 高危險新生兒常易出現呼吸窘迫症候群（RDS），下列敘述何者錯誤？
(A)呼氣時出現咕嚕聲（expiratory grunting）
(B)肺泡缺乏表面張力素，而使肺泡塌陷
(C)嚴重者兩側肺部 X-ray 檢查呈現出毛玻璃樣之影像
(D)容易有呼吸性鹼中毒
- 66 綺綺，3 歲，罹患急性白血病，近日因出現疼痛問題而住院，有關疼痛評估的敘述，下列何者正確？
(A)以 0~10 分的數字量表，使其選擇疼痛分數
(B)表達疼痛常見的敘述字句，如刺痛、鈍痛、悶痛等，給予選擇
(C)以哭泣到高興的臉譜量表，使其挑選能代表自己疼痛的臉譜
(D)以簡單描述量表，使其選擇最適合他感覺疼痛狀態的字詞
- 67 有關德國麻疹（German measles）的護理指導及處置，下列何者正確？
(A)體溫及症狀變化於年紀愈小兒童愈明顯
(B)粉紅色斑丘疹通常由四肢開始出現
(C)出疹後即不需採接觸防護隔離
(D)第一孕期婦女應與德國麻疹隔離
- 68 有關嬰兒玫瑰疹（roseola infantum），下列何者錯誤？
(A)熱痙攣是常見合併症
(B)常在退燒後開始發疹，由軀幹開始擴散至四肢
(C)需要呼吸道隔離至出疹後四天
(D)感染後可終身免疫
- 69 有關急性細支氣管炎的敘述，下列何者正確？
(A)是學齡期兒童常見的上呼吸道感染
(B)最常見的致病因是細菌感染
(C)主要傳染途徑為接觸傳染，需採取隔離措施
(D)呼吸困難嚴重之病童，會出現呼吸性酸中毒現象
- 70 兒童的呼吸道系統由於尚未完全發展成熟，而與成人有差異，下列何者正確？
(A)嬰兒喉頭在頭部較低處，約在第 5~6 頸椎處，易造成吸入性肺炎
(B)嬰兒會厭軟骨較成人短且有彈性，較不易噎到
(C)嬰兒肋骨位置較成人垂直，穩定性小，故較少利用腹式呼吸
(D)嬰幼兒的歐氏管（耳咽管）較成人短、寬且直，呈水平位置，較易使致病菌或異物入侵
- 71 持續靜脈灌注前列腺素 E_1 （ PGE_1 ）可維持動脈導管開放，增加肺動脈血流。下列何種先天性心臟病，不適合使用 PGE_1 治療？
(A)肺動脈瓣狹窄
(B)主動脈狹窄
(C)三尖瓣閉鎖
(D)大血管轉位
- 72 有關罹患心臟病嬰兒服用毛地黃的護理指導，下列何者正確？
(A)家中應備聽診器，服用前量心尖脈，至少測量 30 秒
(B)心跳如果高於 120 下/分鐘，可能是毛地黃中毒的症狀，需盡速就醫
(C)發生噁心嘔吐時，可能是中毒症狀，需盡速就醫
(D)毛地黃要與牛奶或食物併用，以減少腸胃刺激

- 73 陳小弟，8 個月大，體重 7 公斤。心臟手術後第一天，下列何者為異常表徵？
(A)肛溫 37.2°C (B) 24 小時尿量 60 c.c.
(C)動脈血氧分壓 PaO₂ 95 mmHg (D)兒童葛氏昏迷量表 (PGCS) 13 分
- 74 有關先天性甲狀腺功能低下嬰幼兒之症狀處理，下列何者錯誤？
(A)嬰兒出生 24 小時內抽血驗 TSH 值以確立診斷
(B)嬰兒需暫停母乳哺餵以正確測得甲狀腺素濃度
(C)治療目標之一為維持 T₄ 濃度在 10~16 µg/dL
(D)需定期注意新生兒聽力檢查及發展評估
- 75 有關性早熟 (precocious puberty) 的敘述，下列何者錯誤？
(A)通常男孩子發生率較高，較女孩高出 2~3 倍
(B)血清中 LH, FSH, estrogen, testosterone 皆上升
(C)可用 X 光檢查骨骺板癒合情況以確認骨齡
(D)可以腦部掃描確認是否有中樞神經性早熟
- 76 有關腎病症候群 (nephrotic syndrome) 與急性腎絲球腎炎 (acute glomerulonephritis) 之比較，下列何者正確？
(A)兩者皆受到 A 群 β 型溶血性鏈球菌感染所致
(B)兩者檢驗值皆呈現 C-反應性蛋白質 (CRP) 增加
(C)兩者皆會出現蛋白尿臨床表徵
(D)兩者皆會出現高血脂現象
- 77 王小弟，診斷為急性腎衰竭 (acute renal failure)，下列敘述何者正確？
(A)腎臟排出過多氫離子與鉀離子，造成代謝性酸中毒
(B)依醫囑給與口服 kayexalate，增加鉀離子的吸收
(C)少尿期，體液容積過多，宜限制水分攝入
(D)少尿期應攝入高鉀、高鈉飲食，矯正電解質不平衡
- 78 小美，14 歲，診斷為泌尿道感染 (urinary tract infection)，有關出院護理指導，下列何者錯誤？
(A)依醫囑服用抗生素，返院追蹤複檢尿液
(B)多攝取碳酸飲料，酸化尿液，減少重複感染機會
(C)如廁後，由前往後擦拭清潔會陰處
(D)排空膀胱，減少重複感染機會
- 79 有關重症肌無力 (myasthenia gravis) 病童的臨床症狀，下列何者錯誤？
(A)眼球肌肉受到侵犯而有複視 (B)出現吸吮及吞嚥困難
(C)顏面神經出現麻痺 (D)活動之後症狀會改善
- 80 陳小弟，因腦瘤 (brain tumor) 接受手術，下列護理措施何者錯誤？
(A)抬高床尾，增加腦部組織灌流 (B)監測生命徵象及意識狀況
(C)觀察傷口紅、腫、熱、痛現象 (D)教導避免用力咳嗽或解便