

104年第二次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段考試、
營養師、心理師、護理師、社會工作師考試、104年專門職業及技術
人員高等考試法醫師、語言治療師、聽力師、牙體技術師考試試題

代號：4106
頁次：8-1

等 別：高等考試

類 科：護理師

科 目：產兒科護理學

考試時間：1 小時

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆 在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 1 有關「以家庭為中心」之母育護理理念，下列何者正確？
 - (A)婦女在整個待產、生產與產後的過程都在同一個單位
 - (B)新生兒出生後 24 小時內宜在嬰兒室接受檢查與照護，待情況較穩定後，再移至母親身旁
 - (C)產婦在待產室時，宜限制親友人數及新生兒未滿 6 歲的兄姊陪產，以避免干擾產程進展
 - (D)為能提供完整產後衛生教育指導，建議陰道生產婦女住滿 3 天後再出院
- 2 根據衛生福利部（2007 年）統計：臺灣地區新生兒死亡之最主要原因為下列何者？
 - (A)源於周產期之病態
 - (B)先天性畸形
 - (C)家族遺傳心臟病
 - (D)先天性染色體異常
- 3 有關評估胎動之護理指導，下列何者正確？
 - (A)妊娠 20 週的胎動多為因應外在刺激而發生，例如：聲音
 - (B)胎動警訊指胎動次數明顯變化，與前一天相比較減少 50%胎動
 - (C)每天建議評估 3 次胎動，30 分鐘內有 1 次胎動即可停止計算
 - (D)12 小時內胎動少於 3 次，表示胎兒在睡覺
- 4 僅用卵磷脂與抱合髓磷脂比值（L/S ratio）來評估胎兒肺成熟度容易有偽陽性，宜配合下列何者可以正確地評估？
 - (A)膽紅素（bilirubin）
 - (B)磷脂甘油（phosphatidyl glycerol）
 - (C)雌三醇（estriol; E3）
 - (D)肌酸酐（creatinine）
- 5 何女士懷孕 32 週，最近感覺子宮收縮頻繁，一天 3~4 次，沒有腹痛、亦無陰道出血現象，至婦產科門診尋求諮詢，有關護理師的回答，下列何者較為適當？
 - (A)你可能有早產跡象，請務必儘快到醫院來進一步檢查
 - (B)通常沒有腹痛的子宮收縮是較安全的，建議你以腹式呼吸緩和子宮的收縮
 - (C)這應該是假陣痛，若是收縮頻率沒有再增加，則沒有關係
 - (D)依照你的情況，應聯絡家人儘快安排入院分娩
- 6 林女士的兒子 15 歲，身高 178 公分，從小成績欠佳，一年多前開始有乳房增大的情形，詢問護理師是否需要看整型外科將乳房切除，下列回答何者較為合宜？
 - (A)建議少吃炸雞，應可改善乳房增大的問題
 - (B)鼓勵你兒子進行戶外運動，應可改善乳房增大的問題
 - (C)可能有性染色體異常，建議到醫院做進一步的染色體分析
 - (D)建議到整型外科進行乳房切除，但應先接受心理諮商輔導
- 7 有關胎盤的結構及功能的說明，下列何者正確？
 - (A)胎盤的母體面含有基底蛻膜，呈現粗糙、暗紅色；胎兒面被羊膜覆蓋而呈現光滑的灰色
 - (B)胎盤的重量約在 800~1500 公克，約占胎兒體重的 1/3
 - (C)透過簡單擴散（simple diffusion），胎盤可協助母體與胎兒進行紅血球、球蛋白、胺基酸的交換
 - (D)胎盤可以分泌前列腺素，主要作用是在分娩時促進子宮收縮

- 8 有關胎兒呼吸系統發育的描述，下列何者正確？
(A)胎兒最早開始發育的系統是呼吸系統
(B)卵磷脂是肺泡表面的抗擴張不全因子
(C)妊娠 36 週後 L/S（卵磷脂與抱合髓磷脂之比） ≥ 1 ，表示肺部發育成熟，呼吸窘迫發生機率較少
(D)氣管與支氣管的發育始於妊娠 24 週
- 9 有關 Rubin 所提出不同妊娠期心理變化與反應的敘述，下列何者正確？
(A)第一妊娠期婦女會有快樂、滿足及實在的情緒反應
(B)第一妊娠期婦女會有易受傷害感及更注意自己
(C)第二妊娠期婦女開始將自己與胎兒視為一體
(D)第二妊娠期婦女對懷孕會有不確定及情緒不穩的反應
- 10 下列何項措施最符合 WHO 所訂「友善生產」之概念？
(A)陰部剃薙 (B)完全臥床待產
(C)可以隨意進食清淡飲食 (D)常規會陰切開
- 11 使用 fentanyl 進行硬膜外減痛分娩，下列藥物反應何者錯誤？
(A)止痛效果快速 (B)易有低血壓 (C)易有呼吸抑制作用 (D)易造成尿液滯留
- 12 王女士為初產婦，子宮頸口擴張 8 cm，因有便意感且陣痛強而大叫，下列何者為最恰當的措施？
(A)安慰產婦不要叫以節省體力 (B)告訴產婦夾緊雙腿等醫師來
(C)引導產婦進行喘息式呼吸 (D)教導產婦嘴巴緊閉，配合收縮開始用力
- 13 王女士入院待產，陰道指診時，於骨盆前側觸摸到胎兒的前凶門，針對此情形，下列何項措施最恰當？
(A)為枕前位，不需任何處理 (B)建議爬樓梯以利產程進行
(C)可採手膝姿勢以利胎頭迴轉 (D)通知醫師準備剖腹產
- 14 下列那種胎頭徑線最短？
(A)雙頂徑（BPD） (B)枕額徑（OM） (C)枕額徑（OF） (D)枕下前凶徑（SOB）
- 15 通常可在產程何時給與 Methergin 肌肉注射，以促進子宮收縮？
(A)產後 4 小時 (B)胎兒著冠時 (C)胎頭娩出後 (D)胎盤娩出後
- 16 有關產後母乳哺餵常見的問題及護理措施，下列敘述何者正確？
(A)乳頭破皮常見的原因為嬰兒沒有正確的含乳
(B)要預防脹奶發生，可多用電動吸奶器排空乳汁
(C)嬰兒若吸吮姿勢不對，可先用奶嘴練習以幫助適應
(D)乳頭扁平的產婦，哺餵母乳通常不會成功
- 17 有關促進早期成功母乳哺餵的相關措施，下列敘述何者正確？
(A)夜間哺餵造成母親疲勞，而影響乳汁分泌減少
(B)嬰兒餓了就餵，不限制哺餵母乳的時間長短及頻率，仍可發展出規律性
(C)天氣熱可以補充水分給嬰兒，但不宜給葡萄糖水
(D)每餐最好兩側乳房都餵，嬰兒若未吸完一側，應協助換邊以避免乳房腫脹
- 18 有關產後子宮復舊的敘述，下列何者錯誤？
(A)產後 12 小時子宮底位置會在臍上一橫指或臍平的位置
(B)子宮的復舊過程為進行性變化
(C)產後約 10~14 天，子宮即下降至骨盆腔
(D)哺餵母乳可促進子宮收縮
- 19 有關葡萄胎之描述，下列何者錯誤？
(A)因滋養層絨毛增加，血清 HCG 值偏高
(B)陰道出血是常見的臨床症狀
(C)衛教婦女 1 年內儘快懷孕以平衡荷爾蒙
(D)完全型葡萄胎呈現囊泡狀，含雙套染色體

- 20 評估產婦自解尿液是否順暢，下列何項評估技巧不合宜？
(A)於恥骨聯合上方叩診，產生鈍音 (B)子宮底位置偏離中線
(C)產後 6 小時沒有解尿 (D)側臥評估尿道口是否腫脹
- 21 黃女士表示當她想到寶寶時，會感覺到乳汁排出（let-down reflex），此種反應，主要是下列何者的作用？
(A)泌乳激素（prolactin） (B)催產激素（oxytocin）
(C)雌性素（estrogen） (D)黃體素（progesterone）
- 22 伍女士，G₁P₁，產後第 3 天，採親子同室。在親餵母乳時，詢問護理師：「我很想給寶寶喝母乳，我要怎麼做才可以順利哺餵母乳？」，下列敘述何者錯誤？
(A)鼓勵儘早哺餵，讓母親與新生兒習慣哺乳的過程
(B)教導舒適的哺乳姿勢，並以毛毯或枕頭支撐懸空處
(C)奶水建立後，每次餵奶儘可能一側吸吮 10 分鐘以上
(D)母親的舒適狀態會影響泌乳，建議夜晚不哺餵
- 23 承上題，根據學者魯賓的產後母性行為，伍女士處於那個階段？
(A)接受期 (B)緊執期 (C)放手期 (D)獨立期
- 24 下列那項生理成熟度特徵不是妊娠 39 週女性新生兒的特性？
(A)乳量充盈，突起約 0.5~1 公分 (B)身體無胎毛
(C)陰蒂突出，陰唇平坦 (D)整個腳底都有皺摺
- 25 新生兒出生後，護理師趕緊將其抱至加溫處理台，並以乾毛巾擦乾身體。這是運用下列何項體溫喪失機轉的預防措施？
(A)蒸發及傳導 (B)蒸發及對流 (C)傳導及輻射 (D)對流及輻射
- 26 有關新生兒立即護理之敘述，下列何者正確？
(A)出生後評估阿帕嘉計分若高於 7 分，僅評估一次即可
(B)勿用含碘消毒液，避免影響新生兒苯酮尿症篩檢的結果
(C)為預防梅毒感染，應點四環黴素之抗生素眼膏
(D)施打維生素 K₁，目的是預防新生兒出血
- 27 黎小姐在產後第 2 天發現新生兒的右側頭上有一個有界限的紅色軟腫塊，與產後第 1 天比較，有變大的趨勢，黎小姐很慌張的詢問護理師，以專業判斷，這是什麼特徵？
(A)胎頭畸形 (B)胎頭腫塊 (C)頭血腫 (D)腦水腫
- 28 張女士，30 歲，G₁P₀，目前妊娠 12 週，產前檢查結果發現 VDRL(+)，醫生告訴她有梅毒感染，張女士非常焦慮，醫生請媽媽教室的護理師提供進一步諮詢服務。有關護理師的衛教內容，下列何者較恰當？
(A)依目前的懷孕週數，胎兒較會出現軟骨炎、智能不足甚至死亡，應儘快接受治療
(B)孕期 18 週內，只要接受治療，胎兒幾乎不會受到感染
(C)梅毒感染是透過性交傳染，故不會經由胎盤傳給胎兒，請放心
(D)梅毒感染的治癒主要是靠免疫力，要避免使用抗生素，以免影響胎兒
- 29 承上題，張女士向護理師抱怨：「我是清白的，一定是我先生傳染給我的」，有關護理師的回應內容，下列何者較恰當？
(A)這或許有可能是你的先生傳染給你，需要請你先生一起來接受檢查與治療
(B)這對你的確不公平，你可以藉此機會拒絕與先生行性生活
(C)建議你先不要告知先生，以免造成先生誤解，而使婚姻破裂
(D)現在最重要的不是釐清誰傳染給你的，而是先趕快把病治好，以免胎兒受到感染

- 30 王女士，因早期子宮收縮入院，以 yutopar 安胎治療，下列何者為此藥最常見的副作用？
(A)嗜睡 (B)便秘 (C)口乾 (D)心悸
- 31 李女士為 Rh 陰性血型的初孕婦，其先生為 Rh 陽性血型，下列護理措施何者為宜？
(A)告訴李女士，其所懷的小孩都將是 Rh 陽性，會與母體產生 Rh 不合之激敏反應 (sensitization)
(B)若激敏反應尚未產生，則在產後 72 小時給予母體注射 300 μ g 的 Rhogam，可避免激敏反應產生
(C)注射 Rhogam 是為了中和母體中的 Rh 陰性紅血球，以阻止母體產生 D 抗體
(D)以間接性昆式試驗 (indirect Coomb's test) 檢查母體血液 Rh 陽性抗原數目
- 32 RU486 的墮胎原理，為下列何種荷爾蒙的拮抗劑？
(A)動情素 (B)黃體素
(C)前列腺素 (D)人類絨毛膜促性腺素 (HCG)
- 33 有關前置胎盤的臨床表徵敘述，下列何者正確？
(A)妊娠進入第二孕期即會開始出血
(B)出血量不易估計，產婦易發生出血性休克
(C)妊娠 24 週以超音波檢查即可準確鑑定前置胎盤的分級
(D)前置胎盤有可能合併胎盤早期剝離的傾向
- 34 有關經前緊張症候群引發的相關因素，下列何者錯誤？
(A)雌性素與黃體素的不平衡 (B)泌乳素過低
(C)前列腺素過多 (D)嚴重生活壓力
- 35 有關經前緊張症候群的飲食指導，下列何者最適當？
(A)攝取低碳水化合物飲食 (B)攝取富含葉酸的食物
(C)每日攝取 1~2 杯黑咖啡 (D)攝取富含維生素 B₆ 食物
- 36 李女士的陰道分泌物呈黃綠色、量多、泡沫狀且有腥臭味。李女士最可能的陰道感染症為下列何者？
(A)念珠球菌陰道炎 (B)滴蟲陰道炎 (C)披衣菌陰道炎 (D)萎縮性陰道炎
- 37 承上題，下列護理指導何者恰當？①每天陰道灌洗 ②性伴侶應同時接受治療 ③治療期間行房應戴保險套 ④補充女性荷爾蒙
(A)①② (B)①③ (C)②③ (D)③④
- 38 王女士乳癌術後接受放射治療，治療部位皮膚顏色變深，下列護理指導何者不恰當？
(A)黏貼膠布避免皮膚摩擦 (B)穿寬鬆衣服增加舒適
(C)避免陽光照射 (D)不需使用其他方法，膚色會自然褪去
- 39 張女士因不孕就醫，經子宮輸卵管攝影檢查發現兩側輸卵管阻塞，先生精液檢查正常，下列何項人工協助生殖技術適合張女士採用？
(A)人工授精 (AIH) (B)輸卵管精卵植入 (GIFT)
(C)體外受精—胚胎植入 (IVF-ET) (D)受精卵輸卵管植入 (ZIFT)
- 40 下列那一種婦女生殖道感染易造成不孕症？
(A)披衣菌陰道炎 (B)嗜血桿菌陰道炎 (C)滴蟲陰道炎 (D)念珠球菌陰道炎
- 41 阿龐，8 歲，依艾瑞克森 (Erikson) 心理社會發展理論，其發展任務重點與危機，下列何者正確？
(A)信任感與不信任感 (B)自動自發與羞怯懷疑
(C)勤奮進取與自卑 (D)自我統整 (認同) 與角色混淆
- 42 王太太罹患糖尿病懷孕 38 週生下王小弟 3980 公克，有關糖尿病對王小弟可能造成的影響，下列敘述何者錯誤？
(A)孕期王太太的高血糖可能刺激胎兒胰島素的分泌
(B)王小弟發生中樞神經系統畸形的機會較高
(C)王小弟出生後可能會出現低血糖現象
(D)王小弟有較高的機會罹患高血鈣症

- 43 下列那一種新生兒反射檢查，可評估是否有臂神經叢受損情形？
(A)手掌抓握反射（Palmar grasp reflex） (B)擁抱反射（Moro reflex）
(C)頸部強直反射（Tonic neck reflex） (D)踏步反射（Stepping reflex）
- 44 小華，4 歲，不慎被熱湯燙傷頸部、前肩部、手肘及手腕內側，屬於三度燒傷而送至燒傷中心治療，目前傷口已癒合，護理師在預防小華肢體攣縮姿勢的照護上，下列那項正確？
(A)在頸部下方使用枕頭支托 (B)維持手肘屈曲
(C)使上肢維持 100~130 度外展 (D)維持手腕屈曲 15~35 度
- 45 4 歲兒童住院期間呈現的分離焦慮，下列何者為最常見的行為反應？
(A)生氣、打人、拒絕合作 (B)自認為長大必須勇敢
(C)擔心身體狀況的改變 (D)擔心幼稚園的功課未做
- 46 下列關於使用耳鏡視診兒童耳朵的敘述，何者正確？
(A)不應將耳鏡插入耳道，宜以鏡孔光線照射耳道仔細觀察
(B)3 歲以下的孩童，需將其耳廓頂端向上向後拉
(C)正常沒有感染的鼓膜，呈現透明或珍珠色
(D)當耳膜破裂有耳漏時，無法看到耳膜破裂的裂孔
- 47 下列有關 EMLA（eutectic mixture of local anesthetics）止痛藥的敘述，何者正確？
(A)作用時間快速，能在注射後 10 分鐘內發揮效用
(B)是一種全身性止痛藥
(C)在疼痛性醫療處置前的 1 小時使用
(D)需注意成癮的情形
- 48 下列何項不是治療性遊戲（Therapeutic play）的目的？
(A)宣洩情緒 (B)提供治療相關訊息
(C)了解病童的感受 (D)分析早期經驗對病童的影響
- 49 有關嬰兒氣質的敘述，下列何者正確？
(A)反應閾高的嬰兒，尿布只要一點點濕就會哭鬧不安
(B)堅持度強的嬰兒，不易受外界刺激干擾
(C)屬於避性的嬰兒，初次接觸副食品時，可能會把食物吐出來
(D)嬰兒氣質是後天的，會因父母的教養方式而有所不同
- 50 趙小弟，為極度早產兒，出生第一天，體溫 35.6°C，除了使用保溫箱維持體溫外，還可以使用的保溫措施中，不包括下列何者？
(A)減低保溫箱內的濕度 (B)輻射加熱處理台的使用
(C)為早產兒戴上毛線帽 (D)接觸早產兒之各項物品應事先加溫
- 51 1 歲到 1 歲半幼兒的正常語言發展可達到的能力為何？
(A)為牙牙學語期，將發音當作遊戲
(B)為回聲期，可重複模仿聲音、語調及動作
(C)為單字期，可以有意義地表達自己的意思
(D)為雙字期，開始好問物體名稱及使用電報式語言
- 52 有關新生兒成熟度的評估，下列敘述何者為早產兒的特徵？
(A)手腕方型窗所形成的角度小於 45 度 (B)手肘無法越過身體中線
(C)足跟能觸及耳朵 (D)膝關節角度小於 90 度

- 53 呼吸窘迫症候群早產兒常見的臨床表徵，不包括下列何者？
(A)吸氣時有咕嚕聲，為最早出現的徵兆
(B)呼吸速率增加，每分鐘 60 次以上
(C)呼吸時鼻翼張開，肋間肌凹陷
(D)出生時呼吸正常，但 30 分鐘～2 小時內開始出現症狀
- 54 有關促進慢性病兒童正常化的護理措施，下列敘述何者錯誤？
(A)提早告知病童，疾病可能帶來的身體及功能的改變
(B)納入家族成員為照護計畫的一份子
(C)允許病童的生活作息與其他手足不同
(D)協助病童聚焦於自己的優點與能力，以建立自尊
- 55 小容，15 歲，為白血病末期病患，有關其面臨死亡之反應與護理，下列敘述何者錯誤？
(A)小容正經歷發展與死亡的雙重危機
(B)在這即將面臨死亡的時刻，她可能會尋找生與死的目的與意義
(C)應對小容隱瞞有關其瀕臨死亡的事實
(D)小容會擔心被孤立，應鼓勵同學與她接觸
- 56 有關疱疹性口齦炎（herpetic gingivostomatitis）病童的護理處置，下列措施何者適當？
(A)建議家屬準備含維他命 C 的柳橙汁，以補充病童體液
(B)協助病童服用 Acyclovir，以減輕症狀及增加癒合速度
(C)衛教家屬宜為病童接種抗毒素類的疫苗，以預防疾病復發
(D)衛教家屬此疾病症狀局限於口腔內黏膜牙齦發炎，不需擔心
- 57 安安，3 歲半，診斷為氣喘，護理師應優先指導家屬使用下列何種吸入劑型，以達最大療效？
(A)定量噴霧吸入劑併同面罩式吸藥輔助艙（metered dose inhaler + aerochamber）
(B)定量噴霧吸入劑併同吸藥輔助連接管（metered dose inhaler + spacer）
(C)乾粉吸入劑（dry powder inhaler），如 turbuhaler、accuhaler
(D)超音波式或壓縮空氣推進式噴霧機（nebulizer）
- 58 下列何者可以接種流行性感疫苗？
(A)過去預防接種曾經有不良反應的兒童
(B)罹患白血病等惡性疾病的兒童
(C)已知對蛋過敏的兒童
(D)6 個月以下的嬰兒
- 59 有關猩紅熱（Scarlet fever）的診斷檢查，下列何者錯誤？
(A)喉頭培養檢驗出 A 群 β 型溶血性鏈球菌
(B)錫克氏試驗（Schick's test）呈陽性反應
(C)狄克氏試驗（Dick's test）呈陽性反應
(D)2 週內血清中抗鏈球菌溶血素的抗體效價大於 166 單位（Todd unit）
- 60 有關氣喘兒童居家自我照顧尖峰呼氣流速計（peak flow meter），下列敘述何者錯誤？
(A)平日可由尖峰呼氣流速計監測呼吸道過度反應的程度
(B)5 歲以下兒童可能不會吹氣或力量不足，導致結果不可靠
(C)採站姿，吹氣時，尖峰呼氣流速計需與地面呈水平位置
(D)尖峰呼氣流速值達最佳值的 60%，即表示病童目前控制良好
- 61 有關護理師教導父母返家照顧急性中耳炎（Acute Otitis Media）兒童的護理指導重點，下列何者錯誤？
(A)喝牛奶和餵食時，儘量採坐姿
(B)平時擤鼻涕時，要壓住一側鼻孔
(C)抗生素服用到耳朵不痛時就停止
(D)每隔 6 個月需做一次聽力測驗

- 62 依據兒童的遊戲發展過程，幾歲左右兒童開始出現多人一起玩，且會互相借玩具，但沒有分工合作，也缺乏組織性？
(A)1~2 歲 (B)3~4 歲 (C)5~6 歲 (D)7~8 歲
- 63 小美，4 歲，診斷為法洛氏四重畸形，入院接受心導管追蹤檢查，有關檢查前、後護理之敘述，下列何者錯誤？
(A)檢查前需禁食 4~6 小時，但毛地黃藥物需按時持續給予
(B)檢查前可應用遊戲或畫圖提供小美有關心導管檢查的相關資訊
(C)檢查後穿刺部位需加壓止血，肢體需維持平直、不可彎曲
(D)檢查後應密切注意檢查肢體的顏色、溫度及生命徵象之變化
- 64 有關充血性心衰竭嬰兒的徵象，不包括下列何者？
(A)心跳快，有奔馬狀節律 (B)呼吸喘，有持續性乾咳
(C)高血壓，眼眶周圍水腫 (D)四肢冰冷，有盜汗現象
- 65 高小妹，妊娠週數 28 週又 3 天，現出生第 5 天，心臟超音波顯示有動脈導管開放，呼吸喘且費力，下列臨床處理措施何者錯誤？
(A)應嚴格計算水分及奶量的攝取量
(B)應密切的評估腎、心血管及呼吸的功能
(C)可使用肌肉注射 Indomethacin 促進導管閉合
(D)提供呼吸功能的支持，給予使用持續呼吸道正壓之治療
- 66 陳小弟，2 歲，身上突然出現多處紫斑，入院檢查確立診斷為特發性血小板減少紫斑症 (idiopathic thrombocytopenic purpura, ITP)。有關醫療處置之敘述，下列何者錯誤？
(A)靜脈注射或口服類固醇以阻斷自體免疫抗體破壞血小板
(B)禁用含 aspirin 的藥物，以防抑制血小板凝集功能而造成出血
(C)血小板數 $< 20000/\text{mm}^3$ 或發生急性致命性出血時，予以輸注血小板
(D)血小板低下持續 6 個月且使用類固醇無效時，即需施行脾臟切除術
- 67 有關病童輸血護理技術及注意事項，下列敘述何者錯誤？
(A)核對血袋上病童姓名、血型、配對號碼及交叉試驗
(B)使用溫血器將輸入之血液維持在 $35^{\circ}\text{C} \sim 37^{\circ}\text{C}$
(C)以生理食鹽水沖洗靜脈輸液管，並測量病童生命徵象
(D)使用輸液幫浦，開始輸血 15 分鐘內，每分鐘輸液不超過 2 mL
- 68 小華，5 歲，因腦膜炎引起顱內壓升高，不會出現下列何種臨床徵象？
(A)心跳過慢 (B)頭痛 (C)噴射式嘔吐 (D)落日眼
- 69 有關副甲狀腺功能低下症病童，初診斷時的血液檢驗結果，下列敘述何者正確？
(A)血中鈣離子濃度增高，血中磷離子濃度增高
(B)血中鈣離子濃度增高，血中磷離子濃度降低
(C)血中鈣離子濃度降低，血中磷離子濃度增高
(D)血中鈣離子濃度降低，血中磷離子濃度降低
- 70 小東，14 歲，罹患第一型糖尿病已兩年，有關其自我管理能力良好之證據，下列敘述何者錯誤？
(A)能在上體育課前先自行食用小方糖
(B)能在血糖過高但未酮酸中毒前就尋求協助
(C)能正確地輪流替換胰島素的注射部位
(D)能自覺低血糖症狀，不需依賴血糖監測器

- 71 白血病患童於誘導期階段的化學治療後，特別容易有那些問題？①感染 ②卡氏肺囊蟲肺炎 ③聽力障礙 ④自發性出血
(A)①② (B)①④ (C)②③ (D)③④
- 72 有關先天性腎上腺增生症（Congenital adrenal hyperplasia）的敘述，下列何者錯誤？
(A)是一種體染色體隱性遺傳疾病 (B)因體內缺乏 21-羥基化酶（21-hydroxylase）
(C)須給予皮質類固醇（cortisone）治療 (D)必須限制鹽分的攝取
- 73 小羣，6 個月大，因突然尖叫、哭泣且嘔吐而由母親送醫求治，經鋇劑灌腸確定為腸套疊，下列護理評估與指導何者錯誤？
(A)解便特徵為果醬般的暗紅色血便 (B)呈噴射狀嘔吐，嘔吐物不含膽汁
(C)若鋇劑灌腸無法使腸道還原，即採外科療法 (D)外科手術後，需協助病童維持屈膝的側臥姿
- 74 有關兒童 A 型肝炎的敘述，下列何者錯誤？
(A)傳染方式為糞口途徑 (B)急性期時，症狀如同感冒
(C)早期時，會出現黃疸現象 (D)飲食宜採高蛋白和低脂肪飲食
- 75 王小妹，8 歲，出現血尿、水腫，診斷為急性腎絲球腎炎（AGN），入院後 24 小時輸出入量紀錄 I/O：1200 c.c./1050 c.c.，血清尿素氮（BUN）：12 mg/dL，血清肌酸酐（blood creatinine）：0.7 mg/dL，血壓：120/85 mmHg。下列護理措施何者需優先執行？
(A)低蛋白飲食 (B)低鉀飲食 (C)臥床休息 (D)每日限水 500 c.c.
- 76 小偉，1 歲半，剛接受尿道下裂矯正手術，下列護理措施何者不適當？
(A)須保持導尿管的通暢，避免扭曲或阻塞
(B)矯正手術後的前幾天，應限制液體攝入量，避免膀胱脹痛
(C)為了保護傷口，不可讓小偉跨坐在父母的大腿上
(D)提供小偉熟悉的玩具與用物，減少其焦慮感
- 77 小芳，12 歲，疑似腦膜炎入院，有關其身體檢查與評估，宜進行下列何種檢查？
(A)歐特雷妮操作（Ortolan maneuver） (B)布魯辛斯基徵象（Brudzinski's sign）
(C)特倫德倫伯格徵象（Trendelenburg's sign） (D)卡列阿齊式徵象（Galezzi's sign）
- 78 小明，8 歲，出生時即被診斷為痙攣型腦性麻痺，有關協助其家庭生活趨向正常化的護理措施，下列敘述何者正確？
(A)為避免小明和同儕比較，建議其最好就讀資源班
(B)鼓勵父母採用其他「成功正常化」病童家庭的做法
(C)建議小明與父母將復健計畫併入家庭生活
(D)勸導小明與父母別再談論疾病對家庭的衝擊
- 79 小美，1 歲，罹患脊髓脊髓膜膨出（myelomeningocele）合併水腦，手術前應協助小美採取下列何種臥位？
(A)垂頭俯臥的姿勢 (B)仰臥，維持頭腳同高的姿勢
(C)側臥，並將床頭抬高 (D)俯臥，維持頭腳同高的姿勢
- 80 6 歲小明出現下肢無力，經診斷為裘馨氏假肥大性肌失養症（Duchenne's pseudohypertrophic muscular dystrophy），下列護理指導何者適當？
(A)鼓勵游泳，以保持肌力，預防攣縮 (B)減少深呼吸的動作，以免肺部肌肉過度疲勞
(C)建議多攝取飽和脂肪酸的食物，以補充營養 (D)為減少體力，少走動，儘量以輪椅代步