

102年第二次專門職業及技術人員高等考試醫師中醫師考試分試
考試、中醫師、營養師、心理師、護理師、社會工作師考試、
特種考試聽力師、牙體技術人員考試、102年專門職業及技術
人員高等考試法醫師、語言治療師、聽力師、牙體技術師考試試題

代號：4103
頁次：6-1

等 別：高等考試

類 科：中醫師、中醫師(二)

科 目：中醫臨床醫學(一)(包括傷寒論(學)、溫病學、金匱要略、中醫證治學、
中醫診斷學)

考試時間：1 小時 30 分

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 1 依《傷寒論》，發汗，病不解，反惡寒者，虛故也。宜治以下列何方？
(A)乾薑附子湯 (B)通脈四逆湯 (C)附子湯 (D)芍藥甘草附子湯
- 2 依《傷寒論》，瀉熱逐水破結的方子，以下列何者最為代表？
(A)大陷胸丸 (B)大陷胸湯 (C)小陷胸湯 (D)三物小白散
- 3 下後復發汗，導致「晝日煩躁不得眠，夜而安靜，不嘔不渴，無表證，脈沉微，身無大熱」的治法，
下列何項正確？
(A)溫陽利水 (B)通陽復脈 (C)急救回陽 (D)回陽益陰
- 4 太陽病一二日，當惡寒發熱，醫者以吐取汗，今自汗出，反不惡寒發熱，腹中饑，口不能食，其診
斷及脈象，下列何者最適當？
(A)衛表虛熱，關上脈細數 (B)脾虛發熱，脈洪大無力
(C)胃氣虛熱，關上脈細數 (D)中氣下陷，關上脈細數
- 5 太陽病服桂枝湯，致大汗出，脈洪大，再與桂枝湯，太陽邪鬱不解，「形似瘡，一日再發」的治法
與治方，下列何項正確？
(A)桂枝二越婢一湯微發其汗，兼清裡熱 (B)桂枝二麻黃一湯小發營衛之汗
(C)大青龍湯發汗解表，兼清裡熱 (D)桂枝麻黃各半湯小發其汗
- 6 有關「陽明病，若中寒者，不能食，小便不利，手足濇然汗出，此欲作固瘕」，下列相關敘述何者
正確？①見手足濇然汗出症狀，猶可溫中兼下也 ②其大便為初鞭後溏 ③此證為寒濕不化，純陰
證也 ④此證之病機為胃中虛冷，水穀不別
(A)①② (B)①②③ (C)①②④ (D)②③④
- 7 有關大柴胡湯證，下列敘述何者正確？①大柴胡湯屬攻劑，管領表裏上下之邪，以下焦為出路
②嘔不止，鬱鬱微煩之病機為邪入陽明，化燥成實所引起的 ③方中人參之作用為補中祛邪 ④心
中痞鞭之病機為邪入陽明，氣機阻滯所致
(A)① (B)② (C)①③ (D)②④
- 8 某日施先生求診，主訴一星期前受寒，初起發熱頭痛，惡寒無汗，骨節酸痛，服麻黃湯發汗後熱退，
但身疼痛迄今未癒，經量血壓 90/70 mmHg，診其脈沉遲，為汗後體表毛細血管灌注不良所致，下列
何項是正確的治法和治方？
(A)調和營衛，益氣和營，以桂枝湯倍芍藥加飴糖主治
(B)解肌發汗，調和營衛，以桂枝湯倍芍藥、生薑主治
(C)調和營衛，益氣和營，以桂枝湯加芍藥、生薑、人參主治
(D)調和營衛，益氣和營，以桂枝湯倍芍藥主治
- 9 下列有關陽明病熱入血室刺期門治療之敘述，何者正確？①下血是邪熱迫血妄行 ②可見譫語之症
狀 ③血室隸屬肝脈，刺期門以瀉少陽陽明之邪 ④邪熱從外宣泄，濇然汗出而解
(A)①②③ (B)①②④ (C)②③④ (D)①②③④
- 10 少陽兼裡虛寒證，治先與小建中湯補，後用小柴胡湯和之法，其陰脈弦是何意義？
(A)尺脈為弦 (B)沈取而弦 (C)為本虛 (D)為少陽太陰並病

- 11 依《傷寒論》，五苓散治水逆症的病機，下列何項正確？
(A)太陽傷寒，邪熱入裏，與飲相搏，飲熱相格於上
(B)太陽傷寒，邪熱入裏，水蓄下焦，飲熱上泛
(C)太陽中風，邪熱入裏，與飲相搏，飲熱相格於上
(D)太陽中風，邪熱入裏，水蓄下焦，飲熱上泛
- 12 依《傷寒論》，「傷寒，脈浮而緩，手足自溫者，繫在太陰…雖暴煩下利，日十餘行，必自止」，若出現下列何者則腐穢當去？
(A)胃家實 (B)脾家實 (C)胃強脾弱 (D)脾強胃弱
- 13 下列關於「附子湯與少陰病」之敘述何者正確？①「少陰病，得之一二日，口中和」，口中和是因陽氣虛弱，口中淡而無味 ②治少陰病初起，背惡寒者，可加用灸法以增強療效 ③方中用芍藥意在於「和營通痹」，加強溫經止痛效果 ④附子湯重用炮附子以溫經驅寒鎮痛
(A)①②③ (B)①③④ (C)②③④ (D)①②③④
- 14 關於「少陰病，但厥，無汗，而強發之，必動其血…為難治。」之敘述，下列何者正確？
(A)「少陰病，但厥，無汗」屬熱邪內鬱，故厥而無汗
(B)「但厥，無汗，而強發之」是指當發少陰之汗，但發之太過
(C)此名「上厥下竭」
(D)「為難治」是因厥非溫不可，但血竭則又不可溫之故
- 15 關於「傷寒脈遲，六七日，而反與黃芩湯徹其熱，脈遲為寒，今與黃芩湯復除其熱，腹中應冷，當不能食，今反能食，此名除中」之敘述，下列何者正確？
(A)「徹其熱」是指「透散熱邪」
(B)黃芩湯本於《傷寒論》中用以治「陽明與少陽合病，自下利者」
(C)除中證的形成是指對寒證誤用寒藥所致
(D)「今反能食，此名除中」是指胃中已無陽氣
- 16 依《傷寒論》，霍亂病，惡寒，脈微而復利，利止，亡血也。宜治以下列何方？
(A)五苓散 (B)理中丸 (C)桂枝加人參湯 (D)四逆加人參湯
- 17 下列關於「溫病範圍及分類」之敘述何者錯誤？
(A)麻疹雖屬兒科疾病，但其臨床表現亦符合溫病之特點
(B)依病證是否兼濕，可分為溫熱與濕熱兩類，如伏暑即屬溫熱類
(C)依發病初起是否有裏熱見證，可分為新感和伏邪兩類
(D)暑溫、濕溫初起多以裏證為主，但臨床表現與季節主氣一致，故仍歸屬新感
- 18 下列關於「四時溫病發病臨床特點」之敘述何者錯誤？
(A)葉天士：「夏暑發自陽明」說明暑溫初起即入氣分
(B)寒邪亦可作為溫病的誘發因素，如伏暑的發病
(C)恣食生冷、貪涼露宿是暑熱病邪常挾濕兼寒之因
(D)燥熱病邪易致津液乾燥，病變初期易傷肺胃之陰，後期多損及下焦肝腎之陰
- 19 下列關於「戰汗」之敘述何者錯誤？
(A)係邪氣流連氣分，邪正相持，正氣鼓邪外出，而見戰慄汗出
(B)欲作戰汗常有四肢厥冷，爪甲青紫，脈象外浮等先兆
(C)葉天士認為戰後「汗出膚冷」為宜，若「膚冷汗出」則小心病邪內陷，成氣脫之證
(D)吳又可指出：但戰而不汗者危，以中氣虧微，但能降陷，不能升發也
- 20 下列證型中皆有大便不通之症，但其中那一證型不宜使用苦寒通下法？
(A)痰熱阻肺，腑有熱結 (B)熱結旁流
(C)肺燥腸閉 (D)腑實陰傷
- 21 戴天章《廣溫疫論》提倡五種鑑別傷寒與瘟疫之診斷方法，下列何項錯誤？
(A)辨氣 (B)辨色 (C)辨脈 (D)辨汗
- 22 秋燥初起多邪在衛，肺衛燥熱之邪不解，勢必內傳入裏。若化燥傳入下焦，易成何證？
(A)肺燥陰傷 (B)肺燥腸閉 (C)絡傷咳血 (D)虛風內動

- 23 張先生為風溫熱入心包病例，住院於加護病房，證見身熱，神昏，舌蹇，肢厥，便秘，腹部按之硬痛，舌絳，苔黃燥，脈數沉實。依其脈證診斷，下列何者是正確的治療處方？
(A)新加黃龍湯 (B)導赤承氣湯 (C)牛黃承氣湯 (D)增液承氣湯
- 24 風溫病，熱邪傳入上焦氣分，其病變部位在何處？①肺 ②胃 ③胸膈 ④腸
(A)①② (B)①③ (C)①④ (D)②③
- 25 王同學，16 歲，清明掃墓氣溫低，淋小雨，當晚發病，身熱惡寒，頭痛少汗咳嗽，口渴而苦，自服感冒糖漿；隔日病情反加重，壯熱口渴，煩躁不寧，斑疹隱隱，舌絳苔黃，脈數，其病證病機為何？
(A)風溫（胃熱發斑） (B)春溫（熱在營血） (C)春溫（氣營兩燔） (D)風溫（熱入心包）
- 26 承上題，治宜下列何方？
(A)清宮湯 (B)一甲復脈湯 (C)加減玉女煎 (D)犀角地黃湯
- 27 溫病症見發熱口渴，胸痞腹脹，肢酸倦怠，咽腫溺赤，苔黃而膩，最適合的方劑為下列何者？
(A)三仁湯 (B)三石湯
(C)銀翹散加馬勃、元參 (D)甘露消毒丹
- 28 關於暑溫的病候特點，下列敘述何者錯誤？
(A)本病初起多逕入陽明胃，而出現「暑熱傷氣」的見證
(B)常見症如壯熱、口渴引飲、心煩面赤、汗多氣粗、頭痛且暈、脈象洪大等陽明氣分熱盛之象
(C)甚或氣分太甚而出現背微惡寒，脈弦緊的徵象
(D)暑為火熱之邪，傳變迅速，故起病即邪在氣分，而無衛分過程，與一般新感有所不同；病程中極易邪陷心營而出現神昏、斑疹
- 29 溫疫的首要治療原則，為下列何者？
(A)苦寒泄熱為主 (B)扶正祛邪並用 (C)扶助正氣以祛邪 (D)迅速祛除病邪
- 30 下列有關大頭瘟的敘述，何者錯誤？
(A)風熱時毒是致病因素 (B)多發生於夏秋之際
(C)以肺胃為主要病位 (D)有強烈傳染性
- 31 吳鞠通於《溫病條辨》指出濕溫與下列何病證「證本一源，前後互參，不可偏執」？
(A)風溫 (B)春溫 (C)伏暑 (D)秋燥
- 32 關於治「伏暑邪結腸腑」用俞根初「枳實導滯湯」之敘述，下列何者錯誤？
(A)本方針對「濕熱鬱蒸，腸道積滯」而設 (B)山楂、六麴消導化滯和中
(C)重用生大黃，急攻積滯，以防濕熱耗陰 (D)黃連、連翹、紫草以清熱解毒
- 33 依《金匱要略》，下列何者為桂枝加龍骨牡蠣湯的主治項目？①陰頭寒 ②目眩髮落 ③清穀亡血 ④腹中痛
(A)①② (B)③④ (C)①②③ (D)②③④
- 34 依《金匱要略》，下列何者為梔子大黃湯的藥物組成之一？①枳實 ②枳殼 ③豆豉 ④茵陳
(A)①③ (B)①④ (C)②③ (D)②④
- 35 患者在淡水河畔騎腳踏車，友人從玉山打手機告知雪景非常美，患者不留意跌入河中，經一陣掙扎才上岸，翌日證見發熱、惡寒、鼻塞、全身關節痠痛，患者自服生薑湯，症狀仍持續，一週後上述症狀加重，出現心煩，就醫後醫師診其舌淡紅，苔白膩，脈浮緊微遲。治以下列何者最宜？
(A)桂枝、甘草、白朮、附子 (B)薏苡仁、杏仁、甘草、麻黃
(C)甘草、白朮、麻黃、杏仁、桂枝 (D)甘草、桂枝、生薑、附子、大棗
- 36 承上題，該證候的病機為下列何者？
(A)風濕在表 (B)寒濕在表
(C)風濕表虛 (D)風濕表陽虛，濕氣偏勝
- 37 依《金匱要略》，血痹病見「脈微澀在寸口，關上小緊」，宜治以下列何者？
(A)鍼引陽氣 (B)桂枝救逆湯 (C)桂枝加黃耆湯 (D)黃耆桂枝五物湯
- 38 依《金匱要略》，支飲胸滿者，宜治以下列何者所組成之方劑？①半夏 ②桂枝 ③枳實 ④紫蘇 ⑤茯苓 ⑥厚朴 ⑦白朮 ⑧甘草 ⑨大黃
(A)②⑧ (B)③⑥⑨ (C)①③④⑤ (D)②⑤⑦⑧
- 39 依《金匱要略》，證見腹滿，口舌乾燥，大小便不利，宜治以下列何者？
(A)己椒藶黃丸 (B)澤瀉湯 (C)木防己湯 (D)防己茯苓湯

- 40 依《金匱要略》，水飲在五臟，其中水在肺的症狀為下列何者？①短氣 ②噦而痛 ③吐涎沫 ④欲飲水
(A)①② (B)③④ (C)①②③ (D)②③④
- 41 26 歲女性患者，主訴腹痛近半日，生產後已 4 日，惡露行而不暢，有時夾有血塊，少腹脹滿拒按，口乾不欲飲，小便尚可，大便秘，舌紅有瘀斑苔白，脈弦細，治以下列何方最為適宜？
(A)當歸芍藥散 (B)紅藍花酒 (C)枳實芍藥散 (D)下瘀血湯
- 42 有關《金匱要略》妊娠病中當歸貝母苦參丸的敘述，下列何者正確？①主治妊娠血虛鬱熱所致的小便不利 ②本方亦有用於妊娠大便難者，亦取其有滋潤清熱散結之功 ③本方之組成為當歸、貝母、苦參、滑石
(A)①② (B)①③ (C)②③ (D)①②③
- 43 有關《金匱要略》產後病中枳實芍藥散的敘述，下列何者正確？①主治產後氣血鬱滯成實的腹痛 ②枳實須炒黑以行血中之氣 ③此方須以麥粥下之以和胃安中 ④服後新血當下如豚肝
(A)①②③ (B)①③④ (C)②③④ (D)①②③④
- 44 48 歲女性患者素有消化性潰瘍病史，主訴黑便 2 週，經檢查排除惡性病變，現症狀體徵有頭暈心悸，少氣懶言，四肢無力，舌淡胖少苔，口不乾渴，飲食尚可，但食後易腹脹，大便瀉日 2-3 行，糞便中常有未消化食物，脈沉細數，治以下列何者最為適宜？
(A)側柏葉、乾薑、艾葉、童便
(B)伏龍肝、乾地黃、阿膠、附子、白朮、甘草、黃芩
(C)赤小豆、側柏葉、當歸
(D)大黃、黃芩、黃連、藕節、地黃炭
- 45 47 歲女性患者，身高 156 公分，體重 77 公斤，就診時主訴右脇劇痛，痛甚引肩背已二日，今晨大便呈灰白色，自覺身熱，望之白睛發黃，皮膚略黃，手掌黃甚，厭油膩食物。診其舌質紅，苔黃微膩，脈緊數。治以下列何方最宜？
(A)茵陳五苓散合甘露消毒丹 (B)烏梅丸加茵陳、山梔
(C)茵陳朮附湯加鬱金、茯苓、澤瀉 (D)大柴胡湯加茵陳、金錢草、鬱金
- 46 57 歲男性患者，患肝病已 9 年，近日覺神疲困倦，怕冷不喜動，小便漸少，大便稀溏，脘腹痞脹，得溫稍緩，望之顏面略浮腫，下肢水腫甚，按之凹陷不起，腹部脹滿，按之如囊裹水，舌苔白膩，脈滑。依上述證候，辨證屬下列何者最宜？
(A)氣滯濕阻 (B)寒濕困脾 (C)脾腎陽虛 (D)肝腎陰虛
- 47 承上題，以下列何方治療最適宜？
(A)苓桂朮甘湯 (B)實脾飲 (C)胃苓湯 (D)一貫煎合膈下逐瘀湯
- 48 心陽不足和心氣不足兩證型最主要的區別症狀為下列何者？
(A)神疲無力 (B)舌淡苔白 (C)形寒肢冷，面色蒼白 (D)胸悶氣短
- 49 15 歲男性腦性麻痺患者在母親意外去世後，常常想念媽媽，喃喃自語，表情淡漠，目光發呆，不思飲食，神志癡呆，舌淡紅苔白膩，脈弦滑。下列有關患者證型病機與治療的敘述，何者錯誤？
(A)患者的癲證屬脾虛痰鬱證型
(B)病機—思慮太過，脾氣不運，痰涎內生，蒙蔽神明
(C)治法—理氣解鬱，化痰開竅
(D)主方—順氣導痰湯
- 50 36 歲女性長期多夢易驚，容易煩躁，比較疲勞時更睡不著，脈弦細，舌質紅苔少。下列有關患者證型病機與治療的敘述，何者正確？
(A)證型—痰熱內擾型 (B)病機—心火素盛或因外邪內擾心神
(C)治法—補益心脾，養心安神 (D)主方—酸棗仁湯
- 51 嘈雜而症見面黃唇淡，心悸頭暈，睡眠多夢，舌淡，脈細弱，治以下列何方最宜？
(A)當歸補血湯 (B)歸脾湯 (C)溫膽湯 (D)四君子湯
- 52 某患者被診斷為十二指腸潰瘍，症狀胃脘常灼痛，泛酸嘈雜，煩躁易怒，口苦而乾，舌質紅，舌苔黃，脈弦數。下列病機何者最宜？
(A)肝氣犯胃，氣機痞阻 (B)濕熱蘊結，氣機阻滯
(C)肝鬱化火，胃熱氣滯 (D)胃陰不足，脈絡失於濡養

- 53 40 歲男性患者，罹患痰飲病，症見身疼沈重，肢體浮腫，發熱惡寒，不汗出而煩躁，治以下列何方最適宜？
(A)己椒藶黃丸 (B)小青龍湯 (C)甘遂半夏湯 (D)大青龍湯
- 54 張老師，40 歲，參加元旦升旗典禮後，突然聲音嘶啞，咳嗽不爽，鼻塞，頭痛惡寒發熱，胸悶，舌苔薄白，脈浮，則該病之病機為下列何者？
(A)肺燥津傷 (B)風熱上壅 (C)風寒鬱閉 (D)肝氣鬱結
- 55 承上題，治療主方選用下列何者最宜？
(A)金沸草散 (B)柴胡疏肝湯 (C)清燥救肺湯 (D)百合固金湯
- 56 關於《醫學心悟》止嗽散之敘述，下列何者最宜？
(A)本方宣肺散寒效強，主要用於風寒閉肺 (B)治外感咳嗽遷延不癒，咽癢，咯痰不爽等症
(C)方中紫苑、百部疏風宣肺，化痰利咽 (D)方中前胡以降氣祛痰
- 57 有關耳鳴、耳聾的辨證，下列敘述何者錯誤？
(A)暴聾多屬外感、痰熱 (B)耳鳴兼見面色㿔白，屬腎虛
(C)耳鳴見頭痛發熱，耳內作癢者為風 (D)面色黧黑，耳聾閉塞，舌黯者屬瘀
- 58 有關陽痿的治療原則，下列敘述何者錯誤？
(A)因命門火衰者，當溫補，宜以剛熱燥澀之劑，鞏固療效
(B)因濕熱下注者，治用苦味堅陰，淡滲去濕
(C)陽痿屬實者宜瀉，有火者宜清
(D)因腎虛勞傷者，可選用菟蓉、蛇床等溫腎壯陽
- 59 下列有關癰閉之敘述，何者錯誤？
(A)初起病「閉」，後來轉成「癰」的，為病勢由輕轉重
(B)如見有小腹脹滿疼痛、胸悶、氣喘等症，則病情較重
(C)治療應根據「腑以通為用」的原則，著眼於通
(D)治療應根據病變在肺、在脾、在腎的不同，進行辨證施治，不可濫用通利小便之品
- 60 36 歲男性患者，主訴頭痛時作，痛連項背，惡風畏寒，遇風尤劇，常喜裹頭，口不渴。診其苔薄白，脈浮，治以下列何方最宜？
(A)羌活勝濕湯 (B)九味羌活湯 (C)川芎茶調散 (D)荆防敗毒散
- 61 癭病中以頸前輕度或中度腫大，其塊觸之柔軟光滑，無結無根，可隨吞咽動作而活動，並見急躁易怒，眼球外突，消瘦易飢等為特徵，稱為何種癭病？
(A)癭囊 (B)癭瘤 (C)癭氣 (D)石癭
- 62 下列各種活血化癥法與相對應的方劑，何者錯誤？
(A)溫陽活血法宜聖愈湯 (B)涼血活血法宜犀角地黃湯
(C)行氣活血法宜復元活血湯 (D)滋陰活血法宜玉女煎
- 63 7 歲男童因流行性腦脊髓膜炎住院中，時時發作項背強直，角弓反張，四肢抽搐，心中憺憺大動，神倦癱瘓，觀其舌乾色絳，苔少，脈虛數，選用下列何方最宜？
(A)紫雪丹 (B)羚羊鉤藤湯 (C)天麻鉤藤飲 (D)大定風珠
- 64 痹證肌膚麻木，肢體關節重著，苔白膩，脈濡緩，下列何方治療最宜？
(A)防風湯 (B)烏頭湯 (C)薏苡仁湯 (D)獨活寄生湯
- 65 關於病與證，下列敘述何者錯誤？
(A)霍亂在中醫診斷學中有三證：乾霍亂、濕霍亂、熱霍亂
(B)霍亂是指頃刻之間腸胃機能發生撩亂現象
(C)以病而言，同病異證，病是共性，證是個性
(D)以證而言，同證異病，證是共性，病是個性
- 66 關於《傷寒論》太陽病，如患者主要症狀是「喘」，證屬表寒證或邪熱迫肺證者，則其證治之敘述，下列何者錯誤？
(A)太陽表寒證，用麻黃湯 (B)邪熱迫肺，用麻杏甘石湯
(C)脈之緊、洪為兩證辨別重點 (D)有汗無汗為兩方辨別重點
- 67 望診中，望肌膚紋理之疏密，可判別下列何者？
(A)胃氣之虛實 (B)肝血之盈虧 (C)營衛之強弱 (D)津液之盛衰

- 68 依《靈樞·五色篇》面部分法，山根候下列何者？
(A)肝 (B)心 (C)脾 (D)肺
- 69 某3歲小兒因外陰腫來看診，經望診發現陰囊腫大透明，則下列相關敘述何者錯誤？
(A)此病為「陰腫」，指男性陰囊腫大 (B)此病為「水疝」，為陰囊水腫積液
(C)疝證有氣、血、筋、癰、寒、水、狐七種 (D)此病常為肝經受熱而致
- 70 下列何者非滑苔主證之一？
(A)濕熱 (B)陽虛 (C)寒濕 (D)痰飲
- 71 有關寒熱的問診，下列敘述何者正確？
(A)傷寒論中的少陽病其寒熱是同時並見的
(B)外感風寒的寒熱是交替發生的
(C)「潮熱」的臨床特點為熱如潮水之來，或按時熱更甚，如溫病中濕溫病的「身熱不揚」
(D)「壯熱」且口渴喜冷飲常見於傷寒的陽明證與溫病的血分證
- 72 某患者有腸鳴的症狀，腹中腸鳴聲大如雷，並伴隨脘腹脹滿，肢厥吐逆，此證可能由下列那一個外邪所引起？
(A)風 (B)寒 (C)濕 (D)熱
- 73 二十八脈中，下列那一項不是相反的兩種脈象？
(A)緊脈與緩脈 (B)散脈與牢脈 (C)動脈與短脈 (D)洪脈與微脈
- 74 下列有關「微脈」的敘述，何者錯誤？
(A)其特徵為極軟而沉細，按之欲絕指下 (B)其主病的嚴重性甚於虛脈
(C)常見於陽氣衰 (D)陰陽氣血諸虛者易見
- 75 臨床上，下列何種病機出現妄言、譫語、發狂等精神意識異常現象的機會最低？
(A)心血虧虛 (B)痰迷心竅 (C)瘀血乘心 (D)熱入心包
- 76 關於「診脈部位」之敘述，下列何者錯誤？
(A)診脈部位自《內經》以降，乃由遍診法發展為寸口診法
(B)三部診法見於《傷寒論》，以人迎候心肺、寸口候十二經、趺陽候胃氣
(C)寸口診法始見於《內經》，詳於《難經》，推廣於《脈經》
(D)《難經·一難》：「寸口者，脈之大會，手太陰之動脈也。」說明寸口脈能夠反映五臟六腑病變之理
- 77 有關「濕邪致病」的敘述，下列何者錯誤？
(A)濕蒙上焦者，常見頭重頭脹，胸脘滿悶，口淡無味；治宜燥濕健脾，藥選蒼朮、厚朴、茯苓
(B)濕熱下注大腸，常見腹痛腹瀉，裏急後重，糞便臭穢有膿血，肛門灼熱，口苦，苔黃膩等症
(C)內濕與外濕互相關聯。「脾失健運」是外濕發病的內在根據；而外濕不除，又易傷脾導致內濕
(D)每到夏季就食慾減退，疲乏、胸悶、低熱、四肢困倦，到秋天症狀就逐漸消失；此症屬「濕阻」
- 78 下列關於六經辨證中「陽明經證」證候分析之敘述何者錯誤？
(A)陽明之脈榮於面，熱勢上騰，故面赤
(B)心煩是因熱擾心神
(C)因熱甚津湯，故舌苔黃燥
(D)陽明經多氣多血，熱迫其經，故脈滑數或沈遲而實
- 79 下列關於六經辨證中「太陽中風證」之敘述何者正確？
(A)太陽中風脈浮緩是因「正氣欲出而風邪束表，經氣不利」
(B)太陽中風因「汗出肌腠疏鬆，營陰不足」故頭項強痛
(C)因風邪壅滯而影響及於肺胃，故鼻鳴乾嘔
(D)本證由於有「發熱、頭項強痛，惡風」，故又有「太陽表實證」之稱
- 80 某18歲女性患者，就診時主訴面部多發痤瘡已經三個月。診查發現身材略胖，面膚色暗，痤瘡多為白頭粉刺，夾雜少許淡褐色丘疹與皮下結節。平時食慾不佳，容易胸悶與腹脹，排便多溏軟。容易口渴，喜冰飲。容易腰酸，常有白帶。苔薄白多津，脈沉細弦帶滑緩。依中醫辨證原則，其臨床診斷，應以下列何者最恰當？
(A)陽明內熱 (B)肝肺熱鬱 (C)脾虛，氣鬱痰阻 (D)心火上炎