

112年第二次專門職業及技術人員高等考試醫師中醫師考試分階段考試(第二階段考試)

代 號：2318

類科名稱：中醫師(二)

科目名稱：中醫臨床醫學(二)(包括中醫內科學、中醫婦科學、中醫兒科學)

考試時間：1小時30分鐘

座號：_____

※注意：本試題禁止使用電子計算器

※本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當答案。

1. 45歲女性患者，因近2個月咳嗽而就診，自訴長期夜班工作20多年，最近做心臟功能檢查有心房顫動現象，症見喘咳少氣、短氣自汗、口舌乾燥，脈細數。治以下列何方最適宜？

- A. 六味地黃湯
- B. 生脈散
- C. 二陳平胃湯
- D. 瀉白散

2. 55歲男性患者，長期中風臥床史，主訴3週前肺膿瘍並有咳嗽大量膿血痰，經抗生素治療後，咳嗽減少，痰轉清稀臭味亦淡，胸脅隱痛低熱，心煩口乾咽燥。診其苔薄舌紅，脈細數無力，X光顯示已無肺膿瘍但有少量積液，下列中醫治法何者最適宜？

- A. 清肺解表
- B. 清肺消癰
- C. 益氣解毒
- D. 養陰補肺

3. 承上題，治以下列何方最適宜？

- A. 沙參清肺湯
- B. 補肺湯
- C. 桔梗杏仁煎
- D. 生脈散

4. 下列有關痰飲之敘述，何者錯誤？

- A. 身體疼痛而沉重、甚則肢體浮腫、惡寒、無汗者，屬溢飲
- B. 咳逆喘滿不得臥、痰吐白沫量多、面浮跗腫者，屬懸飲
- C. 痰飲屬飲留胃腸證者，宜甘遂半夏湯
- D. 支飲屬脾腎陽虛證者，宜苓桂朮甘湯

5. 下列有關支氣管擴張症之敘述，何者最不適宜？

- A. 屬中醫「肺癰」之範疇

- B.發生於下葉者較上葉者為多
- C.臨床上常見咯吐膿痰，反覆出血
- D.可恢復至完全正常
- 6.歷代醫家中，關於心悸的論述，下列何者錯誤？
- A.宋·成無己認為心悸發生的原因不外「氣虛」、「停飲」二端
- B.元·朱丹溪提出血虛致病的理論
- C.唐·孫思邈提出因虛致悸的認識，並且以定心湯來治療
- D.清·唐容川，對溫病後期陰虛液耗所致的心悸，以生脈飲的基礎上，加減藥物來治療
- 7.60歲男性患者，高血壓10餘年，以西藥控制良好，來診時主訴為胸悶痛，病程近半年，每次痛約數秒鐘，胸痛會自行緩解，運動時胸痛不會發作，天氣變化也沒有影響，平素並有心悸不寧，頭暈，耳鳴，口乾渴，煩躁發熱，腰痠等症，視其面紅，舌紅有瘀斑，切其脈弦細，以下列何方加減治療最宜？
- A.參附湯合桂枝去芍藥湯
- B.血府逐瘀湯加細辛、桂枝、高良薑
- C.生脈散合歸脾湯加山藥
- D.左歸飲加當歸、丹參
- 8.56歲蕭先生，過去三十年長期應酬飲酒抽菸，最近開始心悸，胸痛如針刺，時作時止，運動加重，診其唇紫暗，舌質紫暗，脈澀，下列何方最適宜？
- A.炙甘草湯
- B.栝蒌半夏白酒湯
- C.桃仁紅花煎
- D.栝蒌薤白白酒湯
- 9.有關心臟衰竭的敘述，下列何者錯誤？
- A.本病初起病變尚輕，多與「心肺」兩臟有關；病久累及脾腎，則較嚴重
- B.若連休息時也會出現症狀，按紐約心臟協會標準委員會（NYHA）的嚴重度臨床分期為第四級
- C.心臟衰竭的理學症狀可見腹水、黃疸、肝腫大
- D.心臟衰竭的四肢水腫常是血液中白蛋白（Albumin）過低所導致
- 10.40歲女性，長期有喝冷泡茶的習慣，抱怨腹痛，大便艱澀，手足不溫，舌淡，苔白，脈沈弦，治以下列何方最適宜？
- A.濟川煎
- B.溫脾湯
- C.大建中湯

D.枳實導滯丸

11.胃痛的辨證論治，下列何者錯誤？

A.胃痛暴作，畏寒喜暖，口中和不渴，舌苔薄白，脈弦緊，屬於胃寒，可用良附丸治之

B.胃脘脹滿疼痛，噯腐吞酸，嘔後痛減，舌苔厚膩，脈滑，屬於胃熱，可用清中湯治之

C.胃脘脹滿，攻撐作痛，痛連兩脅，噯氣頻作，苔薄白，脈弦，屬於氣滯，可用柴胡疏肝散治之

D.脘痛拒按有定處，痛如針刺刀割，舌紫暗，脈澀，屬於血瘀，可用活絡效靈丹合失笑散治之

12.關於噎膈的類證鑑別，下列敘述何者正確？①噎膈與反胃皆有食入吐出的症狀，差別在於噎膈多為陽虛有寒，臨床表現為食尚能入，但經久復出，而反胃多為陰虛有熱，臨床表現則是吞嚥困難，阻塞不下，旋食旋吐 ②噎膈與梅核氣皆有咽中梗塞不舒的症狀，差別在於噎膈為有形之物瘀阻於食道，而梅核氣為無形之邪，無吞嚥困難及飲食不下的症狀 ③噎膈與關格皆有嘔吐症狀，而關格者，上則吐逆，下則二便閉塞不通

A.僅①②

B.僅②③

C.僅①③

D.①②③

13.37歲吳女士，主訴呃逆反覆，呃聲無力，氣不得續，脘腹不舒，喜溫喜按，面色㿯白，手足冷，舌淡紅，苔薄白，脈弱。下列證型何者最適當？

A.脾胃氣虛

B.脾胃陽虛

C.脾腎陽虛

D.脾胃陰陽俱虛

14.78歲林先生住加護病房數週，會診中醫；症見神智不清，利用鼻胃管進食，餵食後數小時鼻胃管反抽仍為灌食之食物，扣診脘部有鼓音，二便不通，脈微。下列證型何者最適當？

A.中土衰敗

B.氣陰兩虛

C.肝脾不和

D.食滯胃脘

15.55歲男性患者，肝指數較高，天門冬胺酸轉胺酶（AST）為100 U/L，丙胺酸轉胺酶（ALT）為153 U/L，來診主訴右脅肋脹悶感，走竄不定，疼痛每因情志變化而增減，胸悶不舒，飲食減少，噯氣頻作，苔薄，脈弦。治以下列何方最適宜？

A.一貫煎

B.旋覆花湯

C.柴胡疏肝散

D.龍膽瀉肝湯

16.35歲患者，飲酒暴食後突發上腹疼痛，目黃、膚黃、尿黃，食慾不振，噁心嘔吐，高燒不退，神智尚清楚，於急診照會中醫，舌苔黃膩，脈弦數。下列敘述何者錯誤？

A.可能診斷為胰臟炎或膽管炎

B.可能須進一步追蹤總膽紅素、澱粉酶（Amylase）、脂解酶（Lipase）以初步確認診斷

C.中醫診斷為黃疸

D.可比照濕熱型黃疸治療，處方以茵陳朮附湯

17.臨床上脅痛是指一側或兩側脅肋部疼痛，若症見脅痛口苦，胸悶納呆，噁心嘔吐，目赤或目黃身黃，小便黃赤。舌苔黃膩，脈弦滑數。下列證型何者最適宜？

A.氣滯濕阻

B.肝膽濕熱

C.水濕困脾

D.肝鬱氣滯

18.承上題，治以下列何方最適宜？

A.胃苓湯合柴胡疏肝散

B.柴胡疏肝湯

C.龍膽瀉肝湯

D.實脾飲

19.下列有關「關格」之敘述，下列何者正確？

A.嘔吐不止名曰關，小便不通名曰格

B.多見於水腫、癰閉、淋證等病證之初期

C.病變部位在腎與膀胱，但以腎為主

D.關格診斷須先出現嘔吐，而後小便不通

20.蔡先生來診主訴腰部以下冷痛感，好像背負著重物，覺得骨節痠痛，屈伸不利，麻痺不仁，天氣變化會加重症狀，苔白滑，脈濡緩，治以下列何法最適宜？

A.溫腎健脾，行水化濕

B.補腎溫陽

C.順氣活絡

D.益氣補血

21.一位長期飽受耳鳴所苦的病人前來求診，耳鳴聲音反覆，時輕時重，勞累加重，休息暫緩，四肢困倦，大便不成形，脈細弱，苔薄白膩，治以下列何方最適宜？

A.翹荷湯

B.滌痰湯

C.益氣聰明湯

D.耳聾左磁丸

22.治療關格病時使用之化濁法，下列何者為化痰濁之要藥？

A.黃芩

B.大黃

C.紅花

D.半夏

23.20歲林同學，因泌尿道感染前來求診，體溫攝氏39度，症見解尿灼熱感，尿量少，頻尿，後背腰部疼痛，頭痛，肌肉無力，噁心嘔吐，舌紅、苔黃膩、脈數。下列何方治療最適宜？

A.小蘗飲子

B.八正散

C.石葦散

D.知柏地黃丸

24.75歲退休王先生，因反覆性泌尿道問題就診，近主訴小便頻繁，尿色微紅，痛澀不顯，腰痠腿軟，舌淡紅，少苔，脈沉細數，治以下列何方最適宜？

A.八正散

B.導赤散

C.葦莖湯

D.知柏地黃丸

25.病患有癰閉症狀，若出現頭暈、目糊、胸悶、喘促、噁心、嘔吐、水腫，甚至昏迷、抽搐等症時，此轉歸為下列何病證？

A.臌脹

B.痿症

C.虛勞

D.關格

26.關格病，且表現有噁心、乾嘔，納呆、腹脹，經辨證之後為濕濁犯胃，受納失常，治以下列何方最適合？

A.理中丸

B.甘草乾薑茯苓白朮湯

C.小半夏湯

D.小建中湯

27.50歲更年期女性，近期出現身熱汗出，心胸煩悶，氣逆欲嘔，口乾喜飲，舌紅少苔，脈虛數，治以下列何方最適宜？

A.《醫宗金鑑》知柏地黃丸

B.《傷寒雜病論》竹葉石膏湯

C.《醫方集解》龍膽瀉肝湯

D.《疫疹一得》清瘟敗毒飲

28.下列關於系統性紅斑性狼瘡（SLE）的敘述，何者最不適宜？

A.急性發作期，紅腫熱痛者，多屬於熱痹

B.穩定期，皮色如常者，多屬於寒痹

C.本病病因以氣血陰陽失調為本，熱毒為標

D.誘發本病之熱毒可為日光強烈曝曬、藥物副作用、感染症等

29.承上題，其急性發作期之處方，下列何者最適宜？

A.三痹湯

B.白虎桂枝湯

C.烏頭湯

D.防風湯

30.下列關於「僵直性脊椎炎」的敘述，何者最不適宜？

A.英文原名：Ankylosing Spondylitis

B.中醫屬於「骨痹」、「腎痹」

C.好發的年齡在40歲以前，女多於男，比例為2~3：1

D.是一種原因不明的免疫性疾病，與類風濕性關節炎類似

31.承上題，關於該病之敘述，下列何者最不適宜？

A.常以半夜或清晨的下背疼痛為主要表現

B.體內抗體會攻擊自身組織，會影響脊椎及周邊關節活動

C.中醫認為其人正氣不足，因風寒濕熱之邪所致

D.現代醫學認為其以侵犯滑液膜為主

32.《醫宗金鑑·外科心法要訣》提到的「四彎風」，和現代醫學病名下列何者最相關？

A.異位性皮膚炎

B.乾癬

C.蕁麻疹

D.關節炎

33.臨床上常把糖尿病與中醫消渴連結，下列敘述何者最不適宜？

A.多飲、多食、多尿和消瘦為本病的基本臨床表現，且多項併發症是本病的另一特點

B.隨病情發展而出現小血管阻塞之併發症

C.有些老年人會出現癰疽、眼疾等併發症

D.會因免疫功能異常而致腎病變

34.56歲王先生患有糖尿病已15年，飯前血糖155mg/dL，糖化血色素7.2%，消穀善飢，口渴飲多，大便燥結，溲頻數，苔黃燥，脈滑有力，下列診斷何者最適當？

A.燥熱傷肺

B.胃火消中

C.陰虛及陽

D.腎虛火亢

35.承上題，下列治則何者最適當？

A.滋腎養陰

B.清胃潤燥

C.引火歸元

D.生津止渴

36.66歲王先生患有糖尿病已18年，飯前血糖165mg/dL，糖化血色素7.6%，常覺疲倦乏力，納差，便溏，口微渴飲不多，小便可，舌淡，脈弱，下列診斷何者最適當？

A.濕氣困脾

B.肺氣虛衰

C.脾胃氣虛

D.脾腎氣虛

37.承上題，下列處方何者較適宜？

A.麥門冬湯

B.六味地黃丸

C.消渴方

D.六君子湯

38.56歲男性患者，自訴失眠，難入睡，伴見胸悶噯氣，胃脹，腹脹，排便有時不暢，黏膩不淨感，苔膩，脈滑，平素喜食宵夜。治以下列何方最適宜？

A.蒼朮、陳皮、厚朴、甘草

B.黃連、黃芩、黃柏、梔子、酸棗仁

C.半夏、秫米

D.柴胡、半夏、人參、甘草，黃芩、生薑、大棗

39.關於失眠，下列敘述何者最適宜？

A.大病後失眠，可能為虛煩不眠，可用龍膽瀉肝湯

B.重鎮安神藥使用時須注意重金屬問題，例如鉛、鎘、汞等

C.患者如果已服用西藥安眠藥、抗憂鬱劑或抗焦慮藥物，服用中藥時須立即停用西藥

D.失眠日久，不會與記憶減退或老化相關

40.66歲患者，一年前突發右腦出血，現存左側肢體偏癱，痿軟無力，面色萎黃，口眼歪斜，口角流涎，舌質淡紫，苔白，脈細澀，治以下列何方最適宜？

A.鎮肝熄風湯

B.地黃飲子

C.補陽還五湯

D.牽正散

41.關於不寐提出「日午夜臥服」的服藥方法是那一位醫家？

A.巢元方

B.許叔微

C.張景岳

D.戴元禮

42.瘧病的臨床表現有項背強急，四肢抽搐，若是因為風家誤下、溫病誤汗、瘡家發汗而致瘧者，屬於下列何種病因？

A.邪壅經絡

B.熱甚發瘧

C.陰血虧損

D.陽亢風盛

43.35歲郭小姐，長期月經量大，研究工作長期忙碌飲食不定，近覺不易入眠，易醒，健忘，心悸，身倦，納差，大便軟散，診其唇淡，舌淡，苔薄白，脈細，下列何方最適宜？

A.四物湯

B.安神定志丸

C.天王補心丹

D.歸脾湯

- 44.患者自覺腹中有一物，有脹痛感，觸診發現左下腹有一腫塊，質地柔軟不堅，固著不移，望診舌質淡紅，苔薄白，脈弦。下列診斷何者最適宜？
- A.氣虛血瘀
 - B.肝氣鬱結
 - C.氣滯血阻
 - D.熱毒血瘀
- 45.研究生李男25歲，主訴常自覺有腹部條狀物斷續出現，伴有腹痛便秘，食後容易噯氣有食腐味，腹診可觸摸到條狀物聚起，重按脹痛加重，診其脈滑，舌苔厚膩。下列診斷何者最適宜？
- A.肝氣鬱滯
 - B.食滯痰阻
 - C.氣滯血瘀
 - D.濕熱下注
- 46.承上題，治以下列何方最適宜？
- A.三黃瀉心湯
 - B.六磨湯
 - C.大黃蟪蟲丸
 - D.調營飲
- 47.60歲魏先生罹患胃癌並接受長期化療，反覆出現全身水腫多年，按之沒指，小便短少，身體困重，胸悶，納差，噁心頻作，舌苔白膩，脈沉緩。證型以下列何者最適當？
- A.濕熱壅盛
 - B.濕毒侵淫
 - C.風水泛濫
 - D.水濕浸漬
- 48.54歲陳小姐，乳癌第四期，經過多年的治療，近來常會有心情抑鬱，情緒難控制，易怒易哭，吞咽不暢如有物梗的感覺，睡眠不佳，脅肋脹痛無定處。治以下列何方最適當？
- A.溫膽湯
 - B.甘麥大棗湯
 - C.柴胡疏肝散
 - D.滋水清肝飲
- 49.婦女「多產房勞、產育過多」，往往是造成月經病、帶下病、妊娠病等婦科疾病的原因，其中牽涉到的病機，下列何者最可能？①耗損氣血，致衝任虧損 ②肝經氣滯，氣血不和 ③腎氣虧損

A.僅①②

B.僅①③

C.僅②③

D.①②③

50.36歲陳女，14歲初潮，曾懷孕7次、自然產3次、自然流產2次、人工流產2次，平素月經規律，常覺腰痠腿軟，頭眩耳鳴，半年來因情緒不佳導致月經週期變化，經量或多或少，每次經期前7天開始乳房及少腹悶脹、心煩易怒，近期月經第一日日期如下：2022年2月12日、3月5日、4月19日、5月11日。她2022年7月5日因月經過期未至來診，二便正常，上次月經量少色黯，經行小腹悶脹，腰痠不適。現已乳房脹，小腹脹數日，診其面色無華，舌質淡，苔白，脈細弦。尿液妊娠試驗：陰性，超音波檢查未見子宮及附件異常。下列辨證，何者最宜？

A.腎氣不足

B.肝氣鬱結

C.肝腎虧損

D.肝鬱脾虛

51.醫師開立當歸3錢、熟地3錢、山茱萸2錢、炒杜仲3錢、山藥8錢、懷牛膝3錢、炙甘草1錢為丸，調治28歲黃小姐之月經病，3個月後收效，下列敘述何者最不適宜？

A.患者之初潮可能過遲

B.其經量通常過少，色黯淡而質薄

C.其經行少腹冷痛，喜按得熱則舒

D.症狀常併頭暈耳鳴，腰膝痠軟，舌淡，苔薄，脈沉

52.關於《傳青主女科》溫膈化濕湯的敘述，下列何者正確？①症狀有經水將來膈下先痛，經色如黑豆汁 ②適用於寒濕凝滯型痛經 ③對痛經而見畏寒便溏者最為適宜

A.僅①②

B.僅①③

C.僅②③

D.①②③

53.35歲患者，5年前生產後每逢經前頭痛如刺如灼，太陽穴抽痛嚴重，甚至會嘔吐，經行小腹痛，月經有血塊，經色紫黯，胸悶作脹，舌黯紅，尖有瘀點，脈弦澀。下列何項治則最適宜？

A.祛風化痰，理氣止痛

B.補氣治血，息風止痛

C.調氣活血，化瘀通絡

D.溫經散寒，祛瘀養血

54.承上題，最宜下列何方治療？

- A.《醫林改錯》通竅活血湯
- B.《金匱要略》溫經湯
- C.《和劑局方》川芎茶調散
- D.《醫林改錯》補陽還五湯

55.有關「更年期症候群」證屬腎陰陽兩虛之敘述，下列何者最不適宜？

- A.陽虛則怕冷、兩足不溫
- B.陰虛則烘熱，虛陽上升則頭眩耳鳴
- C.腎氣不足，故腰痠乏力
- D.為避免加重陰虛火旺，不可使用溫補腎陽藥物

56.30歲黃小姐，因月經3個月未潮來診，她身高160公分，近半年體重由68增至80公斤；醫師處方：當歸3錢、川芎3錢、陳皮4.5錢、半夏3錢、茯苓4.5錢、甘草3錢、蒼朮6錢、香附6錢、南星3錢、枳殼3錢、生薑2錢。下列何項患者的症狀是醫師的辨治依據之一？①形體肥胖，嘔惡痰多 ②帶下量多色白 ③胸脅脹滿，神疲倦怠

- A.僅①②
- B.僅①③
- C.僅②③
- D.①②③

57.一婦人因結婚多年不孕來診，經期先後不定，經前乳房脹痛，經來少腹悶，行而不暢，量少色黯，有小血塊，舌質黯紅，苔薄白，脈弦，下列辨證何者最適宜？

- A.痰濕
- B.腎虛
- C.血瘀
- D.肝鬱

58.依《醫宗金鑑·婦科心法要訣》陰挺之敘述，下列正確者有幾項？①屬虛者，必重墜小便清長 ②屬熱者，必腫痛小便赤數 ③屬虛者，宜補中益氣湯加青皮、山梔 ④屬熱者，宜龍膽瀉肝湯

- A.1
- B.2
- C.3
- D.4

59.依《金匱要略》關於「婦人臟躁」之敘述，下列有幾項正確？①症見喜悲傷欲哭，象如神靈所作，數欠伸 ②治宜清降心火 ③證見寒熱往來 ④屬熱入血室

A.1

B.2

C.3

D.4

60.35歲蔡女，月經過期不至1週，昨日妊娠試驗呈現陽性，陰道出血量少2天，色鮮紅，合併心煩不安，手心煩熱，口乾咽燥，小便短黃，大便秘結，舌質紅苔黃而乾，脈滑數。最宜下列何方治療？

A.《景岳全書》歸腎丸加茜草

B.《景岳全書》舉元煎加荊芥炭

C.《醫學衷中參西錄》壽胎丸加地榆炭

D.《景岳全書》保陰煎加苧麻根

61.下列何者不是臺灣民間俗稱「保產十三太保方」之組成？

A.厚朴

B.黃芩

C.川貝母

D.羌活

62.孕婦出現妊娠小便不通、甚至小腹脹急疼痛不得臥，下列病名何者最適當？

A.胞轉

B.子腫

C.惡阻

D.胞阻

63.依《傳青主女科》，產後出汗，不可即用斂汗之劑，若血塊作痛，應採下列何項步驟來止汗？

A.先服加參生化湯二、三帖，再繼服生化湯

B.先服生化湯二、三帖，再繼服加參生化湯

C.先服玉屏風散二、三帖，再繼服生化湯

D.先服生化湯二、三帖，再繼服加味補中益氣湯

64.依《醫宗金鑑·婦科心法要訣》小便頻數不禁淋瀝之論述，產後婦女小便頻數而白者，其因為何？

A.去血過多

B.產時傷胞

C.氣虛下陷

D.腎虛不固

65.依陳飛霞《幼幼集成》，下列有關指紋診法的敘述，何者錯誤？

A.浮主表

B.紅主熱

C.滯主實

D.命關為病重

66.3歲女童，咳嗽約3天，痰黃黏稠，不易咳出，口渴，鼻流濁涕，耳溫37.8°C，惡風，微汗出，舌苔薄黃、質紅，脈象浮數，治以下列何方最適宜？

A.桂枝湯

B.金沸草散

C.二陳湯

D.桑菊飲

67.關於小兒嘔吐的辨證特點，下列何者錯誤？

A.食入即吐多屬胃寒

B.吐出物味酸臭，多因乳食積滯

C.睡臥不寧，哭鬧不安，面色忽青忽白而吐者，多由驚恐

D.噯氣泛酸而吐者，屬於肝氣犯胃

68.依《醫宗金鑑·幼科雜病心法要訣》水腫門，小兒證見腰臍至兩足皆腫，病因脾經濕熱所成，內服下列何者正確？

A.豬苓湯

B.實脾飲

C.茯苓導水湯

D.沉香琥珀丸

69.5歲林小弟，3天前開始出現水腫，從眼瞼開始，繼而四肢及全身浮腫，來勢迅速，皮膚光亮，按之凹陷即起，小便少，時有尿血，合併發熱、惡風、咳嗽、肢體痠痛，苔薄白，脈浮，治以下列何方最適宜？

A.三妙丸合導赤散

B.麻黃連翹赤小豆湯

C.胃苓湯

D.真武湯

70.7歲的陳小妹，因近2週小便頻數遲遲沒有改善，由媽媽帶來看診，經診察發現其淋瀝不盡，尿液不清，精神倦怠，面色蒼黃，飲食不振，畏寒怕冷，手足不溫，大便稀薄，眼瞼微浮腫，舌質淡有齒痕，苔薄膩，脈細無力。治以下列何方最適宜？

A.葵子散《醫宗金鑑》

B.龍膽瀉肝湯《蘭室秘藏》

C.八正散《和劑局方》

D.縮泉丸《朱氏集驗方》

71.依《醫宗金鑑·幼科雜病心法要訣》，對於霍亂的敘述，下列何者錯誤？

A.濕霍亂，飲盛者，用二香飲

B.濕霍亂，暑盛者，用辰砂益元散

C.乾霍亂，煩渴大飲者為熱，用加味人參白虎湯

D.乾霍亂，厥逆不渴者屬寒，用理中湯

72.依《醫宗金鑑·幼科雜病心法要訣》，對於小兒暑病的敘述，下列何者錯誤？

A.中暑汗出身壯熱，頭痛大渴煩不寧，氣乏神倦兩足冷，用加味人參白虎湯

B.傷暑受暑感寒風，無汗熱渴面赤紅，乾噦噁心腹絞痛，嗜臥懶食肢重疼，用二香飲

C.暑風抽搐似驚風，煩渴汗熱便黃紅，先用加味香薷飲，繼用玉露散

D.暑厥昏眩不知人，氣虛挾痰上衝心，虛者以天麻鉤藤飲治之，實者以辰砂益元散合抱龍丸治之

73.依《醫宗金鑑·幼科雜病心法要訣》：「裏熱之證因內熱，遍身蒸熱小便紅，面赤唇焦舌燥渴」，脈實有力者，先治以下列何方最適宜？

A.白虎湯

B.調胃承氣湯

C.黃連解毒湯

D.竹葉石膏湯

74.依《醫宗金鑑·幼科雜病心法要訣》喘證門，風寒傷肺氣喘急，若肺虛外無風寒所傷，內無痰涎壅塞，惟氣逆喘急者，治以下列何方最適宜？

A.加味華蓋散

B.麥門冬湯

C.蘇子降氣湯

D.五虎湯

75.依《醫宗金鑑·痘疹心法要訣》：「疹發最怕毒火盛，熱昏心神譫妄生」，若疹已出而譫妄者，治以下列何方？

A.三黃瀉心湯

B.三黃石膏湯

C.竹葉石膏湯

D.黃連解毒湯

76.依《醫宗金鑑·幼科雜病心法要訣》，下列何者不包含在五遲之中？

- A.髮遲
- B.齒遲
- C.坐遲
- D.行遲

77.孕育33週出生的女嬰，體重2200公克，醫師診斷為五硬，脈症見哭聲低微、身冷僵硬，膚白腫亮、按之凹陷，唇白舌淡、脈沉遲，則下列治療何者最適宜？

- A.理中湯《傷寒論》
- B.當歸四逆湯《刪補名醫方論》
- C.參附湯《世醫得效方》
- D.桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯《金匱要略》

78.膀胱輸尿管逆流（Vesicoureteral reflux）依排尿膀胱尿道攝影檢查（contrast voiding cystourethrogram, VCUG）作為分類的依據，下列何者錯誤？

- A.第一級：逆流到輸尿管，輸尿管無擴張
- B.第二級：逆流到上集尿系統（upper collecting system），輸尿管無擴張
- C.第三級：逆流至擴張的輸尿管、腎盞鈍化（blunting of the calyceal fornices）
- D.第四級：大量逆流且有顯著的輸尿管擴張及扭曲（tortuosity）

79.下列何者不是目前已知常見誘發小兒第一型糖尿病之病毒？

- A.先天性德國麻疹
- B.腸病毒
- C.腮腺炎病毒
- D.呼吸道融合病毒

80.下列何者不是熱性痙攣復發的主要危險因子（major risk factors）？

- A.第一次發作時年齡小於1歲
- B.發熱24小時內即發作
- C.在體溫38～39℃時發作
- D.女性