

110年第二次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段考試、營養師、
社會工作師考試、110年專門職業及技術人員高等考試心理師、法醫師、
語言治療師、聽力師、牙體技術師考試、高等暨普通考試驗光人員考試試題

代號：1102
頁次：8-1

等 別：高等考試

類 科：中醫師（二）

科 目：中醫臨床醫學（一）（包括傷寒論（學）、溫病學、金匱要略、中醫證治學、
中醫診斷學）

考試時間：1 小時 30 分

座號：_____

※注意：（一）本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

（二）本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

（三）禁止使用電子計算器。

- 1 依《醫宗金鑑·傷寒論》條文所述，風溫可能出現的症狀，下列何者最不適宜？
(A)自汗出、身重 (B)發汗後、身灼熱 (C)口渴、不惡寒 (D)體痛、嘔逆
- 2 依《醫宗金鑑·傷寒論》太陽病，發汗後，大汗出，胃中乾，煩躁不得眠，脈浮，小便不利，微熱消渴者，治以下列何方最適宜？
(A)桂枝湯 (B)五苓散 (C)豬苓湯 (D)茯苓甘草湯
- 3 依《醫宗金鑑·傷寒論》所述：「傷寒發汗已解，半日許復煩，脈浮數者」，下列處置何者最適當？
(A)可更發汗，宜桂枝湯 (B)令自愈
(C)吐之愈，瓜蒂散主之 (D)宜麻黃湯
- 4 關於「傷寒若吐若下後，心下逆滿，氣上衝胸」若見下列脈證之治療處方，何者錯誤？
(A)脈浮緊，表仍不解，無汗、當用麻黃湯
(B)脈浮緊，表仍不解，有汗、當用桂枝湯
(C)起則頭眩，脈沉緊，發汗則動經，身為振振搖者，真武湯主之
(D)脈沉緊，不頭眩，以瓜蒂散吐之
- 5 關於霍亂的敘述，下列何者錯誤？
(A)夏秋最多，是風寒暑濕之邪，中人皆能病霍亂，非止一寒邪也
(B)若吐、利過甚，損傷上焦之氣，以致陰陽間隔，手足厥冷，脈微欲絕，不多飲水者，無分寒暑，皆宜四逆理中治之
(C)以飲食不節，寒熱不調，清濁相干，陰陽乖隔，而成霍亂
(D)夏月之時，復以冷風寒其形，冷水寒其胃，內外皆寒，風暑之邪，未有不乘虛入於陰經者
- 6 關於「藏結」之敘述，下列何者錯誤？
(A)按之痛，寸脈浮，關脈沉 (B)寸脈浮，關脈小細沉緊
(C)飲食如故，時時下利 (D)舌上白胎滑者，難治
- 7 依《醫宗金鑑·傷寒論》指出，大病瘥後，喜唾，久不了了，胸上有寒，下列何方治療最適當？
(A)理中丸 (B)小建中湯 (C)吳茱萸湯 (D)四逆湯
- 8 依《醫宗金鑑·傷寒論》指出，傷寒解後，虛羸少氣，氣逆欲吐，下列何方治療最適當？
(A)甘草瀉心湯 (B)黃耆建中湯 (C)竹葉石膏湯 (D)白虎加人參湯
- 9 依《醫宗金鑑·傷寒論》所述，問曰：「何緣得陽明病？」，其中太陽病，治療過程中，造成亡津液，胃中乾燥，因轉屬陽明，不更衣，內實，大便難者，此名陽明也。造成易傳變為陽明病承氣湯證的原因，下列何者最不適宜？
(A)誤用清熱法 (B)誤用下法 (C)治療時發汗過多 (D)治療時利小便太過

- 10 柴胡桂枝乾薑湯證之敘述，下列何者錯誤？
(A)少陽樞機不利，膽火內鬱，可導致三焦決瀆功能失常，水飲留結於中則胸脇滿微結
(B)水道失於通調，陽氣不得宣化，因而小便不利，為渴
(C)胃氣尚和，所以不嘔
(D)但頭汗出，乃是太陽表證
- 11 依《醫宗金鑑·傷寒論》所述：「陽明病，無汗，小便不利，心中懊憹者」，則會發生下列何種變證？
(A)攻其熱必噦 (B)久則譫語 (C)必苦頭痛 (D)身必發黃
- 12 依《醫宗金鑑·傷寒論》，有關抵當湯的運用，下列敘述何者錯誤？
(A)陽明證，其人喜忘者，必有蓄血。所以然者，本有久瘀血，故令喜忘。屎雖硬，大便反易，其色必黑者，宜抵當湯下之
(B)病人無表裏證，發熱七、八日，雖脈浮數者，可下之。假令已下，脈數不解，合熱則消穀善饑，至六、七日不大便者，有瘀血，宜抵當湯
(C)太陽病不解，熱結膀胱，其人如狂，血自下，下者愈。其外不解者，尚未可攻，當先解其外；外解已，但少腹急結者，乃可攻之，宜抵當湯
(D)太陽病，身黃，脈沉結，少腹硬滿，小便不利者，為無血也。小便自利，其人如狂者，血證諦，屬抵當湯
- 13 依《醫宗金鑑·傷寒論》：大汗出，熱不去，內拘急，四肢疼，又下利厥逆而惡寒者，下列何方主之？
(A)當歸四逆湯 (B)四逆散 (C)通脈四逆湯 (D)四逆湯
- 14 依《醫宗金鑑·傷寒論》少陰病，下利，咽痛，胸滿，心煩者，其病機為何？
(A)陰盛陽虛 (B)風熱實證 (C)熱邪下迫 (D)陰虛火炎
- 15 依《醫宗金鑑·傷寒論》少陰病，二三日不已，至四五日，腹痛，小便不利，四肢沉重疼痛，自下利者，其人或咳，或小便利，或下利，或嘔者，其病機為何？
(A)陽虛水泛 (B)瘀血內停 (C)痰食阻滯 (D)肝氣鬱結
- 16 關於太陰病之成因敘述，下列何者最不適宜？
(A)中陽不足，外受風寒，內傷生冷，太陰本身自病
(B)太陽病誤下，中傷邪陷，轉屬太陰
(C)陽明病清下太過，損傷脾陽
(D)太陽病發汗太過，轉屬太陰
- 17 依《醫宗金鑑·金匱要略》，關於瘧病，下列何者錯誤？
(A)太陽病，無汗而小便少，氣上衝胸，口噤不得語，葛根湯主之
(B)瘧為病，胸滿口噤，臥不得席，腳攣急，可與大承氣湯
(C)太陽病，身體強，几几然，脈反沉遲，栝蒌桂枝湯主之
(D)太陽病，發熱，脈沉而細者，大青龍湯主之
- 18 依《醫宗金鑑·金匱要略》，百合病下之後，治以下列何方？
(A)百合雞子湯 (B)百合地黃湯 (C)滑石代赭湯 (D)百合知母湯
- 19 依《醫宗金鑑·金匱要略》，下列敘述何者錯誤？
(A)諸肢節疼痛，身體尠羸，腳腫如脫，頭眩短氣，溫溫欲吐，桂枝芍藥知母湯主之
(B)病歷節不可屈伸，疼痛，烏頭湯主之
(C)寸口脈沉而弱，沉即主骨，弱即主筋，沉即為肺，弱即為腎，汗出入水中，如水傷心，歷節黃汗出
(D)盛人脈澀小，短氣，自汗出，歷節痛，不可屈伸，此皆飲酒汗出當風所致
- 20 依《醫宗金鑑·金匱要略》，傷寒八九日，風濕相搏，身體疼煩，不能自轉側，不嘔不渴，大便不堅，小便自利，脈浮虛而澀者，治以下列何方最適宜？
(A)桂枝附子湯 (B)麻黃附子湯 (C)白朮附子湯 (D)甘草附子湯

- 21 依《醫宗金鑑·金匱要略》，有關「射干麻黃湯」本方與「小青龍湯」的差異，下列敘述何者正確？
(A)射干麻黃湯治療痰飲，小青龍湯治療支飲
(B)射干麻黃湯治療眩暈，小青龍湯治療咳喘
(C)射干麻黃湯化寒飲祛痰，小青龍湯解表而蠲飲
(D)射干麻黃湯以乾薑溫肺，小青龍湯以乾薑和胃
- 22 依《醫宗金鑑·金匱要略》，有關腹滿之敘述，下列何者錯誤？
(A)病者腹滿，按之不痛為虛，痛者為實，可下之
(B)腹滿時減，復如故，此為熱，當與寒藥
(C)病腹滿，發熱十日，脈浮而數，飲食如故，厚朴七物湯主之
(D)腹滿不減，減不足言，當須下之，宜大承氣湯
- 23 依《醫宗金鑑·金匱要略》：「膈間支飲，其人喘滿，心下痞堅，面色黧黑，其脈沉緊，得之數十日，醫吐下之不愈，下列何方主之？」
(A)甘遂、半夏、芍藥、甘草
(B)防己、椒目、大黃
(C)芫花、甘遂、大戟、大棗
(D)木防己、石膏、桂枝、人參
- 24 依《醫宗金鑑·金匱要略》：「皮水為病，四肢腫，水氣在皮膚中，四肢聶聶動者，防己茯苓湯主之。其中防己茯苓湯組成不包含下列何藥？」
(A)白朮
(B)甘草
(C)桂枝
(D)黃耆
- 25 依《醫宗金鑑·金匱要略》條文與注解，關於「熱入血室」常見症候的敘述何者正確？
(A)婦人中風七八日，續來寒熱，發作有時，經水適斷，因血與熱搏，其血必結，故使如瘧狀，發作有時，故知：邪在少陽
(B)婦人傷寒，發熱無汗，經水適來，寒邪熱入血室，晝日明了，暮則譫語，如見鬼狀者，故知：邪在陽不在陰也
(C)婦人中風，發熱惡寒，經水適來，得之七、八日，熱除而脈遲，身涼，胸脅下滿，如結胸狀，譫語者，故知表解入裏，乘虛入血室
(D)陽明病，下血譫語者，此為熱入血室，血止熱不去，蓄於陽明，外越上蒸，導致但頭汗出
- 26 依《醫宗金鑑·金匱要略》所述，嘔而腸鳴，心下痞者，治以下列何方最適宜？
(A)吳茱萸、人參、生薑、大棗
(B)橘皮、竹茹、大棗、人參、生薑、甘草
(C)黃芩、炙甘草、芍藥、半夏、生薑、大棗
(D)半夏、黃芩、乾薑、人參、黃連、大棗、炙甘草
- 27 依《醫宗金鑑·金匱要略》有關嘔吐噦之敘述，下列何者最適當？
(A)患者胸中似喘不喘，似嘔不嘔，似噦不噦，徹心中憤憤然無奈者，百合知母湯主之
(B)諸嘔吐，穀不得下者，小半夏湯主之
(C)乾嘔，吐逆，吐涎沫，吳茱萸湯主之
(D)嘔家本渴，渴者為欲解，今反不渴，苓桂朮甘湯主之
- 28 依《醫宗金鑑·金匱要略》「嘔吐噦」的敘述，下列何者最適當？
(A)乾嘔、噦，若手足厥者，四逆湯主之
(B)橘皮湯主治脾寒氣逆之證
(C)噦逆，手足溫者，大半夏湯主之
(D)噦逆者，橘皮竹茹湯主之
- 29 溫病病變過程中可能產生痰飲，其產生的病機及治法，下列何者正確？
(A)病機可為病邪流連氣分，膀胱之氣化失司，導致津液無法正常布化而成痰飲
(B)病機可為熱邪內熾，熬煉津液而成痰濁，此屬痰熱互結
(C)若為痰濕內阻，臨床多見胸脘痞悶、泛噦欲嘔等，可於主治方中加入溫清飲之類治之
(D)若為痰熱壅肺，臨床症見咳嗽黃稠膿痰、苔黃黏膩等，治療宜於主治法中加入清肺化痰之品，如菖蒲、鬱金等

- 30 濕熱病後或溫病瘥後，邪熱雖已解除，但患者身體多未恢復正常狀態。下列患者的瘥後調理敘述，何者最正確？
(A)濕熱病後出現脘悶不暢，知飢不食，舌苔薄白微膩等症，此是餘邪未盡，當繼續以王氏連朴飲治之
(B)濕熱病後出現飲食不消，大便溏薄，四肢無力，舌苔薄白，脈虛弱等症，當以益胃湯調理
(C)溫病瘥後出現口乾，咽燥，唇裂，大便乾結等症，當以薛氏五葉蘆根湯調理
(D)溫病瘥後出現面色少華，氣虛倦怠，語音低微，舌質淡紅，脈虛無力等症，當以集靈膏調理
- 31 「溫病」一詞首見於下列何書？
(A)《傷寒論》 (B)《金匱要略》 (C)《內經》 (D)《難經》
- 32 根據歷代醫學文獻之敘述，對於溫疫的解釋，下列敘述何者錯誤？
(A)《溫疫論》中指出：「其年疫氣盛行，所患為重，最能傳染」
(B)溫疫是指溫病中具有強烈傳染性並引起流行的一類疾病
(C)在疫病中除了溫疫之外還有寒疫
(D)按《辭源》：「瘟，疫病。人或牲畜家禽所生的急性傳染病」，因而瘟疫與溫疫的概念是相同的
- 33 就溫病的診法而言，下列何者主要反映「衛分和氣分」的病變？
(A)舌苔 (B)舌質 (C)發疹 (D)神識
- 34 依《溫病條辨》，太陰溫病，發汗而汗不出或汗出過多，所引發後遺症的治方及用藥禁忌，下列何項錯誤？
(A)汗不出發斑者，化斑湯主治
(B)汗不出發疹者，銀翹散去豆豉，加細生地、丹皮、大青葉、倍元參主治
(C)斑疹治療禁用升麻、柴胡、當歸、防風、羌活、白芷、葛根、三春柳
(D)汗出過多必神昏譫語，生脈散合牛黃丸主治
- 35 風溫邪熱，傳入陽明，下列敘述那些最正確？①無形熱盛，熱熾陽明，症見壯熱面赤、惡寒、心煩、汗大出，苔黃而燥，渴喜涼飲，脈洪大 ②熱結旁流，利下純稀水，屬於腸中燥結熱實 ③下利多惡臭稀水，腹部按之作痛，為肺熱下移腸腑，腸熱迫注，宜用葛根芩連湯苦寒清熱止利 ④身熱自汗、面赤、神迷，身重難以轉側，多睡眠，鼻鼾，言語難出，苔黃而燥，脈數，宜用竹葉石膏湯泄熱救津
(A)①② (B)①③ (C)②④ (D)③④
- 36 吳鞠通所說的「少陰溫病真陰欲竭、壯火復熾」之證，最宜用下列何方藥治療？
(A)炙甘草、乾地黃、白芍、麥冬、阿膠、麻仁
(B)青蒿、鱉甲、細生地、知母、丹皮
(C)炙甘草、乾地黃、白芍、麥冬、阿膠、龍骨、牡蠣
(D)黃連、黃芩、阿膠、芍藥、雞子黃
- 37 溫熱邪氣內陷，痰熱內閉心包，陽氣暴然外脫，脈散大，氣促如喘，治宜清心開竅，固脫救逆，下列何方最適宜？
(A)安宮牛黃丸合大定風珠 (B)安宮牛黃丸合加減復脈湯
(C)安宮牛黃丸合參附湯 (D)安宮牛黃丸合清宮湯
- 38 下列何者為白虎加人參湯在暑溫病使用之時機？
(A)暑傷氣營 (B)津氣欲脫 (C)暑入陽明胃 (D)暑濕困阻中焦
- 39 春溫見高熱，煩渴，手足躁擾，甚則狂亂，神昏瘡厥，或見頸項強直、角弓反張，舌紅苔黃，脈象弦數，宜用下列何方藥治療？
(A)羚角鉤藤湯加味 (B)至寶丹 (C)白虎湯加味 (D)增液承氣湯

- 40 有關濕溫病中，濕濁蒙上、泌別失職之證型，其相關症狀或治療的敘述，下列何者錯誤？
(A)熱蒸頭脹，嘔逆神迷，小便不通，渴不多飲，舌苔白膩
(B)中焦濕濁久困所致之蒙上流下之證
(C)可先與芳香開竅，繼用淡滲分利
(D)應用雷氏芳香化濁法
- 41 濕溫患者，邪留少陽三焦，出現寒熱起伏，胸悶，脘痞，腹脹，溲短，苔膩等證候，下列何方劑治療最適宜？
(A)黃連溫膽湯 (B)大柴胡湯 (C)王氏連朴飲 (D)黃芩滑石湯
- 42 有一患者病秋燥，症見耳鳴、目赤、齁腫、咽痛，苔薄黃而乾，脈數，下列何組處方用藥最不適宜？
(A)銀花、連翹、桔梗、薄荷、竹葉、生甘草、淡豆豉、牛蒡子、荊芥穗
(B)杏仁、紫蘇葉、半夏、陳皮、前胡、甘草、桔梗、枳殼、茯苓、生薑、紅棗
(C)連翹、生甘草、薄荷、桔梗、黑梔皮、綠豆皮
(D)桑葉、杏仁、連翹、薄荷、菊花、桔梗、生甘草
- 43 關於「大頭瘟」的診斷要點及證候，下列何者錯誤？
(A)頭面部焮赤腫痛 (B)起病急
(C)發熱但不憎寒 (D)舌赤苔黃，脈數實
- 44 下列關於「秋季溫燥，病至後期燥熱漸退而肺胃津傷未復」證治之敘述，何者錯誤？
(A)外邪漸淨而未盡，故可見身熱而熱不甚之症
(B)肺陰傷故乾咳痰少，胃陰傷故口乾舌燥
(C)本證治則與「風溫」之肺胃陰傷相同，唯津傷甚時可合以五葉蘆根湯
(D)全證以津傷為主，而燥熱已輕，故宜甘寒滋潤，清養肺胃
- 45 有關中風的敘述，下列何者正確？
(A)中風急性期區分為中經絡與中臟腑，如《金匱要略》所言「邪在於經，肌膚不仁；邪在於絡，即重不勝；邪入於腑，即不識人；邪入於臟，舌即難言，口吐涎。」
(B)中臟腑的主要臨床表現為突然昏仆，不省人事，半身不遂等，但有閉證和脫證的區別
(C)閉證為陽閉於內，無法外達，症見牙關緊閉，口噤不開，兩手握固，二便不通，肢體強瘳，多屬實證，急宜宣通陽氣
(D)脫證為陰脫於外，無法收斂，症見目合口開，鼻鼾息微，手撒遺尿，為五臟之氣衰弱欲絕，多屬虛證，急宜固攝陰氣
- 46 有關眩暈的敘述，下列何者最正確？
(A)眩暈多屬於心的病變，應先著重活血化瘀的治療為主
(B)眩暈發生在老年人為多
(C)眩暈之發生，屬於實證居多，可見肝火上炎證型
(D)《千金要方》首先提出風、熱、痰致眩的論點
- 47 李先生脅肋脹痛，走竄不定，胸悶不舒，下列選項何者正確？①屬肝氣鬱結之脅痛 ②屬肝膽濕熱之脅痛 ③宜柴胡疏肝散主之 ④宜龍膽瀉肝湯主之
(A)①③ (B)①④ (C)②③ (D)②④
- 48 明·李中梓《醫宗必讀·不得臥》中提到「不寐之故，大約有五……」，下列敘述何者不包括在內？
(A)一曰氣虛，六君子湯加酸棗仁、黃耆
(B)一曰水停，輕者六君子湯加菖蒲、遠志、蒼朮，重者控涎丹
(C)一曰痰滯，溫膽湯加南星、酸棗仁、雄黃末
(D)一曰血瘀，血府逐瘀湯加酸棗仁、遠志

- 49 有關真心痛的敘述，下列何者錯誤？
(A)心胸持續疼痛，可達數小時或數天不止者，病情更重
(B)疼痛劇烈，可引及肩背、咽喉、腕腹等處
(C)真心痛的治療原則，不外「補、通」，以現代的觀點，通乃是預防血栓的形成
(D)真心痛常動輒汗出，若汗出，乃風邪已去，漸為好轉
- 50 有關癲癇敘述，下列何者錯誤？
(A)癲癇形成的病因以痰邪作祟最為重要
(B)出生時難產，導致顱腦受傷是病因之一
(C)突然昏仆、反復發作是癲癇證發病之特徵之一
(D)陽癇之治療以調理陰陽為主，宜採取補益氣血之法
- 51 有關呃逆、噯氣的敘述，下列何者錯誤？
(A)呃逆俗稱打嗝，古稱是指氣逆上衝出於喉間，是由胃氣上逆動膈而成
(B)噯氣又稱為「噯」，是胃之濁氣上逆、聲短而頻、不能自止的病證
(C)噯氣的形成，與水穀不能消化、陳滯宿積不化之氣上逆有關
(D)呃逆的病因病機，有胃積寒而氣逆、有胃熱而胃火上衝、有胃痰阻而氣逆、也有脾胃陽虛、或胃陰不足所致
- 52 便血色紅或紫黯，食少體倦，面色萎黃，心悸，少寐。舌質淡，脈細。治以下列何方最適宜？
(A)槐花散 (B)黃土湯 (C)歸脾湯 (D)地榆散
- 53 有關腹痛之敘述，下列何者錯誤？
(A)腹痛的範圍是指胃脘以下，恥骨毛際以上的部位發生疼痛
(B)虛寒性的腹痛可考慮以天香正氣散治療
(C)腹中拘攣，繞臍疼痛，冷汗出，怯寒肢冷，脈沉緊者，名為「寒疝」
(D)腹痛經久不癒。症見痛如針刺，痛處固定不移而拒按，可用少腹逐瘀湯治療
- 54 陳同學近來傷風咳嗽，下列辨證思路何者最正確？
(A)咳嗽聲重有力，痰稀薄，為痰濕蘊肺
(B)乾咳作喘，痰黏、少，為痰濕蘊肺
(C)氣逆作咳，咽中伴有痰滯感為寒飲伏肺
(D)咳嗽氣粗或咳聲嘶啞，痰黏稠或黃為風熱犯肺
- 55 有關喘證的敘述，下列選項何者正確？①喘而呼吸深長，面赤身熱，臉面浮腫，為實證 ②一般受寒或飲食不當而喘者，多屬於虛證 ③痰色黃，稠黏，咳吐不利，口渴引冷，屬熱證 ④呼吸微弱淺表，呼多吸少，慌張氣怯，舌質淡，屬虛證
(A)①② (B)①④ (C)②③ (D)③④
- 56 感冒是由於六淫、時行病毒侵襲人體而致病，往往與當令之時氣相合而傷人，下列何者正確？
(A)春季易受風熱，怕冷重、發熱輕 (B)夏季多夾暑，身熱有汗、心煩口渴
(C)秋季多夾燥邪，胸悶、骨節疼痛 (D)冬季多屬風寒，鼻燥咽乾，乾咳無痰
- 57 某日吳同學在上課中打了噴嚏，伴隨著鼻涕，下列辨證何者最不適當？
(A)清涕是風寒及體虛衛氣不固 (B)涕黃黏為風寒化熱
(C)黏涕量多不斷，為寒濕阻滯，濁氣瀰漫 (D)涕中夾血，多為燥火上乾
- 58 有關淋證的敘述，下列何者錯誤？
(A)淋證的證候虛實可根據病程長短、有無尿痛、小便色澤及全身整體的陰陽失調情況來判定
(B)尿色淡紅1年，小便頻數，溲時疼痛澀滯不甚顯著，眩暈耳鳴，腰膝痠軟，五心煩熱，虛煩不眠，舌紅，少苔，脈細數，治以小蓳飲子合導赤散
(C)50歲女性，10年前曾接受子宮全切除的手術，主訴術後出現少腹墜脹，尿有餘瀝，面色晄白，舌淡，脈虛細無力，治以補中益氣湯
(D)60歲男性，主訴小便混濁多年，淋出如脂，澀痛反見減輕，伴見形瘦，頭昏，乏力，腰膝痠軟，舌淡，苔膩，脈細弱無力，治以膏淋湯

- 59 50歲女性，停經2年，西醫診斷骨質疏鬆症，主訴腰膝痠軟多年，怕冷，手足冰涼，面色㿠白，小溲清長，舌淡，脈沉細無力，治以下列何方最適當？
(A)《景岳全書》泰山磐石散 (B)《景岳全書》左歸丸
(C)《金匱要略》腎氣丸 (D)《傷寒雜病論》腎著湯
- 60 有關陽痿的敘述，下列選項何者正確？①由於恣情縱慾、思慮、憂鬱、驚恐所傷者，多為脾腎虧虛，命門火衰，屬於虛證；由於肝鬱化火，濕熱下注，宗筋弛縱者，屬於實證 ②命門火衰者，陽氣既虛，真陰多損，宜用剛熱燥澀之劑；濕熱下注者，治用苦味堅陰，淡滲去濕 ③45歲男性，西醫診斷男性不孕症（精子過少症），主訴早洩多年，伴見面色㿠白，頭暈目眩，精神萎靡，腰膝痠軟，苔薄白，脈沉細，治以補腎溫陽，處方為《攝生眾妙方》五子衍宗丸 ④55歲男性，主訴性功能低下多年，伴見精神不振，面色不華，心悸怔忡，健忘失眠，舌淡，苔薄白，脈細緩，治以補益心脾，處方為《濟生方》歸脾湯
(A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④
- 61 遺精、勞甚輒發、肢體困倦、食少便溏、面色萎黃、失眠健忘、心悸怔忡、舌淡、苔薄、脈弱，治宜下列何方？
(A)妙香散 (B)六味地黃丸 (C)桑螵蛸散 (D)黃連清心飲
- 62 18歲女性，主述時時汗出，汗出量多，兼隨著心悸，睡眠時間短，易醒後不能再眠，精神疲憊，呼吸氣短，面色蒼白，舌質淡，脈細，下列診斷及其治療何者正確？
(A)心血不足，方用歸脾湯 (B)肺衛不固，方用桂枝湯
(C)陰虛火旺，方用當歸六黃湯 (D)邪熱鬱蒸，方用龍膽瀉肝湯
- 63 《丹溪心法·消渴》治消渴應當以下列那些為主？①補氣 ②養肺 ③降火 ④生血
(A)僅①③ (B)僅②④ (C)①②③ (D)②③④
- 64 《諸病源候論》對於「歷節風」之描述，有「……自汗出，歷節疼痛不可忍，屈伸不得是也。……」其中自汗出之原因，下列何者正確？
(A)血氣虛 (B)衛氣強 (C)濕熱盛 (D)風冷盛
- 65 52歲男性，發病時因為怕冷、頭痛、打噴嚏、流鼻水等感冒症狀至診所就醫，雖服藥治療，而後卻出現發燒攝氏39度、咳嗽、胸悶痛、咳出鐵銹色痰，胸部X光發現右肺下葉片狀浸潤。經送急診以抗生素控制後住院，住院7日後發燒漸退，但卻出現疲倦、右胸悶痛，頻頻咳出黃稠味腥臭的大量痰液，苔黃厚，脈弦滑數。痰液培養出現革蘭氏陰性菌。因持續使用抗生素效果不佳，只得以胸管引流。至此際，病人臨床症狀的辨證以下列何者最適宜？
(A)風寒外束 (B)痰濁壅肺 (C)肺熱釀膿 (D)痰瘀胸痹
- 66 62歲男性，來診時主訴陣發胸悶心悸已經5年。某醫學中心24小時心電圖檢查發現每日有頻發性心室早期收縮（VPC）達16,000次，占總心律11.7%。雖有服西藥控制，胸悶心悸仍每日發作，尤其是在飽食後或運動後更易發作，影響食慾。望之面色黃白少華，體瘦，問之平時因擔心病情未能順利控制，心情憂鬱多思慮，食慾減退，但睡眠尚可。因心律不整，導致不敢多吃，近5年來體重下降近7公斤。苔薄少，脈沉細弦無力。綜合上述臨床表現，下列病機何者最不適宜？
(A)心氣虧虛 (B)心脾兩虛 (C)肝鬱脾虛 (D)肝火擾心
- 67 關於望診，下列敘述何者最不適宜？
(A)腮腫是腮部突然腫起，面赤咽痛，是溫毒證
(B)水疝是陰囊腫大，用光線照射呈透明
(C)望唇系帶診法，是根據上唇系帶的小白點，來診斷積滯
(D)瘰癧是在頸側頰下，腫塊如壘，累累如串珠，多由肺腎陰虛，或感受風火時毒

- 68 頸脈動明顯又稱「大筋起落」，最有助於下列何病之診斷？
(A)水病 (B)氣病 (C)熱病 (D)筋病
- 69 關於舌苔之觀察，下列敘述何者最不適宜？
(A)染苔為外物沾染，與病理無關
(B)舌苔白薄而潤，舌質淡紅，合併惡寒等症，多見於風寒外感初起
(C)外感熱症多見於舌苔白薄而乾，舌質較紅
(D)寒濕積滯常見白粉鋪舌，刮之則去
- 70 若患者見黃苔，則下列辨證何者最適宜？
(A)邪在太陽 (B)邪在少陽 (C)邪在陽明 (D)邪在太陰
- 71 舌診若見光滑舌，則為下列何者萎縮所致？
(A)絲狀乳頭及輪廓乳頭 (B)絲狀乳頭及蕈狀乳頭
(C)蕈狀乳頭及輪廓乳頭 (D)輪廓乳頭及葉狀乳頭
- 72 以寒熱的輕重來觀察邪正盛衰，下列敘述何者最不適宜？
(A)邪氣外襲，體表必先惡寒，陽氣不能發泄，因而發熱
(B)邪輕正盛，惡寒輕而發熱重
(C)邪正都盛，惡寒發熱都重
(D)邪盛正衰，惡寒重而發熱輕
- 73 關於脈象之敘述，下列何者最不適宜？
(A)緊脈：脈來繃急，狀如牽繩轉索 (B)牢脈：沉按實大弦長
(C)結脈：脈來一止，止有定數，良久方來 (D)濡脈：浮而細軟
- 74 一位2歲女童前來就診，關於下列診脈分析，何者最不適宜？
(A)一息七至為數脈，多為熱證
(B)脈氣止於中候，重按不見，乃腎氣未充所致
(C)小兒臨診驚哭，診脈當配合形色、食指絡脈等合參
(D)脈象沉滑，可能與痰食相關
- 75 下列何者屬內風的範疇？
(A)破傷風 (B)周邊顏面神經麻痺 (C)手足震顫 (D)關節痛
- 76 依《黃帝內經·素問》，善診者，察色按脈，先別何者？
(A)氣血 (B)寒熱 (C)表裏 (D)陰陽
- 77 關於太陽經頭痛，下列敘述何者最適宜？
(A)前額部反覆頭痛，鼻塞流涕 (B)顛頂部頭痛，並有想吐的感覺
(C)月經來時左顳部抽痛，身體煩熱 (D)突然發燒惡寒，頭頂至後腦勺痛
- 78 以六經辨證而言，那一階段屬「陽氣亢盛，邪從熱化最盛」？
(A)太陽病 (B)少陽病 (C)陽明病 (D)厥陰病
- 79 17歲男性患者在過年出國旅遊回來後，出現咳喘，痰液稀白，形寒肢涼，無發熱，舌淡苔白，脈遲緩，下列診斷何者最適宜？
(A)痰濕阻肺 (B)飲停於肺 (C)寒邪客肺 (D)風寒束肺
- 80 46歲中年男性，體格壯實，主訴口臭便秘，胃痛灼熱感，平素口渴喜冷飲，偶見牙齦出血，下列敘述何者最不適宜？
(A)可診斷為胃陰虛證 (B)若合併吞酸嘈雜，多與肝經鬱火橫逆侮土有關
(C)牙齦出血，乃火循胃絡上攻於齦 (D)常合併有善飢的臨床表現