

110年第二次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段考試、營養師、
社會工作師考試、110年專門職業及技術人員高等考試心理師、法醫師、
語言治療師、聽力師、牙體技術師考試、高等暨普通考試驗光人員考試試題

代號：2102
頁次：6-1

等 別：高等考試

類 科：中醫師（二）

科 目：中醫臨床醫學（二）（包括中醫內科學、中醫婦科學、中醫兒科學）

考試時間：1 小時 30 分

座號：_____

※注意：（一）本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

（二）本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

（三）禁止使用電子計算器。

- 1 56歲女性因長期支氣管咳喘反覆發作，最近因胸悶呼吸不暢就診，肺功能檢查FEV1/FVC：58%。症見喘促短氣，氣怯聲低，喉有鼾聲，自汗、畏風，舌質淡紅，脈軟弱。治以下列何方最宜？
(A)麥門冬湯 (B)金匱腎氣丸 (C)七味都氣丸 (D)補肺湯
- 2 急、慢性喉炎均可能導致失音，下列關於中醫辨證論治，何者錯誤？
(A)風寒鬱閉證，治以金沸草散 (B)風熱上壅證，治以清咽寧肺湯
(C)氣鬱阻肺證，治以柴胡疏肝湯 (D)肺腎陰虛證，治以當歸六黃湯
- 3 下列有關咳嗽診治之敘述，何者錯誤？
(A)內傷咳嗽，常邪實與正虛併見
(B)張景岳倡「六氣皆令人咳，風寒為主」
(C)肺腎陽虛咳嗽而痰清稀有泡沫者，以宣肺蠲飲化痰為主
(D)咳嗽可能病延及腎，由咳至喘，宜納腎平喘
- 4 40歲方女士，國小開始有氣喘病史，反覆發作，近日入冬進入發作期，出現咽塞、喉中痰鳴如鼾、咳痰清稀、氣短不足以息、動則氣短難續、汗出肢冷，舌苔淡白，脈沉細，治以下列何方最適合？
(A)七味都氣丸 (B)玉屏風散 (C)蘇子降氣湯 (D)小青龍湯
- 5 40歲男性，吃了麻辣鍋後出現脘腹脹滿，噯腐吞酸，腹痛拒按，便秘，解大便後腹痛略減，舌苔黃膩，脈滑實，治以下列何方最適宜？
(A)《濟生方》橘核丸 (B)《內外傷辨惑論》枳實導滯丸
(C)《蘭室秘藏》枳實消痞丸 (D)《金匱要略》厚朴七物湯
- 6 關於痰飲病診斷的臨床特徵，下列何者錯誤？
(A)昔瘦今肥，腸間漉漉有聲 (B)口渴飲水，水入即吐
(C)咳逆倚息不得臥 (D)飲水流行歸於四肢，當汗不汗，身體疼重
- 7 50歲男性患者，職業為上市公司高階主管，工作壓力大，應酬多，常晚睡（凌晨2點），又因工作必須早起（早上6點），常需以咖啡提神，主訴為心悸、心神不寧、心慌近1個月，發作時心臟會有突然暫停一下的感覺，並有胸悶氣短，頭暈，自汗，盜汗等症狀，視其舌紅少苔，切其脈細數，偶不整脈，以下列何方藥治療最適宜？
(A)安神定志丸加柏子仁、五味子、玉竹、天冬、酸棗仁
(B)苓桂朮甘湯加澤瀉、豬苓、車前子、陳皮、半夏
(C)黃連溫膽湯加珍珠母、龍齒、牡蠣、石決明、玉竹
(D)炙甘草湯加柏子仁、酸棗仁、茯神、遠志、五味子
- 8 40歲女性，西醫診斷為紅斑性狼瘡多年，近日症見頭痛目赤，脇痛口苦，小便淋濁，筋萎陰汗，治以下列何方最適宜？
(A)知柏地黃丸 (B)清營湯 (C)龍膽瀉肝湯 (D)青蒿鱉甲湯
- 9 56歲蔣先生罹患慢性腎病變已多年，近來身腫，腰以下為甚，按之凹陷不易恢復，脛腹脹悶，納減便溏，面色萎黃，神倦肢冷，小便短少，舌質淡，苔白膩，脈沉弱。治以下列何方最適合？
(A)胃苓湯 (B)真武湯 (C)實脾飲 (D)六味地黃丸
- 10 62歲許女士就診時主訴胸痛如刺，或絞痛陣作，痛有定處，且痛引肩背、左臂，胸悶如窒，舌紫暗，脈弦或有歇止。診斷以下列何者最適合？
(A)氣虛血瘀 (B)痰瘀交阻 (C)肝鬱氣滯 (D)氣滯血瘀

- 11 馬阿姨有失眠的問題，平時易胸悶心煩，噯氣，頭暈重，苔黃膩，脈滑數，以下列何方治療最適宜？
(A)龍膽瀉肝湯 (B)黃連阿膠湯 (C)溫膽湯 (D)酸棗仁湯
- 12 36歲男性，酗酒史，突然上腹急痛，痛感強烈轉移到背後、臥睡痛可減輕，腹脹，有噁心嘔吐，口乾口苦，小便黃赤、大便硬不易解，舌紅，苔黃燥、脈弦數，下列證型何者最適宜？
(A)脾胃實熱 (B)濕熱壅滯 (C)肝鬱氣滯 (D)熱毒血瘀，陽明熱結
- 13 承上題，下列方藥何者最適宜？
(A)茵陳蒿、黃連、龍膽草、枳實、延胡索、大黃、柴胡、木香、山梔子、黃芩
(B)柴胡、黃芩、延胡索、大黃、黃連、枳實、厚朴、芒硝、白芍
(C)柴胡、枳實、延胡索、鬱金、白芍、陳皮、厚朴、半夏、木香
(D)川芎、丹參、紅花、赤芍、桃仁、金銀花、連翹、蒲公英、紫花地丁、敗醬草
- 14 48歲陳女士，平時食量少，面色萎黃，神疲倦怠，主訴近日若稍吃較油膩的食物或飲食量稍多，食後就覺脘悶不舒，且大便次數明顯增多，甚至泄瀉，一日數行，大便內常伴有不消化食物，遷延反覆，舌淡苔白，脈細弱，治以下列何方最適宜？
(A)平胃散 (B)參苓白朮散 (C)安中散 (D)藿香正氣散
- 15 失眠，張仲景對不寐提出許多臨床診治經驗，其中對於汗下後導致之晝日煩躁不得眠，夜而安靜，不嘔不渴，無表證，脈沉微，身無大熱者，治以下列何方最適宜？
(A)酸棗仁湯 (B)梔子豉湯 (C)黃連阿膠湯 (D)乾薑附子湯
- 16 65歲男性慢性B型肝炎和肝硬化多年，半年前出現腹大堅滿，脘腹撐急，叩診：shifting dullness (+)，捫之灼手，煩熱口苦，渴不欲飲，大便秘結，溲赤澀，面目皮膚發黃，舌紅，苔黃膩灰黑，脈弦數。AST：250 IU/L、ALT：146 IU/L、Albumin：2.9 g/dL、T-Bil：12.50 mg/dL。下列證型何者最適宜？
(A)氣滯濕阻 (B)濕熱蘊結 (C)熱傷血絡 (D)肝脾血瘀
- 17 承上題，治以下列何方最適宜？
(A)調營飲 (B)附子理中湯 (C)實脾飲 (D)茵陳蒿湯
- 18 肝硬化之患者，若出見神志昏蒙，同時身體有特殊氣味，此和下列何種物質升高最有關？
(A)胎兒蛋白 (B)氨 (C)膽紅素 (D)谷氨酸丙酮酸轉氨酶 (GPT)
- 19 急黃，亦稱瘟黃，症見起病急，高熱神昏譫語，黃疸迅速加深，衄血斑疹，舌紅絳，朱點熾盛，苔黃燥。其病機為下列何者最適宜？
(A)濕熱燠蒸 (B)寒濕阻滯 (C)風熱逆傳心包 (D)濕熱毒盛
- 20 劉先生，感覺最近小便減少，說話有氣無力，臉色蒼白，嘴唇指甲蒼白，下午特別會腳水腫，胃口常不好，而且有噁心的症狀，脈濡細，舌質淡紅，苔薄白。治以下列何方最適宜？
(A)右歸飲 (B)小半夏湯 (C)理中丸 (D)黑錫丹
- 21 關於關格的治療原則，下列敘述何者錯誤？
(A)大黃是降濁要藥，用藥後大便以每日2~3次為妥，通潤為度
(B)半夏是化痰濁要藥，當濁重傷元氣，急宜製用，配生薑
(C)脾腎虛弱階段應以補為主，兼用化濁利水
(D)濁邪壅盛三焦階段，應補中有瀉，補瀉並重，瀉後即補
- 22 《內經》論述耳聾的致病原因，下列何者易引起暴聾？
(A)氣不足 (B)少陽厥 (C)腎精脫 (D)髓海虛
- 23 65歲劉先生腎功能衰竭就診，症見全身水腫，伴隨胸水腹水，面色㿔白，皮膚光亮，畏寒肢冷、腰腿痠疼，倦怠肢軟，舌體胖大而潤，苔白，脈沉滑弱。下列證型何者最適宜？
(A)氣陰兩虛 (B)脾氣虛弱 (C)脾腎陽虛 (D)肝腎陰虛
- 24 承上題，治以下列何方最適宜？
(A)知柏地黃丸 (B)五苓散 (C)參苓白朮散 (D)金匱腎氣丸
- 25 52歲劉先生，主訴腰部疼痛，痛處常伴隨灼熱感，艷陽天或陰雨天則疼痛加劇，但稍加活動後症減，口乾，小便短赤，苔黃膩，脈弦數，下列治法何者最適宜？
(A)活血化瘀、行氣止痛 (B)瀉火清熱、順氣豁痰
(C)滋陰補腎、強腰益精 (D)清熱利濕、通筋止痛
- 26 承上題，治以下列何方最適宜？
(A)四妙散 (B)導痰湯 (C)身痛逐瘀湯 (D)獨活寄生湯

- 27 下列有關遺精的診療要點之敘述，何者錯誤？
 (A)病機常源自心有妄想，心神浮越，治宜清心安神
 (B)部分病機源自脾胃失運，濕熱下注，熱擾精室，治宜大劑苦寒以清利下焦濕熱
 (C)主要病位在腎，常因腎虛不固，精關滑脫，治宜補腎收澇固精
 (D)精藏於腎，主持在心，疏泄在肝，轉輸資源在脾，故本病與五臟均有關係
- 28 慢性腎炎出現關格後期之證，以下列何藥降濁最適當？
 (A)黃芩 (B)黃連 (C)大黃 (D)降真香
- 29 關於《醫學心悟·痹》文中「行痹」之敘述，下列何者錯誤？
 (A)治行痹者，以散風為主，而以除寒却濕佐之
 (B)參以補氣之劑，所謂治風先治氣
 (C)行痹症見肢體關節痠痛，遊走不定，關節屈伸不利
 (D)方用《宣明論方》之防風湯
- 30 下列有關痺證與痿證敘述何者錯誤？
 (A)肝藏血主筋，腎藏精生髓，津生於胃，散布於肺，故痿證與肝腎肺胃的關係最為密切
 (B)《素問·痿論篇》有「治痿者獨取陽明」之說法
 (C)痿證多屬於五臟內傷，精血受損，一般是實證、寒證多見，虛實夾雜者亦不鮮見，而虛證、熱證則較少
 (D)《醫學心悟·痹》：「治行痹者，散風為主，而以除寒祛濕佐之，大抵參以補血之劑，所謂治風先治血，血行風自滅也。」
- 31 40歲女性，10年前曾經發生橋本氏甲狀腺炎，主訴心悸怔忡，健忘不眠，盜汗虛熱，食少體倦，月經量多淋漓，面色萎黃，舌淡苔白，脈細緩，西醫診斷疑似甲狀腺功能低下，治以下列何方最適宜？
 (A)補中益氣湯 (B)歸脾湯 (C)還少丹 (D)左歸丸
- 32 50歲許先生罹患紅斑性狼瘡多年，近幾年來發現下肢肌肉萎縮，腰脊痠軟，不能久站，咽乾，耳鳴，目眩，脈沉細弱，苔少，舌紅，治以下列何方最適宜？
 (A)二妙散 (B)虎潛丸 (C)清燥救肺湯 (D)參苓白朮散
- 33 下列有關痿證病因病機之敘述，何者錯誤？
 (A)常因風寒濕三邪所引發 (B)虛多實少、熱多寒少
 (C)腎虛為本，常見肝腎之虛 (D)常因肺熱為標
- 34 甲狀腺疾病在中醫上與瘰癧相關，關於瘰癧之敘述，下列何者錯誤？
 (A)瘰癧又稱瘰癧，是頸前喉結兩旁結塊腫大為特徵的一類疾病
 (B)瘰癧日久以氣、痰、瘀三者合而為患
 (C)瘰癧屬痰氣鬱結化火、火熱耗傷陰精，導致陰虛火旺者，以肝、心兩臟陰虛火旺的病變更為突出
 (D)瘰癧腫質地較硬及有結節者，應適當配合活血化瘀藥治療
- 35 47歲李小姐，長期工作壓力大，生活作息不規律，多思慮勞倦，主訴失眠，煩躁，伴隨心悸，潮熱，盜汗，口瘡，面色潮紅，舌紅少津，脈細數。治以下列何方最適宜？
 (A)知柏地黃丸 (B)甘麥大棗湯 (C)天王補心丹 (D)養心湯
- 36 一位患者表示最近一個星期口渴明顯，雖大量喝水卻仍感口渴，小便次數多且量也很多，大便正常，體重在這一個星期中也下降了好幾公斤，下列那一個病證最不可能？
 (A)消渴症 (B)尿崩症 (C)糖尿病 (D)瘰癧
- 37 45歲陳老闆，尿酸偏高，半夜突發左足大趾紅腫熱痛，痛甚難眠，口渴，舌紅，苔黃燥，脈滑數。下列診斷何者最適宜？
 (A)痛痹 (B)行痹 (C)著痹 (D)熱痹
- 38 承上題，下列處方何者最適宜？
 (A)當歸拈痛湯 (B)烏頭湯 (C)薏苡仁湯 (D)防風湯
- 39 55歲男性患者，主訴失眠，伴見胸悶，心煩，頭重目眩，厭食嘔噦，噯氣吞酸，舌紅苔黃膩，脈滑數。下列證型何者正確？
 (A)痰熱擾心 (B)肝胃不和 (C)心火熾盛 (D)心肝火旺
- 40 56歲女性患者，半年前因肺炎住院，出院後自訴眩暈發作次數增加，稍活動則眩暈加重，勞累時亦容易發作，合併心悸失眠，動則易喘，神疲懶言，飲食減少，爪甲色白，舌淡紅，苔薄白，脈細弱。下列敘述何者正確？
 (A)此為氣虛痰阻，治以苓桂朮甘湯 (B)此為氣血虧虛，治以歸脾湯
 (C)此為腎精虧虛，治以鎮肝熄風湯 (D)此為肝陽上亢，治以天麻鉤藤飲

- 41 關於癲癇病因病機的敘述，下列何者最不適宜？
(A)尤以痰邪作祟最為重要 (B)七情失調，主要責之於憂思
(C)先天因素與母體精氣耗損相關 (D)腦部外傷乃因氣血瘀阻
- 42 患者主訴膝關節疼痛長久不癒，肢體倦怠，身倦，腰脊痠痛乏力。視之關節無紅腫變形，觸之患處膚溫如常，舌淡苔白，脈沉弱。治以下列何方最適當？
(A)防風湯 (B)宣痹湯 (C)薏苡仁湯 (D)獨活寄生湯
- 43 下列關於中風閉證與脫證的敘述，何者錯誤？
(A)閉證和脫證，均為危急重證，治法不可混同 (B)陽閉和陰閉兩者不互相轉換
(C)閉證為邪閉於內，多屬實證，急宜祛邪 (D)閉證轉化為脫證是病情惡化的趨勢
- 44 50歲的邱女士近年來工作壓力大，項部緊脹而痛，耳鳴頻發，咽梗不適，聲音不像之前圓潤，胸悶偶需用力吸氣，心悸，眼乾，視物如有晃動，情緒煩躁不安，眠差，口乾，體重減輕，觸診發現頸部有軟軟的腫塊。舌質淡紅，脈弦細數。下列病機何者最適宜？
(A)痰熱鬱肺，氣失降肅 (B)痰氣鬱滯，腎陰虧虛
(C)痰氣壅結，火鬱陰傷 (D)痰凝氣鬱，瘀熱互結
- 45 膀胱腫瘤時常見尿道阻塞而致小便不通暢的現象。若發現患者小便點滴不盡，尿如細線，小腹脹滿疼痛，舌紫暗，脈細澀。下列病機何者最適宜？
(A)瘀血敗精阻塞膀胱尿道之間 (B)濕熱蘊結膀胱，膀胱氣化失司
(C)肝失疏泄，氣機鬱滯，水液排出受阻 (D)三焦內熱，失於蒸騰，不能通調水道
- 46 若腎臟癌病後小便會有混濁而挾赤或白，精神尚可，四肢不冷，情緒不煩，飲食正常，小腹無下墜感，會胸悶，口渴，舌苔黃膩，脈濡數，下列病機何者最適宜？
(A)腎陰虧損，虛火內亢，灼傷脈絡 (B)腎陽虛衰，固攝無權，脂液下流
(C)脾虛氣陷，精微下注 (D)濕熱下滲膀胱
- 47 王先生37歲，因鼻咽癌第二期正在放射治療的療程中，經過一個多月的照射後王先生因為發生口腔潰瘍來就診中醫，王先生還有疲倦、口乾、照射處皮膚紅熱、噁心腹脹的症狀，下列診斷何者最適宜？
(A)熱毒壅盛夾痰濕 (B)氣陰兩虛夾熱毒
(C)氣血兩虛夾陰虛 (D)心肝火旺夾腎虛
- 48 中醫對癌症之命名有不同方式，下列何項癌症名稱非以形狀命名？
(A)繭唇 (B)舌菌 (C)腎岩 (D)上石疽
- 49 依近代學者之考據，治療產後諸病及經病，創四物湯增損治病模式，是由那位醫家提出的理論？
(A)劉完素 (B)張子和 (C)李東垣 (D)朱丹溪
- 50 25歲張女士，12歲初經，平素經行5~6天、每隔28~31天一行。近數次月經量增甚、第一日日期如下：2019年3月20日、4月9日、5月1日、5月20日。於2019年5月22日來診，主訴經量多，色紅質稠，她經常熬夜，伴咽乾口渴，煩躁易怒，小便黃，大便偏乾每2~3日一行，舌質紅，苔薄黃，脈弦數。自述未曾有性經驗且上週超音波檢查未見子宮及附件異常。最宜下列何方治療？
(A)《傳青主女科》兩地湯 (B)《傳青主女科》清經散
(C)《和劑局方》逍遙散 (D)《醫宗金鑑》芩連四物湯
- 51 32歲何女，妊娠8週時，因小腹綿綿作痛來診。常覺頭暈目眩，心悸怔忡。察其面色萎黃，舌質淡紅，苔薄，脈細滑，昨日超音波檢查已見子宮內之胎兒心跳，最宜下列何方治療？
(A)《景岳全書》加減一陰煎 (B)《醫學衷中參西錄》壽胎丸
(C)《和劑局方》逍遙散加蘇梗 (D)《金匱要略》當歸芍藥散去澤瀉
- 52 有關痛經之敘述，下列正確有幾項？①經前或經時痛者，多屬實 ②經後仍綿綿作痛者，多屬虛 ③經後始痛者，多屬虛 ④脹甚於痛者，多屬血瘀
(A)1 (B)2 (C)3 (D)4
- 53 下列有關經行吐衄敘述，何者正確？
(A)《萬病回春》：錯經妄行於口鼻者，是火載氣上，血之亂也
(B)《醫宗金鑑·婦科心法要訣》：經前吐血、衄血，乃內熱壅迫其血，宜用三黃瀉心湯瀉之
(C)《醫宗金鑑·婦科心法要訣》：經後吐血、衄血，雖仍有熱，亦不宜瀉，當用清營湯清之
(D)《沈氏女科箋正》：倒經一證，亦曰逆經，乃有升無降，倒行逆施

- 54 36歲女性自覺工作壓力大，月經前易出現乳房脹痛與煩躁易怒，小腹脹痛，納差與腹脹、脈弦，舌尖邊紅與苔薄白，下列診療思路何者最不恰當？
(A)肝氣疏泄失常，復因經前陰血下注，衝任脈盛，氣結血滯，導致乳絡阻滯不暢
(B)可用逍遙散為主方加減治療
(C)易陰虛生內熱，熱擾衝任，水虧火旺而月經量少
(D)常伴隨痛經、精神抑鬱及嘆息等兼症
- 55 52歲女性，停經已半年，面色晦暗，精神萎靡，形寒肢冷，腰膝酸冷，納呆腹脹，大便溏，舌質淡嫩，苔薄白，脈沉細無力。最宜依下列何項治則處方？
(A)溫腎扶陽，疏肝理氣
(B)溫腎扶陽，佐以溫中健脾
(C)滋養腎陰，佐以潛陽
(D)滋腎柔肝，育陰潛陽
- 56 《婦科心法·崩漏證治》：若漏血濇少，此屬血滯，宜用四物湯加下列那些藥物治療？
(A)乳香、沒藥、血竭
(B)蒲黃、五靈脂
(C)香附、桃仁、紅花
(D)川棟、烏藥
- 57 《醫林改錯》少腹逐瘀湯與《金匱要略》溫經湯均有溫經散寒祛瘀之功，下列屬於二方均有的組成藥物有幾項？①當歸 ②乾薑 ③小茴香 ④吳茱萸
(A)1 (B)2 (C)3 (D)4
- 58 下列有關陰癢常見的病因及鑑別診斷，正確有幾項？①滴蟲性陰道炎，多見帶下色白如豆腐渣樣 ②黴菌性陰道炎，多見帶下色黃綠，有腥臭味 ③老年性陰道炎，多見外陰與陰道不適及灼熱感
(A)0 (B)1 (C)2 (D)3
- 59 陳小姐是醫院大夜班護理師，近來她發現白帶量增加，中醫師處方：生地4錢、澤瀉3錢、山藥3錢、芡實3錢、牡蠣1兩、知母3錢、黃柏3錢、蓮鬚3錢。下列何項患者的症狀是醫師的辨治依據之一？①帶多色黃 ②陰部搔癢 ③耳鳴心悸
(A)僅①② (B)僅①③ (C)僅②③ (D)①②③
- 60 35歲許女欲再孕，屢孕屢墮已連續四次，現月經量少且點滴淋漓，經色鮮紅，質黏稠，兩顴潮紅，手足心熱，煩躁口乾，舌紅苔少，脈細數，下列相關診療思路何者最適宜？
(A)其病機為陰虛生內熱，熱擾衝任，損及胎元，胎殞之後，陰液更乏，內熱更甚，虛而未復，所以屢孕屢墮
(B)此病患於熱邪不甚之後，仍不可用補脾腎之品治療
(C)此病患應該同時伴有頭暈耳鳴、神疲肢倦、納少、夜尿頻多的症狀，宜重用溫補腎陽之品
(D)若此病患伴有小腹墜痛不適，須重用黨參、黃耆、肉桂、艾葉
- 61 陳小姐，妊娠8個月，面目四肢水腫、下肢尤甚、按之沒指，腰痠乏力，下肢逆冷，小便不利，舌淡苔白潤，脈沉細。最宜下列何方治療？
(A)白朮、茯苓皮、大腹皮、生薑皮、陳皮、砂仁
(B)附子、生薑、茯苓、白朮、白芍
(C)天仙藤、香附、陳皮、甘草、烏藥、生薑
(D)木瓜、紫蘇葉、茯苓、豬苓、澤瀉、白朮
- 62 《金匱要略》中提到新產婦人「三病」，下列選項何者正確？①病暈 ②惡露不絕 ③病鬱冒 ④盜汗 ⑤腹痛 ⑥大便難 ⑦病瀉 ⑧嘔吐 ⑨病瘕
(A)①④⑦ (B)②⑤⑧ (C)③⑥⑨ (D)④⑤⑥
- 63 產後惡露不止的發病機理，下列何項正確？①血瘀 ②氣虛 ③血熱
(A)僅①② (B)僅①③ (C)僅②③ (D)①②③
- 64 有一產婦，產後數日發燒39℃，並有惡寒，小腹疼痛拒按，惡露量少色紫暗，有臭味，煩躁口渴，尿少色黃，大便燥結，舌紅苔黃，脈數有力。最宜下列何方治療？
(A)《醫宗金鑑》五味消毒飲加蒲黃、五靈脂、丹皮、赤芍、魚腥草、益母草
(B)《和劑局方》四物湯加丹皮、五靈脂、益母草、蒲公英
(C)《證治準繩》八珍湯去川芎加黃耆、荊芥、薏苡仁、敗醬草
(D)《傷寒論》桂枝湯加防風、蘇葉、荊芥、敗醬草、金銀花
- 65 五臟辨證的診法，首先見於何本著作？
(A)《顛經》 (B)《小兒藥證直訣》 (C)《幼科發揮》 (D)《幼科證治準繩》
- 66 小兒面部望診中，五部配五臟，下列何者正確？①額上為腎 ②左腮為肝 ③鼻為脾 ④頰為心 ⑤右腮為肺
(A)僅②⑤ (B)僅①③④ (C)僅②③⑤ (D)①②③④⑤

- 67 依《幼科雜病心法要訣·感冒門·感冒夾食》，小兒感冒夾食，為「小兒平日飲食無節，內傷停滯，外為風寒所襲」，症見「發熱憎寒頭痛疼，惡食噯臭吐酸物，便秘尿澀腹熱膨」，下列治療方藥，何者最
不適合？
(A)汗多者，宜桂枝白虎湯 (B)熱盛者，宜雙解通聖散
(C)內無熱，用藿香正氣散 (D)表邪解，用平胃散加山楂、神麴、麥芽
- 68 小兒感冒，若為年幼體弱的感冒病童，臨床症狀表現多較重，證情複雜，常見以下兼挾證，下列何者
最少見？
(A)咳聲重濁，喉中痰鳴 (B)脘腹脹滿，不思飲食
(C)睡臥不寧，甚則驚厥 (D)頭汗身黃，心悸水腫
- 69 王小弟3歲，因腹痛1天至中醫兒科求診，其症見發熱惡寒，更兼腹痛，惡食，嘔吐啼叫不已。依《幼
科雜病心法·腹痛門》下列何方最適宜？
(A)加減理中湯 (B)藿香和中湯 (C)香砂平胃散 (D)涼膈散
- 70 關於厭食、積滯、疳證的比較，下列何者錯誤？
(A)厭食者，長期見食不食，並經排除其他急慢性消化系統疾病
(B)積滯者，不思乳食，由乳食停積不行產生，而厭食不思進食，其腹坦然無苦，但仍見噯氣酸餒，大
便酸臭等症狀
(C)疳證形體明顯消瘦且有腹膨作脹，但厭食患者其形體正常或略瘦
(D)疳證可病涉五臟，但厭食為脾之本臟輕症，一般不涉及它臟
- 71 關於「驚風八候」的臨床表現，下列何者錯誤？
(A)搐 (B)引 (C)反 (D)掉
- 72 依《醫宗金鑑·幼科雜病心法》，小兒因風寒乘入膀胱，症見小便閉塞，脹痛難禁，不時淋漓，少腹隱
痛，治以下列何方加減最適宜？
(A)五苓散 (B)五淋散 (C)豬苓湯 (D)五皮飲
- 73 根據古代醫學文獻記載，小兒尿頻多屬於下列何種淋證？
(A)石淋 (B)膏淋 (C)勞淋 (D)熱淋
- 74 依《醫宗金鑑·幼科雜病心法》，對於小兒傷暑的敘述，下列何者最適當？
(A)傷暑受暑感風寒，無汗熱渴面赤紅，嗜臥懶食肢重疼，用清暑益氣湯
(B)發熱無汗，口渴飲水面色紅赤，乾嘔惡心，或腹中絞痛，嗜臥懶食，用藿香正氣散
(C)若正氣虛弱，當補正祛邪，用六合湯
(D)若傷暑夾食，大吐瀉者，用二香飲
- 75 八個月大男嬰，煩躁不寧，啼哭，拒餵食哺乳，醫師四診，面色赤，唇紅，舌紅，脈滑有力，小便短
赤，大便乾，口渴喜飲，舌面滿布白屑堆聚，依辨證宜治療何臟腑積熱最適宜？①肝 ②心 ③脾
(A)僅①② (B)僅②③ (C)僅①③ (D)①②③
- 76 5歲兒童病後氣血虛弱，症見神倦氣乏，兼口渴引飲而嘔者。根據《醫宗金鑑·幼科雜病心法》，下列
何方最適宜？
(A)竹葉石膏湯 (B)白通湯 (C)黃連解毒湯 (D)白虎湯
- 77 10歲蔡小弟，症見睡則汗出，覺則汗止，身多煩熱，依《醫宗金鑑·幼科雜病心法》，治以下列何方最
適宜？
(A)黃耆、防風、白朮
(B)酸棗仁、川芎、茯苓、知母、甘草
(C)黃耆、黃芩、黃連、黃柏、生地黃、熟地黃、當歸
(D)桂枝、龍骨、牡蠣、白芍、甘草、大棗、生薑
- 78 2歲孩童發熱，微惡風寒，鼻塞流涕，咳嗽，眼臉紅赤，淚水汪汪，發熱第三天口腔兩頰黏膜紅赤，近
白齒處可見細小白點，周圍紅暈，磊磊如麻，舌苔薄白，脈浮數。治以下列何方最為適宜？
(A)三黃石膏湯 (B)人參敗毒散 (C)宣毒發表湯 (D)涼營清氣湯
- 79 依《幼科雜病心法·雜證門》：「陽氣不榮成五癍，仰頭取氣難搖動，手足強直冷如冰，氣壅胸膈牽連
痛」，下列何方最適宜？
(A)理中湯 (B)小續命湯 (C)鉤藤散 (D)當歸四逆湯
- 80 關於傳染性紅斑（Erythema infectiosum）的敘述，下列何者錯誤？
(A)病毒所致的傳染病，其病原體為EB病毒（Epstein-Barr virus）
(B)皮疹可分成三個階段：首先是在臉頰上出現所謂「掌摑」（slapped-cheek appearance）的紅斑，是此
病最大特徵
(C)在臉頰紅斑消失後一天，軀幹出現紅斑；接著身上的紅斑中心褪色，使得紅斑看起來像是蕾絲狀或
網狀（lacy or reticulated appearance）
(D)又稱為第五疾病（fifth disease）