

102年第一次專門職業及技術人員高等考試醫師中醫師考試
分試考試、中醫師、營養師、心理師、醫事檢驗師、護理師、
社會工作師考試、特種考試聽力師、牙體技術人員考試、
102年專門職業及技術人員特種考試語言治療師考試試題

代號：4110
頁次：8-1

等 別：高等考試
類 科：護理師
科 目：產兒科護理學
考試時間：1 小時

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆 在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 1 孕產婦死亡率係指懷孕期間或懷孕終止多少天內之婦女死亡數？
(A) 20 天 (B) 28 天 (C) 42 天 (D) 56 天
- 2 有關骨盆入口的產科結合徑之敘述，下列何者正確？
(A)臨床上較解剖結合徑容易測量 (B)測量恥骨聯合上緣內側骨突至薦骨岬之間距離
(C)測量二腸骨嵴間之距離 (D)一般測量的距離為 12~13 公分
- 3 林女士懷孕 18 週，主訴有下列各項孕期不適，何者和動情激素增加無關？
(A)流鼻血 (B)腸胃脹氣 (C)白帶 (D)流涎症
- 4 陳女士目前懷孕，有酗酒問題，可能因此發生下列何種情況？
(A)胎兒染色體異常 (B)母親最易缺乏維生素 A
(C)母親的葉酸代謝會加速 (D)新生兒有小頭症
- 5 下列那一對染色體異常可導致亨汀頓氏舞蹈症發生？
(A)第 13 對 (B)第 11 對 (C)第 8 對 (D)第 4 對
- 6 下列何項為婦女受孕後之子宮頸變化？①拉頂氏徵象 (Ladin sign) ②海軋氏徵象 (Hegar's sign)
③古德爾氏徵象 (Goodell's sign) ④查爾威克氏徵象 (Chadwick's sign)
(A)①② (B)②④ (C)③④ (D)①③
- 7 下列何項檢查，有助監測胎兒健康狀況？
(A) Fern Test (B) CVS (chorionic villus sampling)
(C) NST (nonstress test) (D) BST (breast stimulation test)
- 8 懷孕婦女須達成「與胎兒連成一體」之心理發展任務，下列何者為相關的行為表現？
(A)第一妊娠期婦女是以胎動來建立此真實的感受
(B)第二妊娠期婦女常撫摸肚子與胎兒講話，以開始建立依附關係
(C)這種與胎兒連成一體的母子關係，一旦建立就不會改變
(D)學習貢獻自己是與胎兒連成一體最典型的表現
- 9 李女士詢問：「懷孕已經 7 週了，每天早晨都感覺噁心、嘔吐，這樣正常嗎？」此時護理師最合宜的回答是：
(A)「這是正常的，因為妳胃的位置改變的關係。」
(B)「可能是胃酸分泌減少，待會兒要請醫師再好好的檢查一下。」
(C)「我只是護理師，妳有問題待會兒可以請教醫師。」
(D)「這是荷爾蒙變化引起的反應。」

- 10 林女士前一胎寶寶出生體重為 4250 公克，則此次懷孕應於何時接受糖尿病篩檢？
(A) 10 週 (B) 14 週 (C) 18 週 (D) 24 週
- 11 李女士G₁P₀，入院待產，陰道檢查結果子宮頸擴張 6 公分，變薄程度 80%，胎頭高度+1，此時胎頭最可能的位置是下列何者？
(A)剛好固定 (B)坐骨棘連線下 (C)陰道口 (D)骨盆入口
- 12 胎頭徑線之長度大小排列順序，下列何者正確？
(A)枕下前凶徑<枕額徑<枕額徑 (B)枕額徑<枕額徑<枕下前凶徑
(C)枕下前凶徑<枕額徑<枕額徑 (D)枕額徑<枕下前凶徑<枕額徑
- 13 針對照顧行硬膜外麻醉的待產婦，下列護理措施，何者錯誤？
(A)定時測量血壓，預防血壓下降 (B)監測膀胱，了解尿瀦留
(C)持續監測子宮收縮狀況 (D)鼓勵下床活動，促進產程
- 14 LOA 在內診時會發現下列何者？
(A)前凶門在孕婦恥骨的左側 (B)前凶門在孕婦恥骨的右側
(C)前凶門在孕婦薦骨的右側 (D)前凶門在孕婦薦骨的左側
- 15 胎兒要通過產道時，下列何項因素不會影響其下降？
(A)子宮收縮直接對胎兒的壓力 (B)腹部肌肉的收縮力
(C)羊水的壓力 (D)胎盤的壓力
- 16 有關使用前列腺素（PGE₂）引產之敘述，下列何者正確？
(A)主要的作用是促進子宮頸變厚引發收縮 (B)大都使用肛門塞劑方式給予，較為安全
(C)使用後不會再配合催產素的使用 (D)會出現子宮強直性的收縮
- 17 李女士 34 歲，G₂P₁，懷孕 36 週，此胎是臀位。入院檢查發現每隔 10 分鐘宮縮 2 次，持續 30 秒，強度 50 mmHg，子宮頸口開 4 公分，70%變薄。李女士表示有很多水從陰道流出，下列何者為最優先的護理措施？
(A)立刻通知醫師 (B)監測胎兒心跳速率 (C)給予靜脈輸液 (D)準備進行生產
- 18 承上題，護理師從胎兒監測器得知，胎兒心跳 80 次/分，持續 50 秒，其型態與宮縮沒有一定關係，此情況最有可能為下列何者？
(A)一般胎心率變化 (B)早期減速 (C)變異性減速 (D)晚期減速
- 19 王女士產後第 5 天，乳房有紅、腫、熱、痛現象，下列何者為合適的護理處置？
(A)暫時停止哺餵母乳，以免嬰兒受到感染 (B)限制水分的攝取，以免乳房腫脹
(C)持續哺餵母乳 (D)避免碰觸與按摩
- 20 林女士自然生產且採純母乳哺餵，產後第 3 天，護理師教導恢復性生活的時機，下列何者最恰當？
(A)產後 1~2 週，子宮底縮回骨盆腔後 (B)產後 2~3 週，惡露停止及會陰傷口癒合後
(C)產後 6~8 週，子宮完全復舊後 (D)產後 10~12 週，準備離奶時
- 21 產墊惡露量，通常是以多少時間單位為評估標準？
(A) 30 分鐘 (B) 60 分鐘 (C) 90 分鐘 (D) 120 分鐘
- 22 護理師評估自然產產後第 2 天之產婦的會陰傷口時，下列那種姿勢最適宜？
(A)膀胱截石式 (B)側臥姿勢 (C)屈膝仰臥 (D)膝胸臥位

- 23 張女士第一胎，初次哺餵母乳，害怕嬰兒不接受母乳，護理師欲協助其成功哺餵母乳，下列那項措施最不合適？
(A)不提供安撫奶嘴給新生兒
(B)產後儘早讓新生兒吸母乳
(C)教導張太太正確的餵奶姿勢
(D)為減少張太太的疲累，每日提供 8 小時的母嬰同室即可
- 24 產後骨盆搖擺運動之主要目的為何？
(A)增強骨盆會陰肌肉彈性
(B)增強膀胱肌肉張力彈性
(C)增強腹部肌肉張力
(D)增強腰背部肌肉張力
- 25 下列哺餵母乳之敘述，何者錯誤？
(A)嬰兒出生後半小時內即可哺餵母乳
(B)出生後逐漸增加嬰兒每次吸奶的時間，以促進乳汁分泌
(C)哺餵母乳可降低母親罹患乳癌和卵巢癌的機率
(D)嬰兒體重增加及尿量是監測母乳哺餵是否足夠的方法
- 26 下列母嬰親善醫院認證標準應採取的措施，何者正確？
(A)醫院應有支持成功哺乳的政策
(B)對於純餵母乳的嬰兒提供安撫奶嘴
(C)產婦要求時，醫院可提供 8 小時的母嬰同室
(D)母乳哺餵初期，因為乳量不足，應常規地補充開水或葡萄糖水
- 27 黃小弟，出生 1 分鐘時心跳速率每分鐘 100 次，呼吸慢不規則，四肢彎曲且有自發性運動，於抽吸口鼻黏液時出現咳嗽反應，抽吸後給氧，身體軀幹呈現粉紅色，四肢肢體呈現藍色，請問黃小弟此時阿帕嘉計分（Apgar score）的得分為何？
(A) 7 分
(B) 8 分
(C) 9 分
(D) 10 分
- 28 有關成功建立新生兒呼吸功能的敘述，下列何者錯誤？
(A)陰道生產出生的嬰兒由於胸部受到擠壓，約有 1/3 的肺部液體會從口鼻腔流出
(B)新生兒產出時受到冷的刺激，有助於引發第一次呼吸
(C)剖腹產生的嬰兒因沒有經歷胸部的擠壓，較易引起短暫性的呼吸窘迫
(D)新生兒肺部之肺泡表面張力素可於呼吸循環中之吸氣期時，使肺成功的膨脹
- 29 下列何者是嬰兒自我撫慰行為的表徵？
(A)嬰兒哭泣時，能藉由將手指放進嘴裡而安靜下來
(B)嬰兒凝視著布娃娃，能眨眼打哈欠
(C)安靜時，嬰兒能轉頭面向呼喚他的照顧者
(D)餓了能大聲哭泣
- 30 丁小弟，出生體重 2600 克，第 1 天母嬰同室時四肢末稍冰冷，體溫為 36°C，下列何者為最恰當的處置？
(A)直接讓母親與新生兒有肌膚的接觸，以增加體溫
(B)立即將新生兒用包巾包起來，以增加體溫
(C)放入保溫箱中或輻射加熱床上加溫，以增加體溫
(D)告訴母親，這是新生兒正常的生理現象，不需要處理
- 31 若待產婦有臍帶脫垂的情況時，應避免採用下列那一種姿勢？
(A)膝胸臥式
(B)垂頭仰臥式
(C)半坐臥式
(D)下肢抬高之側臥式

- 32 劉女士G₂P₀SA₁，妊娠 32 週，因破水住院安胎，入院時胎心音 144 次/分，有輕微宮縮現象，醫囑予 ritodrine (Yutopar) 1 Amp+5% G/W 500 c.c.靜脈滴注，採絕對臥床休息。現測得胎心音 168 次/分，30 分鐘內宮縮一次，壓力 30 mmHg，下列有關其護理措施，何者較合適？
- (A)胎心音異常上升且合併宮縮，表示有胎兒窘迫現象，宜採左側臥，並立即報告醫師
 - (B)解釋胎心音變化是藥物的副作用，但尚屬正常，應持續密切觀察與臥床休息
 - (C)胎心音異常上升顯示藥物產生副作用，宜調降 ritodrine (Yutopar) 靜脈滴注速率
 - (D)胎心音變化異常，表示劉女士即將早產，宜儘速準備生產之相關事宜
- 33 承上題，劉女士住院治療 7 天後，主訴臉紅、燥熱難耐，胃口欠佳，陰道仍有少量羊水滲出，下列護理措施何者不適宜？
- (A)依醫囑使用抗生素以預防感染
 - (B)調節被蓋、衣物及空調，以減少不適
 - (C)向個案解釋臉紅、燥熱的反應與破水引發感染有關
 - (D)提供會陰沖洗、密切觀察與評估陰道分泌物性狀
- 34 承上題，劉女士詢問「打安胎藥，是否會對胎兒造成畸形？」下列護理師的回答何者較適當？
- (A)「根據目前文獻記載，尚沒有導致胎兒畸形的報告。」
 - (B)「根據臨床報告，只有胎兒體重下降的影響。」
 - (C)「這方面的問題，我將請醫師來告訴您。」
 - (D)「根據我的經驗，安胎藥可能對胎兒畸形有影響。」
- 35 張女士，因急性骨盆腔炎入院，下列那項是其典型症狀？
- (A)腹部有鼓音
 - (B)腸音增加
 - (C)會陰部皮膚發紅
 - (D)腹部有壓痛感
- 36 下列那一種傳染病，感染後空窗期及潛伏期最長？
- (A)淋病
 - (B)梅毒
 - (C)疱疹
 - (D)愛滋病
- 37 蔡女士咳嗽時有小便滲出，疑似壓力性尿失禁，護理師指導其接受秤護墊法 (pad weighting test) 時，應不包括下列那項活動？
- (A)彎腰撿拾物品
 - (B)走路
 - (C)仰臥起坐
 - (D)坐/站交替
- 38 婦女月經週期中，有明顯的基礎體溫下降，然後上升進入高溫期之變化，其下降的曲線在臨床上的意義為何？
- (A)受精
 - (B)排卵
 - (C)受精卵分裂
 - (D)受精卵著床
- 39 下列更年期婦女預防骨質疏鬆之護理指導應包括何者？
- (A)避免進行負重性的運動
 - (B)嚴禁喝咖啡
 - (C)鈣片每天攝取量約為 1200 mg
 - (D)體重應維持於理想體重之下
- 40 蔣女士，曾發生兩次子宮外孕而切除兩側輸卵管，求助生殖科技治療，下列何種技術較適合？
- (A)配偶人工受精 (AIH)
 - (B)輸卵管胚胎植入術 (TET)
 - (C)體外受精胚胎植入術 (IVF-ET)
 - (D)卵細胞質內精蟲注射 (ICSI)
- 41 根據皮亞傑的認知發展理論，18 個月的小楓，應已具有下列那一項概念？
- (A)時間概念
 - (B)物體恆存概念
 - (C)質量保留概念
 - (D)萬物有靈觀的概念

- 42 小燕，12 個月大，至健兒門診接受健康檢查，小燕應可以通過下列那一項丹佛 II 發展測驗？
(A) 可以說出雙字句且正確運用連接詞 (B) 懂得用拇指和食指拿葡萄乾
(C) 可以將瓶子內的小東西倒出來 (D) 可以依問話指出自己的五官
- 43 有關燒傷急性期病童的營養，下列敘述何者不適當？
(A) 重度燒傷病童最初 24~72 小時需禁食
(B) 燒傷病童的熱量需要量為平常的 2~3 倍
(C) 建議營養之供應來源為：25~40% carbohydrate，40~60% protein，15~20% fat
(D) 及早補充維生素 A、B、C 及礦物質、鐵、鋅
- 44 嘉玉不慎掉入游泳池，救生員救起她時，已失去意識，經過急救恢復意識後，被送至醫院住院治療，護理師應觀察下列那些項目？①排尿情形 ②耳朵分泌物 ③顱內壓增加徵象 ④眼睛突出 ⑤末梢循環
(A) ①②③ (B) ①②④ (C) ①③⑤ (D) ②④⑤
- 45 下列何者不是兒童體重快速生長期？
(A) 出生~半歲 (B) 7 個月~1 歲 (C) 2 歲~10 歲 (D) 12 歲~16 歲
- 46 下列敘述何者不是 6 個月大嬰兒的正常發展現象？
(A) 後囟門未關閉 (B) 俯臥時能抬頭至 90 度
(C) 用力哭鬧時，前囟門鼓脹 (D) 頭圍大於胸圍
- 47 為 4 歲兒童評估呼吸狀況時，下列何者較不適當？
(A) 先測量體溫後，再測量呼吸
(B) 測量時間需完整的 1 分鐘
(C) 評估呼吸時兩側胸廓移動是否一致，可使用觸診技巧
(D) 應同時觀察其呼吸的深度與規律性
- 48 下列那一項不屬於家系圖 (genogram) 評估之內容？
(A) 家庭成員之關係 (B) 家庭成員之性別 (C) 家庭成員健康狀況 (D) 家庭成員社交情形
- 49 小玲，小學二年級，在學校教室內出現全身性發作的癲癇，下列何項處置最適當？
(A) 以課本墊高小玲的頭部，維持呼吸道通暢 (B) 將小玲的頭部擺正，避免吸入口腔分泌物
(C) 移除小玲身旁的桌椅與尖銳物，以避免撞傷 (D) 抱緊或以衣物包裹小玲，使其更具安全感
- 50 王小弟，9 歲，因肺炎住院，須作噴霧治療及姿位引流，下列護理指導，何者最適宜？
(A) 執行治療措施前，應先提供具體的圖片或物體向王小弟解說
(B) 為避免王小弟產生預期焦慮，作治療前不宜解說
(C) 9 歲兒童對非具體事物無法理解，治療措施只要向父母說明
(D) 9 歲兒童只能了解親眼所見之事物，只需在執行治療措施當時向王小弟解說
- 51 早產兒的免疫系統功能及特徵之敘述，下列何者錯誤？
(A) 妊娠 36 週前出生者，無法從母體得到 IgG
(B) 早產兒對感染的抵抗能力低，即使感染白血球也不升高
(C) 早產兒無法從母體得到 IgE，故感染時易發燒
(D) 早產兒無法經胎盤得到母體的 IgM
- 52 有關以家庭為中心的慢性病兒童護理照護，下列敘述何者不適當？
(A) 鼓勵病童及父母親一起參與家庭決策 (B) 入院評估包含家庭成員的互動及可應用的資源
(C) 將疾病及治療措施納入家庭常規中 (D) 減少與外界互動，以加強家庭的凝聚力

- 53 一位 10 歲的末期病童，在住院期間仍掛念學校作業沒有完成，依據艾瑞克森理論（Erikson theory）表示此病童的心理社會發展處於何種階段？
(A)否認病情、沒有現實感 (B)符合自我認同之發展任務
(C)希望藉著寫作業來轉移注意力 (D)符合其勤勉的發展任務
- 54 侯小弟，妊娠週數 32 又 4/7 週，出生已滿 48 小時且進食狀況良好，需給予肌肉注射 B 型肝炎疫苗及扎足跟血，收集血液檢體，有關早產兒短暫疼痛的處理，下列敘述何者正確？
(A)早產兒已能感受疼痛，故應依醫囑給予止痛藥物以減輕疼痛
(B)應提供適合的減痛措施，如非營養性吸吮、口服蔗糖溶液及寧握
(C)為減少早產兒疼痛，建議餵奶後立即給予採血，以免哭鬧
(D)為避免疼痛，應選在早產兒熟睡時注射 B 型肝炎與扎足跟血
- 55 向學齡期兒童解釋死亡時，下列護理措施何者不適當？
(A)使用隱喻性詞語，如「睡著了」代替死亡一詞
(B)主動分享自己面對死亡時害怕或擔心的感受
(C)依病童的發展階段，據實告知自己對死亡的認識
(D)可以用繪本、電影、卡通與兒童討論死亡的議題
- 56 有關水痘的敘述，下列何者正確？
(A)具高度傳染性，主要經由血液傳染
(B)疹子最早出現在臉部及頭皮，再向軀幹擴展
(C)同一時間內可在不同部位看到不同階段的發疹變化
(D)必須使用 aspirin 以減少病童疼痛及發燒
- 57 有關腸病毒（enterovirus）的敘述，下列何者錯誤？
(A)傳染途徑包括腸胃道、呼吸道及接觸方式
(B)在發病前數天，兒童的喉嚨與糞便中，可發現具傳染力之病毒
(C)呼吸道口沫中的病毒可存留 1~3 週
(D)糞便中的病毒可存留 6 個月
- 58 護理師照顧下列何種傳染性疾病的病童時，不需要戴口罩？
(A)水痘 (B)麻疹 (C)腮腺炎 (D)破傷風
- 59 有關兒童呼吸系統的解剖生理特徵，下列何者正確？
(A)嬰幼兒的歐氏管較成人長、窄，使得致病菌或異物較易由歐氏管進入中耳
(B)嬰幼兒的呼吸肌尚未成熟，呼吸力量較薄弱，故年齡越小，呼吸次數越慢
(C)嬰兒喉頭在頸部的位位置較成人低，故呼吸較淺且費力，易造成吸入性肺炎
(D)嬰兒較成人不易藉胸部擴張來增加換氣的容積，故多半採腹式呼吸
- 60 咚咚，6 歲，因經常性扁桃腺炎影響飲食、呼吸，於今日接受扁桃腺切除手術。有關術後的照顧，下列措施何者不適當？
(A)未清醒前宜協助其採俯臥或側躺姿勢，以促進傷口分泌物引流
(B)清醒後若無嘔吐、出血，可試由口進食冰涼的布丁、檸檬汁等
(C)儘可能滿足孩子需求，避免其哭泣、用力咳嗽、清喉嚨等動作
(D)術後 24 小時內可運用靜脈注射方式給予止痛劑
- 61 細支氣管炎嬰幼兒使用氧氣頭罩（O₂ hood）時的護理措施，下列敘述何者不適當？
(A)氧氣流量需大於 5 L/min (B)可考慮與加熱型噴霧器一起使用
(C)所有氧氣治療管路及容器需每週更換一次 (D)潮濕瓶宜使用等張性的無菌生理食鹽水

- 62 小英，13 歲，持續發燒 3 日，扁桃腺紅腫發炎入院求治，喉嚨培養為細菌感染，初步診斷為風濕熱，下列敘述何者錯誤？
- (A)最常侵犯的是心肌及瓣膜 (B)風濕熱本身會進行 1 週
(C)好發於膝關節、肘關節 (D)若侵犯中樞神經系統，可能造成舞蹈症
- 63 下列何者為發紺型的先天性心臟缺損？
- (A)心室中隔缺損 (ventricular septal defect)
(B)心房中隔缺損 (atrial septal defect)
(C)主動脈瓣狹窄 (aortic stenosis)
(D)大血管轉位 (transposition of the great arteries)
- 64 小明，10 歲，罹患法洛氏四重症畸型，造成小明膚色及嘴唇發紺的最主要因素為何？
- (A)肺動脈狹窄的程度 (B)心室中隔缺損的大小 (C)右心室肥厚的程度 (D)主動脈跨位
- 65 有關指導缺鐵性貧血嬰兒之母親餵食口服鐵劑的方法，下列何者正確？
- (A)建議母親將鐵劑和牛奶一起餵食，可以促進鐵質吸收的成效
(B)若鐵劑服用後會引起腹瀉，可改在飯前 30 分鐘服用
(C)當糞便顏色變黑色時，應立即停止服用鐵劑，並就醫治療
(D)鐵劑可以在飯前 1 小時與柑橘類果汁一起服用，吸收效果會更好
- 66 下列那一種血液疾患的兒童如未經治療將會出現顱骨變大、塌鼻、暴牙、顴骨突出的面部表徵？
- (A) β 型海洋性貧血 (β -thalassemia) (B)鎌狀細胞貧血 (sickle cell anemia)
(C)再生不良性貧血 (aplastic anemia) (D)血友病 (hemophilia)
- 67 下列何者不是兒童疑似癌症的九大警訊之一？
- (A)不明原因的疼痛 (B)紫斑或出血傾向 (C)蕁麻疹或皮膚紅疹 (D)嘔吐或走路不穩
- 68 有關化學治療之癌症病童接受預防注射的敘述，下列何者正確？
- (A)可接受注射型小兒麻痺沙克疫苗
(B)若接觸到水痘病童，需於 72 小時後注射 γ 球蛋白
(C)若接觸到麻疹病童，需立即注射麻疹疫苗
(D)若受傷時，不可接受破傷風類毒素
- 69 小光，10 歲，診斷為第一型糖尿病，護理師進行胰島素注射之護理指導，下列敘述何者錯誤？
- (A)採皮下注射，避免注射到肌肉或血管內
(B)先抽短效型胰島素，再抽長效型胰島素
(C)注射部位吸收速率依序為大腿、手部、腹部、臀部
(D)不可按摩注射部位，以避免胰島素作用時間變短
- 70 小華，10 歲，體重 30 公斤，診斷為第一型糖尿病，護理師為小華進行飲食之指導，下列敘述何者錯誤？
- (A)小華每日熱量需求約為兩千大卡
(B)每日三餐及二次點心之熱量分配應各占 1/5
(C)需維持醣類：脂肪：蛋白質比例約為 55：30：15
(D)若小華不想吃飯，可給予醣類飲料代替

- 71 小偉，10 歲，有躁動不安、心悸等現象，經診斷為甲狀腺機能亢進（hyperthyroidism），有關服藥治療的護理指導，下列何者不適當？
(A)指導家屬與小偉用藥的注意事項，以防發生甲狀腺危象
(B)若出現肌肉無力，宜加強肌力訓練
(C)服藥 6 週後，症狀就會改善，但仍不可停藥
(D)通常需治療 1~3 年，疾病才可獲得緩解
- 72 小敏，9 個月大，因嘔吐持續 2 天且有脫水現象而入院，檢查其血液 Na^+ 濃度值為 147 mEq/L，請問小敏脫水的類型為何？
(A)低張性脫水 (B)等張性脫水 (C)高張性脫水 (D)輕度脫水
- 73 有關血友病之診斷性檢查，下列敘述何者正確？
(A)血小板數目減少 (B)出血時間（bleeding time）延長
(C)部分凝血酶原（PTT）時間延長 (D)凝血酶原（PT）時間延長
- 74 小琪，8 歲，因腸阻塞開刀有人工肛門留置，有關人工肛門造瘻口的護理指導，下列何者不適當？
(A)可利用遊戲或娃娃模型示範更換造瘻口袋與清潔皮膚的步驟
(B)向父母說明手術後 3 週內要採低渣飲食，以減少腸道蠕動
(C)教導父母協助小琪穿衣，選擇寬鬆、不需使用腰帶的衣服為主
(D)可利用圖片說明造瘻口呈白色表示功能良好
- 75 腎病症候群（nephrotic syndrome）患童在類固醇治療期間，有關疫苗接種的敘述，下列何者正確？
(A)接觸到水痘的病童時，應給予水痘疫苗 (B)所有的活性減毒疫苗均不可給予
(C)所有減毒細菌疫苗均不可給予 (D)常規的疫苗須停藥 1 個月後再給予
- 76 唇腭裂（cleft lip and palate）最常引起下列何種健康問題？
(A)脫水 (B)反覆性中耳炎 (C)營養不足 (D)腹瀉
- 77 小芳住院期間以靜脈注射 Dilantin（俗名：癲能停）控制癲癇，下列敘述何者錯誤？
(A) Dilantin 需以 5%葡萄糖的靜脈輸液稀釋 (B)應定期檢查血中 Dilantin 的濃度
(C)常見 Dilantin 的副作用為牙齦增生 (D)不可驟然停用 Dilantin，以防癲癇重積性發作
- 78 有關兒童肌肉骨骼的身體檢查及評估，下列敘述何者錯誤？
(A)視診體態、兩腿長度是否有不對稱 (B)觸診時從受傷的部位先檢查
(C)詢問兒童穿鞋是否有不適情形 (D)必須評估及處理兒童的情緒反應
- 79 小丁，10 歲，主訴頭痛並有嘔吐的現象，送醫後檢查發現為急性水腦症，目前接受腦室外引流（external ventricular drainage）手術，下列手術後護理何者不恰當？
(A)監測生命徵象及有無顱內壓升高之症狀
(B)觀察有無意識狀態改變、瞳孔放大之現象
(C)引流時，協助小丁採頭部下垂姿勢，以利引流
(D)避免小丁快速坐起，以免腦脊髓液迅速減少
- 80 腦膜病徵會出現布魯辛斯基氏徵象（Brudzinski's sign），此徵象為下列何者？
(A)抬起兒童的腿並彎曲膝蓋，當由膝蓋伸直腿時，會有阻力或引起疼痛
(B)讓兒童平躺，當將其頸部迅速抬高屈曲，會引發膝及腰部的屈曲
(C)用指尖或反射錘的柄沿兒童之足跟往上劃過足外緣至大拇趾時，大拇趾會向上翹，其餘趾呈扇形張開
(D)讓兒童俯臥，以大拇指沿其脊柱，自尾椎處往上壓至頸部，兒童會不自主抬頭