

101年第二次專門職業及技術人員高等考試醫師考試分試考試、中醫師、營養師、心理師、醫事檢驗師、護理師考試暨普通考試護士考試、101年專門職業及技術人員高等考試中醫師（第一試）考試分試考試、法醫師、語言治療師、聽力師、牙體技術師考試試題

代號：4103
頁次：6-1

等 別：高等考試

類 科：中醫師

科 目：中醫臨床醫學(一) (包括傷寒論(學)、溫病學、金匱要略、中醫證治學、中醫診斷學)

考試時間：1 小時 30 分

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 1 依《傷寒論》，有關抵當湯之敘述，下列何者正確？①可見身黃 ②少腹鞭 ③其人小便不利 ④其人如狂
(A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④
- 2 依《傷寒論》，有關三物小白散之敘述，下列何者正確？①治法為溫寒逐水，滌痰破結 ②潦水和服 ③服後，不利，進冷粥 ④服後，利過不止，進熱粥
(A)① (B)①② (C)③④ (D)①②③④
- 3 依《傷寒論》，太陽病，下之，故心下痞，與瀉心湯，痞不解，其人渴而口燥，煩，小便不利者，宜治以下列何方？
(A)半夏瀉心湯 (B)五苓散 (C)茯苓甘草湯 (D)生薑瀉心湯
- 4 依《傷寒論》，桂枝去芍藥加附子湯證的病因病機為下列何者？
(A)太陽病發汗，表證未除，兼胸陽不足 (B)太陽病發汗，表證已解，邪熱內陷胸膈
(C)太陽病吐後，表證未除，兼胸陽不足 (D)太陽病下後，表證未除，兼胸陽不足
- 5 茯苓桂枝甘草大棗湯證「臍下悸」之病因病機為下列何者？
(A)傷寒吐下後，脾胃氣虛，水氣上衝 (B)汗後心陽虛，腎氣逆，欲上凌心
(C)中氣素虛，因傷寒汗後引起 (D)服桂枝湯後，水氣內停
- 6 依《傷寒論》，瓜蒂散方的組成，下列何者正確？
(A)瓜蒂 (B)瓜蒂、赤小豆
(C)瓜蒂、赤小豆、香豉 (D)瓜蒂、赤小豆、常山苗
- 7 某患者因太陽中風入裏，引發慢性腎炎多年，去年冬令不慎受寒，發熱惡寒，身體疼痛，無汗，心煩躁不舒，診其脈浮緊，當時治以下列何者最適宜？
(A)桂枝去芍加茯苓白朮湯 (B)麻黃湯
(C)五苓散 (D)大青龍湯
- 8 依《傷寒論》，霍亂，吐已下斷，汗出而厥，四肢拘急不解，脈微欲絕者，治以下列何方最適宜？
(A)四逆湯 (B)白通湯
(C)通脈四逆加豬膽汁湯 (D)四逆加人參湯
- 9 有關「陽明病，下之，其外有熱，手足溫，不結胸，心中懊憹，飢不能食，但頭汗出者」之敘述，下列何者正確？①陽明經病下之，所陷之邪淺也 ②頭汗出是陽邪蒸鬱於胸膈間也 ③飢不能食之原因為懊憹擾胃 ④梔子豉湯主之
(A)①②③ (B)①②④ (C)②③④ (D)①②③④
- 10 桂枝新加湯證「身疼痛，脈沉遲」的病因病機，下列敘述何項正確？
(A)太陽病發汗太過，致氣虧營耗，經脈失養 (B)寒邪侵犯太陽經脈，經氣運行不暢
(C)風寒外束，肌表受邪，衛陽被遏 (D)風邪傷營，榮氣不足，不能充灌滋養
- 11 陽明病出現脈浮而遲，表熱裏寒，下痢清穀，則下列敘述何者正確？①脈浮主表熱 ②下痢清穀為裏寒太甚 ③主以四逆湯治療
(A)①② (B)①③ (C)②③ (D)①②③

- 12 依《醫宗金鑑·傷寒論注》，關於少陽病，下列敘述何者錯誤？
(A)胸脇苦滿之病機為少陽之脈，下胸循脇，邪湊其經所致
(B)不欲飲食之病機為少陽木邪病則妨土
(C)心煩之病機為邪在胸脇，火無從泄，上逼於心所致
(D)少陽處於半表半裏之間，其邪外併於表，半表不解則作熱
- 13 關於「厥陰之為病，消渴，氣上撞心，心中疼熱，飢而不欲食，食則吐衄，下之利不止」之敘述，下列何者正確？
(A)此為下熱上寒證
(B)「心中疼熱」說明胃熱極盛
(C)「飢而不欲食」是因肝木乘脾，脾虛不運
(D)因胃熱盛，「下之利不止」，所下糞便當極臭
- 14 「少陰病，吐利，手足逆冷」兼見「煩躁欲死」時，屬下列何種病機？
(A)陰邪亢盛，陽虛已極
(B)陰盛陽虛，陽氣來復
(C)陰虛陽虛，寒濕中阻
(D)陰盛陽虛，正邪劇爭
- 15 關於《傷寒論》中「心煩失眠」證治之敘述，下列何者正確？①若屬「陰虛有熱，水氣不利」，宜治以豬苓湯 ②若屬「腎水虧於下，心火亢於上者」，宜治以黃連阿膠湯 ③若屬「熱擾胸膈者」，宜治以梔子豉湯 ④若「少陰病，脈微細沉…自欲吐，至五六日，自利，復煩躁不得臥寐者」，此處雖煩躁，下利必自癒
(A)①②③ (B)①②④ (C)②③④ (D)①②③④
- 16 下列關於「本太陽病，醫反下之，因而腹滿時痛者，屬太陰也，桂枝加芍藥湯主之。大實痛者，桂枝加大黃湯主之」之敘述何者正確？①桂枝加大黃湯中，芍藥用量為桂枝之二倍 ②因為誤下，重傷脾陽，故腹滿時痛 ③大實痛加大黃乃欲急下存陰 ④用桂枝湯加減，意在令邪由表出
(A)① (B)② (C)①③ (D)②④
- 17 有關溫病通下法的敘述，下列何項錯誤？
(A)下法具增加胃腸蠕動、改進腸管血液循環和降低毛細血管通透性以及抑菌消炎、排除毒素等作用
(B)增液瀉下適用於津液虧損而又兼腑實的病變
(C)通下法是瀉下邪熱、通導積滯的一種方法
(D)苦寒攻下適用於濕熱夾滯，交結胃腸
- 18 一患者發熱纏綿，汗出熱稍降，繼而又發熱，伴頭身困重，胸脘痞悶，納呆噁心，便溏，苔黃膩，脈濡數，下列診斷何項最適宜？
(A)脾胃濕熱證 (B)肝膽濕熱證 (C)濕困中焦證 (D)濕阻肺衛證
- 19 「斑出熱不解」，對腎水素虧者，雖未及下焦，若驗之於舌的舌象為何？
(A)舌絳光亮如鏡 (B)舌紫晦而乾 (C)苔黑焦枯 (D)舌絳枯萎
- 20 依吳又可「癘氣病因」學說，下列癘氣致病特點之敘述何者錯誤？
(A)癘氣有物種選擇性，故有「雞病而鴨不病，人病而禽獸不病」之說
(B)感邪途徑多從口鼻而入，既有天受，也有傳染
(C)癘氣雖有多種，總以膜原為伏邪之處，並無臟腑經絡等病位之異
(D)癘氣學說在辨證施治方面仍未脫離「六淫」體系
- 21 下列關於「溫病命名」之敘述何者錯誤？
(A)依發病季節命名，如「春溫」 (B)依四時主氣命名，如「暑溫」
(C)依發病季節及主氣命名，如「伏暑」 (D)依臨床表現命名，如「爛喉痧」
- 22 關於風熱病邪致病特點的敘述，下列何者錯誤？
(A)先犯肺胃 (B)多在冬春二季 (C)易傷肺胃之陰 (D)傳變迅速
- 23 熱邪初入氣分而表未盡解的治法為何？
(A)清熱生津 (B)清熱宣肺 (C)宣氣透表 (D)清熱瀉火
- 24 溫病「三寶」擅治溫熱病竅閉神昏之證，下列何者長於清心豁痰？
(A)紫雪丹 (B)至寶丹 (C)清宮湯 (D)安宮牛黃丸
- 25 王大丙暑假到台東度假，不慎感冒中暑，服藥後，雖然身熱已退，但仍汗出不止而喘，像要斷氣一樣，診其脈散大，則以下列何方治療最適宜？
(A)白虎加參湯《溫病條辨》 (B)生脈散《溫病條辨》
(C)清暑益氣湯《內外傷辨惑論》 (D)新加香薷飲《溫病條辨》
- 26 6歲王小妹，於7月底於臺灣某醫院住院。初起發熱頭痛，嗜睡，隔日神迷不清，四肢抽搐，牙關緊閉，脈弦數，臨床辨證為何？
(A)暑厥 (B)暑風 (C)暑穢 (D)暑癰

- 27 承上題，治宜下列何方？
(A)雷氏清心滌暑法 (B)雷氏清宣金臟法 (C)羚角鉤藤湯 (D)雷氏芳香化濁法
- 28 溫疫瘥後，身熱退，但終日昏睡不醒，下列敘述何者正確？
(A)手足厥陰之邪未盡 (B)腎精不足，不能養心 (C)心包絡邪熱未盡 (D)熱閉心包，心竅未開
- 29 雷少逸在《時病論》一書所舉的方子—宣透膜原法，為治療濕溫病邪阻膜原的重要方劑，其中那三味藥是能直達膜原，祛其盤踞之邪，而為主藥？
(A)草果、藿香、檳榔 (B)藿香、檳榔、厚朴 (C)厚朴、草果、檳榔 (D)檳榔、厚朴、豆蔻
- 30 關於伏暑病「邪在少陽」時，胸腹部出現的症候特點，下列敘述何者正確？
(A)胃脘痞悶，胸腹灼熱，若天明得汗則胸腹症稍減
(B)胃脘硬滿痛，胸腹灼熱，若天明得汗則胸腹症稍減
(C)胃脘痞悶，胸腹灼熱，若天明得汗則胃脘痞悶稍減，但胸腹灼熱不減
(D)胃脘硬滿痛，胸腹灼熱，若天明得汗則胃脘硬滿痛轉痞悶，胸腹灼熱亦稍減
- 31 43 歲男性，秋燥患病已數日，初起時因症似感冒不以為意，今就診時見身熱口渴，煩躁不安，流鼻血，舌色絳，苔黃而乾。依上述其病機，下列敘述何者正確？
(A)燥熱之邪初入營分 (B)氣分燥熱未解，又入營血
(C)燥熱之邪入血分，迫血妄行 (D)燥入下焦，灼燬真陰
- 32 承上題，以下列何方治之最適宜？
(A)清營湯《溫病條辨》 (B)加減玉女煎《溫病條辨》
(C)犀角地黄湯《溫病條辨》 (D)黃連阿膠湯《溫病條辨》
- 33 依《金匱要略》，下列何者為瓜蒌瞿麥丸的藥物組成之一？①茯苓 ②薯蕷 ③附子 ④天花粉
(A)①② (B)③④ (C)①②④ (D)①②③④
- 34 依《金匱要略》，下列何者為當歸芍藥散的藥物組成之一？①人參 ②白朮 ③茯苓 ④澤瀉
(A)①②③ (B)①②④ (C)②③④ (D)①②③④
- 35 依《金匱要略》，由生薑、麻黃、甘草、石膏、半夏、大棗等組成之處方，可用於治療下列何者？
(A)咳有微熱，煩滿，胸中甲錯
(B)肺脹，咳而上氣，煩躁而喘，脈浮者，心下有水
(C)咳而上氣，此為肺脹，其人喘，目如脫狀，脈浮大
(D)時出濁唾腥臭，久久吐膿如米粥
- 36 依《金匱要略》，下列何者為豬苓散的藥物組成之一？①茯苓 ②白朮 ③阿膠 ④滑石
(A)①② (B)①②③ (C)①②④ (D)①②③④
- 37 依《金匱要略》，下列何者可主治陰寒痼結引起的「心痛徹背」？
(A)四逆湯 (B)枳實薤白半夏湯 (C)烏頭湯 (D)烏頭赤石脂丸
- 38 依《金匱要略》，下列何者為赤丸所主治的病機？
(A)脾腎虛寒，水飲上逆 (B)寒實內結
(C)脾腎虛寒，中焦寒甚 (D)脾胃虛寒，水濕內停
- 39 依《金匱要略》，有關柔痙的病機，下列何者正確？
(A)表實傷寒，衛氣閉塞，筋脈不利 (B)表虛風傷於外，營衛不利，津傷於內，筋脈失養
(C)邪入陽明，熱甚傷陰，筋脈失養 (D)風濕滯留肌表，阻遏陽氣，化熱化燥
- 40 承上題，治以下列何方最適宜？
(A)桂枝、芍藥、甘草、大棗、生薑、葛根、麻黃 (B)葛根、桂枝、芍藥、甘草、大棗、生薑
(C)桂枝、芍藥、甘草、生薑、枳實、大棗 (D)枳實、桂枝、芍藥、甘草、生薑、大棗
- 41 《金匱要略》中有關服用小青龍湯後的變證及處理，下列敘述何者錯誤？
(A)若患者下焦陽虛，支飲上甚，則容易發生「氣衝」的變證
(B)可與茯苓桂枝五味甘草湯，治其氣衝
(C)衝氣即低，而反更咳胸滿者，可用桂苓五味甘草湯去桂加乾薑、細辛，以治其咳滿
(D)咳滿即止，而更復渴，衝氣復發者，以桂苓五味甘草去桂加生薑細辛半夏湯去其水
- 42 承上題，若經處理之後，患者水去嘔止，但是其人形腫者，則下列敘述何者錯誤？
(A)可加杏仁主之，因為可續清餘邪，兼以宣利肺氣
(B)不可納麻黃的原因是以其人氣虛，麻黃散其氣故也
(C)假如逆而納入麻黃，容易導致厥逆的變證
(D)其後若發生面熱如醉的兼證，可加大黃以利之

- 43 34 歲女性患者，主訴腹痛近 1 日，生產後已 1 週，腹痛隱隱，喜溫喜按，口不乾渴，納可，二便可，視其面色淡白，少氣懶言，舌淡白苔白，脈細弱，下列何方最適宜？
(A)芍藥甘草湯 (B)當歸芍藥散 (C)生化湯 (D)當歸生薑羊肉湯
- 44 29 歲男性患者，主訴為大便時出血鮮紅近 3 日，每次出血兼有膿液，現症狀體徵有頭暈心悸，少氣懶言，四肢無力，舌紅苔黃膩，口乾渴喜飲，飲食尚可，大便黏膩不暢日 2-3 行，脈滑數，治以下列何者最適宜？
(A)艾、乾薑、柏葉
(B)甘草、乾地黃、白朮、附子、阿膠、黃芩、伏龍肝
(C)當歸、藕節、仙鶴草、赤小豆、漿水
(D)黃芩、黃連、大黃
- 45 下列有關臌脹的敘述何者錯誤？
(A)治療臌脹服用逐水藥物，最好在晚上飯後為宜
(B)臌脹主要以氣、血、水瘀積於腹內，初起一般以氣結為主
(C)臌脹病人出現吐血、便血、神昏、無尿等症狀，多為預後不良
(D)肝脾血瘀與肝腎陰虛是臌脹病情最嚴重的兩個證型
- 46 陳老先生患 B 型肝炎多年，十年前即被診出肝硬化，近來腹部常覺脹滿不舒，無緣無故牙齦出血或流鼻血，口乾燥但飲不多，夜裏常覺心煩難以入睡，舌質紅絳，苔薄少，舌面乾而無津，脈弦細數。下列何者為其最佳治則？
(A)滋養肝腎，涼血化瘀 (B)行氣利水，活血化瘀
(C)清心利水，滋養肝腎 (D)涼血止血，清熱利水
- 47 下列關於「頭痛」辨證之敘述，何者正確？
(A)瘀血頭痛多見悶痛、脹痛 (B)少陰頭痛多發於頭頂，連及耳尖
(C)陽明頭痛多發於額角，痛連兩側太陽穴 (D)太陽頭痛多在後頭部，下連於項
- 48 64 歲女性突然覺得心悸，驚慌不安，不能自主，胸悶不舒，曾接受歸脾湯和安神丸等方治療無效。《醫林改錯》一書認為患者治療的處方為下列何者？
(A)炙甘草湯 (B)膈下逐瘀湯 (C)血府逐瘀湯 (D)通竅活血湯
- 49 24 歲女性患者容易胸悶泛噁，不定期短暫頭暈後隨即突然仆倒，昏不知人，兩目上視，口噤不開，喉中怪聲，肢體抽搐，肌肉強直，良久乃甦，口吐白沫，有時二便失禁，苔白膩，脈弦滑。下列有關患者證型病機與治療的敘述，何者正確？
(A)證型－肝火痰熱型 (B)病機－脾不健運，胃失和降
(C)治法－滌痰熄風，開竅定痛 (D)主方－龍膽瀉肝湯
- 50 有關癲狂的敘述，下列何者正確？
(A)癲證以精神亢奮，狂躁剛暴，動而多怒為特徵
(B)狂證多由痰氣鬱結，蒙蔽心竅所致
(C)朱丹溪首先提出「痰迷心竅」之說
(D)癲證與狂證二者在臨床上不能互相轉化
- 51 李小姐突然腹痛，持續加重，或陣發劇痛，腹痛脹滿，拒按，口乾苦，小便黃赤，舌苔黃燥，脈弦數。應治以下列何方最適宜？
(A)大承氣湯 (B)柴胡疏肝散 (C)龍膽瀉肝湯 (D)少腹逐瘀湯
- 52 某患者常打嗝，呃聲連連，胸脅脹悶，隨情志不安則發作，飲食不下，頭目昏眩，苔薄白，脈弦滑。方藥以下列何者最適宜？
(A)益胃湯加陳皮、厚朴 (B)橘皮竹茹湯加玉竹、生地
(C)旋覆花代赭湯加香附、柴胡 (D)丁香柿蒂散加吳茱萸、高良薑
- 53 18 歲男性，主訴昨晚與朋友聚餐，騎車回家受風寒，今頭痛發熱惡寒，肩頸痠痛，嘔吐數次，胸膈滿悶。根據病情，下列治療何者最適宜？
(A)可先祛外感風寒之邪，邪去則嘔吐自止 (B)本病人屬飲食不節，治宜保和丸消食去積
(C)本病屬食滯嘔吐，宜用下法去其腸胃實熱 (D)可溫中化飲，降逆止嘔，藥用小半夏湯
- 54 下列何書提出「時行感冒」之名，此後多用桑菊飲、銀翹散之類辛涼解表方來治療？
(A)《類證治裁》 (B)《丹溪心法》 (C)《溫病條辨》 (D)《諸病源候論》

- 55 某患者有喘逆上氣，胸脹或痛，息粗鼻煽，咳而不爽，痰吐稠黏，伴有形寒身熱，煩悶，身痛，有汗或無汗，口渴，苔薄白，邊紅，脈浮數等表現，此診斷以下列何證最適宜？
(A)風寒襲肺 (B)痰熱鬱肺 (C)痰濁阻肺 (D)表寒裡熱
- 56 哮喘發作期，喘而氣粗息湧，喉中痰鳴如吼，胸高脅脹，咳喘陣作，痰黃或白，黏濁稠厚，咳吐不利，口渴喜飲，面赤，苔薄黃膩，舌質紅，脈浮數，宜以下列何方治之？
(A)定喘湯 (B)射干麻黃湯 (C)蘇子降氣湯 (D)三子養親湯
- 57 某少年外感後，出現耳鳴、耳內作癢，伴見頭痛身痛、眩暈、嘔逆，見其舌淡紅苔薄白，脈浮數，治以下列何方最適宜？
(A)龍膽瀉肝湯 (B)銀翹散 (C)翹荷湯 (D)清上防風湯
- 58 症見夢感精瀉，常伴心悸、失眠、頭暈、神思不寧、腰膝酸軟、陽強易舉，小便短赤，舌質紅，苔薄黃，脈弦細數，其辨證為何？
(A)勞心太過，心氣虛衰 (B)心脾兩虧，精關不固
(C)心火亢盛，相火妄動 (D)精氣虛衰，腎不固澀
- 59 30 歲男性患者主訴尿血已 3 日，症見小便頻急灼痛，少腹脹滿，身熱不揚，渴不欲飲，診其舌質紅苔黃膩，脈滑數。最宜以下列何方治療？
(A)八正散 (B)小蓴飲子 (C)知柏地黃丸 (D)導赤散
- 60 一患者精神抑鬱，善太息，胸脅脹悶，診其苔薄白、脈弦細數，則治以下列何方最適宜？
(A)百合地黃湯 (B)加味逍遙散 (C)甘麥大棗湯 (D)越鞠丸
- 61 46 歲男性糖尿病患者，主訴尿頻多，口乾，腰膝痠軟，尿渾濁，兼見煩躁、遺精、失眠、舌紅，其中醫診斷及治則下列何者正確？
(A)上消，宜清熱潤燥，生津止渴 (B)中消，宜益氣攝精
(C)下消，宜滋陰固腎 (D)兼消，宜實脾利水
- 62 依《蘭室秘藏》，下列對頭痛治療的敘述，何者正確？
(A)清空膏，治療痰厥頭痛 (B)玉壺丸，治療厥陰太陰合病頭痛
(C)吳茱萸湯，治療風濕頭痛 (D)羌活附子湯，治療厥陰頭痛
- 63 關於痺證的敘述，下列何者正確？
(A)痺證的原義為四肢麻木
(B)痛痺之因是感受熱邪而為病
(C)陽虛體質的患者罹患痺證者多為風寒濕痺
(D)痺證見疼痛麻木腫脹，甚至骨節變形，活動受限，當用祛風散寒除濕之劑治療才可奏效
- 64 下列對痿證治療的敘述，何者錯誤？
(A)不可做風治而用風藥 (B)最忌發表，亦恐傷陽
(C)須健脾益氣，益胃養陰 (D)可補氣化痰，方如王清任的補陽還五湯
- 65 張景岳診病重視陰陽與六變，所謂六變，下列何者不在其中？
(A)氣血 (B)表裡 (C)虛實 (D)寒熱
- 66 有關皮膚疾病的望診，下列何者正確？①紅腫焮熱，根盤緊束為癰 ②漫腫無頭，皮色不變為疽 ③初如米粟，根腳堅硬，麻木發癢，頂白而痛為癬 ④形比瘡小，紅熱不甚，起於淺表為疔
(A)①② (B)③④ (C)②③ (D)①③
- 67 某患者的瘡瘡分布如下圖所標示，根據《靈樞·五色篇》的望診理論，該患者可能為下列何者出問題？
(A)肝、膽
(B)大腸、小腸
(C)膀胱、子處
(D)脾、胃



- 69 35 歲男性患者，常覺口乾咽乾但喝水不多，又每年 4、5 月梅雨季節時，覺頭重身重，身倦乏力，大便軟日 2、3 行，溲可，脈細無力，則下列何種舌象為最可能？
(A)苔黃膩質紅，體瘦 (B)苔少質紅，體瘦 (C)苔白質淡紅，齒痕 (D)苔黃白帶膩質紅，齒痕
- 70 20 歲女性，飯後時常噯氣，噯聲低沉斷續，無酸腐氣味，納呆，下列何者為最可能之辨證？
(A)肝氣犯胃 (B)胃虛氣逆 (C)宿食停滯 (D)寒邪犯胃
- 71 某女性患者因寒流來襲，覺身冷難當而就診，下列敘述何者最適宜？
(A)若患者穿衣多，可診為陽虛
(B)若患者有發燒，可診為風寒外感
(C)若患者平日即身冷，近日發熱惡寒，可診為陽虛外感
(D)寒流來襲，身冷難當，可診為外感
- 72 下列幾種脈之「脈象主病及比較」，何者錯誤？
(A)散脈，按之滿指而不聚，漫無根蒂，是氣血耗散，臟腑之氣將絕之象。若足月之孕婦見此脈者，為將臨盆
(B)牢脈，多是病氣牢固，證屬陰寒積著，陰虛證見此脈象，便屬危重徵象
(C)微脈與虛脈之別在於微脈至數分明，虛脈則三部至數不清
(D)洪脈與大脈之別在於洪脈來盛去衰，大脈則無洶湧之象
- 73 下列關於「細脈」之敘述何者錯誤？
(A)就脈之「位數形勢」而言，細脈是形態和氣勢的異常
(B)細脈主陰陽兩虛，諸虛勞損，又主濕病
(C)何夢瑤認為「小脈即細脈」
(D)若溫熱病昏譫見細數脈，是氣分熱邪熾盛的證候
- 74 王醫師於門診帶實習時，適有外感患者，於是問道：「脈位表淺的脈，除了浮脈之外還有那些？」學生回答了下列四個脈象，其中那一個是錯的？
(A)濡脈 (B)弱脈 (C)散脈 (D)芤脈
- 75 有關外感熱病之「痰迷心竅」與「熱入心包」，下列敘述何者錯誤？
(A)皆會出現神志昏迷的症狀 (B)皆有舌苔厚膩的體徵
(C)皆出現熱象，但「痰迷心竅」為身熱不揚 (D)皆出現脈數的體徵，但「痰迷心竅」偏向滑數
- 76 有關「表虛證」之敘述下列何者錯誤？
(A)可分為「外感表虛證」與「內傷表虛證」
(B)臨床上「外感表虛證」與「內傷表虛證」可並見
(C)「外感表虛證」與「內傷表虛證」皆見脈弱
(D)「外感表虛證」與「內傷表虛證」皆見汗出且喜吹風
- 77 下列何者最能說明三焦辨證對六經辨證理論之補充？
(A)陽明燥熱 (B)少陰熱化 (C)太陰濕熱 (D)熱鬱少陽
- 78 馬老師帶學生實習時，要同學們討論「衛氣營血」辨證與「熱象」的關係，下列同學的論點何者錯誤？
(A)血分虛熱證時常見「持續低熱、夜熱早涼或五心煩熱」等熱象
(B)營分證是「身熱不揚，午後熱甚」
(C)氣分證是「發熱不惡寒，反惡熱」
(D)衛分證是「發熱微惡風寒」
- 79 臨床上，肝硬化的重症患者常皮膚出現絲狀如縷，或皮下有紫斑，肚腹脹大、腹皮青筋暴露、嚴重腹水等「臌脹」病症。請問其病機以下列何者最重要？
(A)脾虛無以運水 (B)腎氣虛不制水 (C)血不利則為水 (D)三焦決瀆失司
- 80 48 歲男性患者，罹患高血壓已十年，規則服西藥控制。就診時主訴早晨起床時經常腰背酸痛已經二個月。經診察：以往有腎結石病史，經震波碎石治療，未再復發，後背無扣擊痛。晨起時伴隨手指關節僵緊脹感，待上班活動後才逐漸緩解。夜間小便平均 3-4 次，而且稍有殘尿感。舌苔薄白多津，舌質淡紅，脈沉細。請問患者的診斷下列何者最適宜？
(A)腎陰虛伴肝陽上亢 (B)腎氣虛夾濕 (C)脾氣虛不運化 (D)氣滯血瘀