

101年第二次專門職業及技術人員高等考試醫師考試分試考試、中醫師、營養師、心理師、醫事檢驗師、護理師考試暨普通考試護士考試、101年專門職業及技術人員高等考試中醫師（第一試）考試分試考試、法醫師、語言治療師、聽力師、牙體技術師考試試題

代號：5103
頁次：6-1

等 別：高等考試

類 科：中醫師

科 目：中醫臨床醫學(二)（包括中醫內科學、中醫婦科學、中醫兒科學）

考試時間：1 小時 30 分

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 1 肺心病之患者，在病情上與下列何種證型較無關？
(A)木火刑金 (B)水飲凌心射肺 (C)氣滯血瘀 (D)腎不納氣
- 2 25 歲女性患者，無慢性疾病史，主訴二週前開始咳嗽並有黃膿痰，發熱口乾，胸滿痛。診其舌苔黃質紅，脈洪數，X 光片顯示有肺膿瘍但無開洞，關於此病證之中醫治法，下列何者最適宜？
(A)清肺解表 (B)清肺消癰 (C)排膿解毒 (D)托裏排膿
- 3 承上題，治以下列何方最適宜？
(A)銀翹散 (B)托裏消毒飲 (C)葦莖湯 (D)加味桔梗湯
- 4 32 歲女性患者，罹患支氣管哮喘已二年，自訴不定時發作，尤其是餐後臥時易發，和冷熱飲食及天候變化無關，發作時無惡寒發熱、咽乾或咽痛、咳嗽等症狀，反而會合併有泛酸、脘痞悶、嘈雜等不適感，平時納可，二便平。診其脈滑有力，苔白膩，治以下列何方最適宜？
(A)定喘湯 (B)小青龍湯 (C)半夏厚朴湯 (D)香砂六君子湯
- 5 64 歲男性患者，最近因慢性支氣管炎急性發作就診，症見發燒至攝氏 38.8 度，不惡寒，咽癢咳嗽，痰黃稠，胸悶，喘促，四肢無不適，苔黃膩舌質紅，朱點，脈滑數。治以下列何方最適宜？
(A)銀翹散 (B)瀉白散 (C)千金葦莖湯 (D)麻杏石甘湯
- 6 某患者平時不咳，但每次上台報告或考試等壓力大時容易咳嗽，痰少難出，苔薄白，舌淡紅，脈弦。治以下列何方最適宜？
(A)金沸草散 (B)半夏厚朴湯 (C)華蓋散 (D)黛蛤散
- 7 有關癲狂證的病因病機與辨證論治，下列何者錯誤？
(A)癲狂證患者的家族往往有類似病史 (B)癲狂證的病變部位主要在肝膽心脾
(C)癲狂證的主要病因病機為心脾積熱、肝腎陰虛 (D)癲證可以轉化為狂證，狂證日久又可轉為癲證
- 8 60 歲男性患者，主訴為胸悶痛近 1 週發作，時輕時重，發作時疼痛持續約 1 分鐘，搬重物或爬樓梯後痛易發作，並見呼吸氣短，形寒肢冷等，舌淡紅苔白，脈沉遲，以下列何方治療最適宜？
(A)炙甘草湯 (B)栝蒌薤白白酒湯 (C)生脈散 (D)橘枳薑湯
- 9 68 歲男性患者，罹患高血壓、糖尿病二十年，西藥規則控制中。患者風濕性心臟病，已於十年前接受人工主動脈瓣置換術，目前仍於心臟科門診追蹤診療。來診時主訴手腳末端有寒冷感已十天，近來同時出現面紅、腹痛腹瀉、乾咳、心悸的症狀。診其舌苔薄乾，舌質稍紅，脈沉有力。本病的病機為何？
(A)心陽虧虛 (B)陰竭於內，陽亡於外 (C)陽氣內鬱 (D)陰盛於內，格陽於外
- 10 承上題，面對此病證，如何進一步處理才是最佳方案？
(A)陰盛於內，格陽於外。宜投以通脈四逆湯，以溫通內外陽氣
(B)陰竭於內，陽亡於外。宜投以通脈四逆加豬膽汁湯，益陰回陽
(C)陽氣內鬱。宜投以四逆散，透達陽氣
(D)心陽虧虛。宜投以麻黃附子細辛湯，溫助心陽
- 11 水腫從脾論治的辨證要點，下列敘述何者錯誤？
(A)眼瞼浮腫，繼則四肢皆腫，來勢迅速者 (B)四肢腫，甚至腰以下腫甚，或單腹腫滿者
(C)臨床症見水腫伴有納呆、便溏、身倦之象 (D)水腫發生以前有水濕外受或內傷脾胃之因素

- 12 70 歲男性患者，高脂血症、高血壓已三十年。近日因天氣變化，感冒風寒，發熱 38℃，同時出現惡寒、頭痛、骨節酸痛、無汗的症狀，診之脈浮緊。服麻黃湯後，發出一點汗，熱勢退，但是身體仍覺微溫，仍有惡寒頭痛、骨節酸痛，而且感覺心悸無力，陣發頭暈眩，手足肌肉抽動，站立不穩。此病候的病機為何？
(A)表證未解，陰氣已傷 (B)表證欲解，陰氣已傷
(C)表證未解，陽氣已傷 (D)表證欲解，陽氣已傷
- 13 承上題，面對此病候，如何進一步處理才是最佳方案？
(A)急投以芍藥甘草湯，斂陰固液 (B)靜待表解，陰液自復
(C)急投以真武湯，溫陽利水 (D)靜待表解，陽氣自復
- 14 65 歲男性，主訴小便不爽數月，症見脅腹脹滿，多煩善怒，苔薄黃，舌紅，脈弦，診斷為良性前列腺肥大，以下列何方治療最適宜？
(A)沉香散 (B)八正散 (C)導赤散 (D)豬苓湯
- 15 45 歲女性乾燥症候群（Sjogren's syndrome）患者，症見口乾燥，目乾澀，視物模糊，眩暈耳鳴，兩脅隱痛，指甲枯脆，失眠，腰痠，膝軟乏力，手足易麻，舌質紅苔少，脈弦細數，試問下列診斷何者最適宜？
(A)燥邪犯肺 (B)肺腎陰虛 (C)脾胃陰虛 (D)肝腎陰虛
- 16 承上題，以下列何方治療最適宜？
(A)一貫煎 (B)玉女煎 (C)百合固金湯 (D)清燥救肺湯
- 17 38 歲婦人產後便秘，解出困難，身倦乏力，脈細無力，苔薄白質淡。下列何方治之最適宜？
(A)補中益氣湯加麻子仁丸 (B)潤腸湯合枳實導滯丸
(C)八珍湯加首烏、桃仁、白蜜 (D)溫脾湯加減
- 18 10 歲男童，晨起突然嘔吐，發燒至 38℃，頭身疼痛，胸脘滿悶，不思飲食，舌苔白，脈濡緩。下列處方何者最適宜？
(A)藿香正氣散 (B)葛根芩連湯 (C)新加香薷飲 (D)旋覆代赭石湯
- 19 78 歲男性患者，與友人聚餐後出現胃脘疼痛，脹滿拒按，噯腐吞酸，或嘔吐不消化食物，嘔吐物腐臭，吐後痛減，不思飲食，大便不爽，矢氣與便後稍舒。診其舌苔厚膩，脈滑，治療以下列何方最適宜？
(A)藿香正氣散 (B)保和丸 (C)半夏瀉心湯 (D)香砂平胃散
- 20 20 歲女性患者前一晚因喝冰綠茶，後半夜突然脘痛醒，喝礦泉水後痛勢不減，用熱敷包則減輕，口不乾，苔薄白質淡紅，脈弦緊，以下列何方治療最適宜？
(A)保和丸 (B)柴胡疏肝散 (C)良附丸 (D)六君子湯
- 21 關於痹證之敘述，下列何者錯誤？①行痹乃風邪偏勝，防風湯為主方 ②痛痹痛有定處，乃寒邪偏勝，以烏頭湯為主方 ③著痹肌膚麻木，關節重者，宜痹湯主之 ④久痹痰瘀阻絡，獨活寄生湯主之
(A)③④ (B)①②④ (C)①③④ (D)①②③④
- 22 下列有關鼓脹、水腫與積證之敘述，何者錯誤？
(A)《醫學心悟》：目窠與足先腫，後腹大者，水也；先腹大，後四肢腫者，脹也
(B)鼓脹以腹脹大為主，積證以腹中結塊為主
(C)水腫與鼓脹的病機係肺、脾、腎三臟相干，水液不能正常通調輸布，以致水溢肌膚
(D)積證可為鼓脹之病因
- 23 患者脘腹脹滿，疼痛拒按，噯腐吞酸，厭食，大便粘臭，瀉後痛減，苔膩，脈滑實。下列處方何者最適宜？
(A)枳實導滯丸 (B)柴胡疏肝散 (C)半夏瀉心湯 (D)大承氣湯
- 24 56 歲男性患者，血液檢查 ALT：52 IU/L，albumin：2.8 g/dL，globulin：3.6 g/dL，血液 WBC：3010/ μ L，platelet：72000/ μ L，今日來診，主訴兩脇肋部脹悶，胃納減少，小便量少，下肢水腫，大便軟。脈診：弦細脈，舌診：舌質淡紅，苔薄白，此階段治療以下列何方最適宜？
(A)小柴胡湯 (B)四逆散 (C)實脾飲 (D)濟生腎氣丸
- 25 嘈雜而見噁心吞酸，口渴喜飲，口臭心煩，脘悶痰多，多食易飢，或似飢非飢，舌質紅，苔黃乾，脈滑數，治療宜選用何方？
(A)平胃散 (B)溫膽湯 (C)柴胡疏肝散 (D)香砂六君子湯

- 26 60 歲男性患者，罹患類風濕性關節炎（Rheumatoid arthritis）多年，常晨起時關節僵硬，活動不利，手足多處關節疼痛，痛處常對稱發生，甚至出現手部尺側偏移的變形，其病證最接近於中醫何者之範疇？
(A) 疔瘡 (B) 脈痹 (C) 肌痹 (D) 筋痹
- 27 下列有關脅痛的敘述，何者錯誤？
(A) 病位在肝膽，與脾、胃、腎關係密切 (B) 初病多實證，久病多虛證
(C) 瘀血停著者多以脹痛表現 (D) 外感脅痛多治以利濕清熱
- 28 50 歲女性，主訴腰痛多日，症見腰部冷痛重著，轉側不利，遇陰雨天則加重，苔白膩，脈沉緩，診斷以下列何證最適宜？
(A) 脾濕腰痛 (B) 寒濕腰痛 (C) 腎虛腰痛 (D) 血瘀腰痛
- 29 尿毒症患者，中焦虛寒，血便者，宜黃土湯主之。今多以下列何藥代替灶心黃土？
(A) 赤石脂 (B) 花蕊石 (C) 桑螵蛸 (D) 金櫻子
- 30 癰閉是指小便量少，點滴而出，甚則小便不通為主症的一種疾患。下列相關敘述何者錯誤？
(A) 小便不利，點滴而短少，病勢較緩者稱為「癰」；小便閉塞，點滴不通，病勢較急者稱為「閉」
(B) 「癰閉」之名首見於《內經》，於《素問·靈蘭秘典論》說：「膀胱者，州都之官，津液藏焉，氣化則能出矣。」
(C) 王燾《外台秘要》記載：「……為胞屈僻，津液不通，以蔥葉除尖頭，內陰莖孔中深三寸，微用口吹之。胞脹，津液大通，便癒。」這是最早用導尿術治療小便不通
(D) 正常人小便的通暢有賴於三焦氣化的正常，而三焦的氣化主要又依靠肺脾腎三臟來維持
- 31 30 歲男性早泄，伴有脅痛少腹脹痛，胸悶太息，口中乾苦，少寐多夢，舌紅苔薄白，脈弦，則此病人的診斷證型為何？
(A) 肝氣鬱結 (B) 肝陽上亢 (C) 肝風內動 (D) 肝腎陰虛
- 32 承上題，宜以何方治療？
(A) 柴胡疏肝散 (B) 天麻鉤藤飲 (C) 鎮肝息風湯 (D) 左歸丸
- 33 28 歲年輕男子，主訴小腹澀痛，滿急時疼痛加劇，且小便顏色為紅色，偶夾有血塊，舌尖紅，脈數。治以下列何方最適宜？
(A) 龍骨遠志丸 (B) 坎離既濟湯 (C) 五苓散 (D) 小蓴飲子
- 34 下列有關哮喘之辨證論治，何者正確？
(A) 寒哮苔白滑或白膩，脈弦緊或浮緊，以射干麻黃湯或小青龍湯為主方
(B) 熱哮多有痰熱壅肺，痰黃粘，以清燥救肺湯為主方
(C) 痰哮多喘而氣粗息湧，喉中痰鳴如吼，痰黃濁稠厚，以三子養親湯加味為主方
(D) 虛哮屬氣虛痰熱者，以定喘湯為主方
- 35 癭病頸前腫塊柔軟，心悸不寧，心煩少寐，目乾澀，手顫抖，消瘦乏力，脈弦細數，屬下列何種辨證分型？
(A) 肝火亢盛 (B) 肝氣鬱結 (C) 痰氣交阻 (D) 心肝陰虛
- 36 承上題，以下列何方治療最適宜？
(A) 梔子清肝湯或龍膽瀉肝湯 (B) 加味逍遙散或柴胡疏肝湯
(C) 天王補心丹或一貫煎 (D) 小柴胡湯或溫膽湯
- 37 35 歲男性患者，糖尿病多年，近日煩渴多飲，乾咳無痰，氣短無力，神倦，自汗，舌乾少苔，脈虛大而數，用下列何方最合適？
(A) 百合固金湯 (B) 麥門冬湯 (C) 白虎加人參湯 (D) 清燥救肺湯
- 38 癭病患者，頸前腫塊，按之堅硬，表面不均勻，則下列那些處置是正確的？①如果患者腫塊堅硬不可移動，需考慮石癭的可能 ②作超音波及細針穿刺檢查 ③考慮使用海藻玉壺湯治療 ④不宜考慮外科手術治療
(A) ①② (B) ②③ (C) ①②③ (D) ①②③④
- 39 《內經》中關於消渴的論述，下列何者錯誤？
(A) 關於消渴的名稱，有「消瘴」、「消中」等不同的稱呼
(B) 認為飲食不節，肥甘厚味是致消渴的病因
(C) 《素問·氣厥論》：「心移熱於肺，則為肺消」
(D) 二陽結謂之消

- 40 下列有關「噎膈」的敘述，何者錯誤？
(A)噎指飲食不下或食入即吐
(B)噎雖可單獨出現，亦可為膈之前驅，故往往以噎膈並稱
(C)本證首見於《內經》，認為與津液及情志有關
(D)若飲食能順利嚥下入胃，但食入不化，停留胃中，朝食暮吐，暮食朝吐，則稱為「反胃」
- 41 38 歲女性患者，自訴近來常覺口苦心煩，頭重目眩，胸悶，胃口變差，餐後常噯氣，服胃藥只能稍稍緩解，不易入睡，已開始服用助眠劑。診其脈滑略數，舌淡偏紅，苔黃厚而膩。依上述證候其治則何者最適當？
(A)化痰清熱，養心安神 (B)化痰清熱，和中安神 (C)疏肝瀉熱，養心安神 (D)疏肝瀉熱，和中安神
- 42 41 歲開工廠的阿成因受到金融海嘯的壓力，最近常感頭暈痛，心煩易怒，失眠，面紅目赤，口苦，於 10 多年前就偶有顫側抽痛，近 2 個月來更加嚴重，上下樓梯頭痛更厲害，常常頭痛到無法工作。診其脈弦細數，舌紅苔黃，則下列何方最適宜？
(A)天麻鉤藤飲 (B)川芎茶調散 (C)通竅活血湯 (D)柴胡疏肝湯
- 43 45 歲男性患者因不眠多夢就診，其平常急躁易怒，口乾而苦，小便黃。診其舌紅苔黃，脈弦數，則下列何方最適宜？
(A)溫膽湯加黃連、山梔、珍珠母 (B)龍膽瀉肝湯加生龍骨、生牡蠣、茯神
(C)黃連阿膠湯 (D)酸棗仁湯加五味子、合歡皮、夜交藤、黃連
- 44 64 歲男性患者，因肺腺癌進行標靶治療，出現面部皮膚紅色丘疹並夾膿皰，治以下列何藥最適宜？
(A)皂刺、白芷、天花粉 (B)川芎、桃仁、紅花
(C)丹皮、連翹、赤芍 (D)生地、麥冬、地骨皮
- 45 48 歲男性患者，初開始時因在項部、腋下及鼠蹊部觸摸到腫塊結節，也有癢及發熱感，稍有咳嗽，自汗出，且漸漸變瘦。然而近來治療後身體開始浮腫，尤其是下肢腫成象腿一般，請問出現下列症狀時，何者病勢相對較輕？
(A)足心平滿，紋理消失，腰酸無力，頭上汗出
(B)腹部腫起脹感，呼吸自覺受限，不喘不咳
(C)陰囊腫爛滲液，面色暗如有一層灰煙，反覆低熱
(D)臍腹腫滿凸起，不欲飲食，體重增加
- 46 下列有關癌症之敘述，何者錯誤？
(A)殷墟甲骨文就記有「瘤」的病名，該字具有留聚不去的意思
(B)《黃帝內經》已對發生在人體不同部位的腫瘤作了分類，並認病因是由於「邪氣居其間」所致
(C)「癌」這個字，首次見於宋代東軒居士的外科專著《衛濟寶書》
(D)《三因方論》將瘤分為骨瘤、脂瘤、肉瘤、氣瘤、血瘤、膿瘤六種，並以決潰為大法
- 47 當歸龍薈丸具抗慢性粒細胞白血病的作用，最可能是下列那一個藥物的功能？
(A)當歸 (B)蘆薈 (C)青黛 (D)龍膽草
- 48 55 歲女性患者，腰痛時發疼痛，痛則無法轉側，腰部自覺較冷與沉重感，每遇天氣陰雨則痛加重。診其苔白膩，脈沉而遲緩，治療宜選用下列何方最適宜？
(A)四妙丸 (B)左歸丸 (C)身痛逐瘀湯 (D)腎著湯
- 49 22 歲林小姐於 97 年 6 月 3 日來診，其最近三次月經來潮日期依序為：3 月 22 日、4 月 20 日、5 月 18 日。請問林小姐的月經週期符合下列何者的定義？
(A)月經先期 (B)月經後期 (C)月經先後不定期 (D)月經週期正常
- 50 根據《金匱要略》，婦人經水不利下，下列何方主之？
(A)膠艾湯 (B)溫經湯 (C)四逆散 (D)抵當湯
- 51 朱丹溪主張經行過後，腹中綿綿作痛者的病機，下列何者正確？
(A)血氣實 (B)虛中有熱 (C)鬱滯有瘀 (D)血行而氣滯未盡行
- 52 承上題，下列何者治療最適宜？
(A)四物湯加木香 (B)四物湯加丹皮、黃連
(C)八珍湯加丹皮、梔子 (D)八珍湯加桃仁、香附、黃連
- 53 49 歲婦女月經過期紊亂、經量少、色紫黯、頭暈、耳鳴、眠差、潮熱盜汗、易怒煩躁、舌紅、脈細數，治療處方下列何者最適當？
(A)知柏八味丸 (B)加味逍遙散 (C)天王補心丹 (D)血府逐瘀湯

- 54 導致血瘀崩漏的原因為何？
(A)內傷氣滯，或因外受創傷等因 (B)腎氣不足，致中氣虛不能統攝血液
(C)過食溫熱，辛辣等食物和助陽的藥品 (D)怒氣傷肝，肝經火熾，熱鬱於內
- 55 某女性患者，主訴結婚已八年未孕，近期月經數月不行，證見四肢不溫，小腹冷痛，白帶量多，苔白，脈沉緊，醫者診其為寒凝血瘀。下列何方劑治療最適宜？
(A)《傳青主女科》溫土毓麟湯 (B)《萬病回春》溫清飲
(C)《金匱要略》溫經湯 (D)《景岳全書》歸腎丸
- 56 某女士剛生完產不久，不慎感受風寒，造成陰戶腫痛，甚至痛到碰到衣服被子也痛，陰部看起來沒有焮紅的表現。她同時覺得身體虛弱，怕冷周身骨節酸痛。望其舌苔白膩，診其脈細。就中醫辨證，以下列何方治之最適宜？
(A)《脾胃論》補中益氣湯 (B)《醫宗金鑑》龍膽瀉肝湯
(C)《傳青主女科》祛風定痛湯 (D)《醫宗己任篇》滋水清肝飲
- 57 王孟英於《溫熱經緯》曰：溫邪熱入血室有三證，如經水適斷，而邪乃乘血舍之空虛以襲之者，宜用下列何法治之？
(A)養營以清熱 (B)清熱以安營 (C)破其血結 (D)通其氣滯
- 58 下列有關中醫學專有名詞之敘述，正確的有幾項？①妊娠期陰道少量出血，時下時止而無腰痠、腹痛、小腹脹墜等現象者，可稱為「胞漏」 ②妊娠期腰痠、下腹墜脹而無陰道出血者，可稱為「胎動不安」 ③妊娠期腰痠、下腹墜脹且有陰道少量出血者，可稱為「胎動不安」 ④懷孕三個月以後流產者，可稱為「小產」
(A)一 (B)二 (C)三 (D)四
- 59 患者懷孕六個月，常覺心中煩悶，坐臥不寧。問診發現患者手足心覺熱，口乾咽燥，但喝水不會很多，有時也會乾咳無痰。望其舌紅，苔薄黃而乾，脈細數而滑。下列何種組成治療此一病患最適宜？
(A)桑葉、沙參、貝母、淡豆豉、梔子、杏仁、梨皮
(B)人參、麥冬、茯苓、黃芩、生地、知母、甘草、蓮子心、竹茹
(C)竹瀝、麥冬、黃芩、茯苓、浙貝母
(D)炒梔子、淡豆豉
- 60 產後瘧病，若證屬血虛者，下列何方加味治療最適宜？
(A)三甲復脈湯 (B)華佗愈風散 (C)白朮散 (D)天麻鉤藤飲
- 61 造成「子煩」的病機，下列何項最不常見？
(A)陰血不足 (B)心火偏旺 (C)痰飲停聚 (D)腎氣虛弱
- 62 《醫宗金鑑·婦科心法要訣》關於產後汗出之敘述，下列何者正確？①若微微自汗，是營衛不和，宜調和營衛收斂止汗 ②若周身無汗，獨頭汗出者，乃陰虛陽氣上越之象 ③若頭身俱大汗不止，則恐有亡陽之慮
(A)①② (B)①③ (C)②③ (D)①②③
- 63 下列那一個方劑的組成藥物是山藥、芡實、黃柏、車前子、白果？
(A)清白散 (B)易黃湯 (C)舉元煎 (D)完帶湯
- 64 保產無憂方是《達生篇》方，組方用以升舉胎元的藥物為何？
(A)黨參、升麻、白朮 (B)當歸、白芍、菟絲子
(C)黃耆、荊芥穗、羌活 (D)人參、蘼艾、枳殼
- 65 一位出生未滿一天的新生兒，產程順利，餵食、活力皆正常，血液例行檢查時發現：紅血球 5.9×10^6 個/mm³、血色素 19 g/dL；白血球 17000 個/mm³、中性球 57%、淋巴球 20%、嗜酸球 2%、單核球 10%；血小板 15 萬個/mm³。下列敘述何者正確？
(A)該嬰兒可能有急性細菌性感染，應該立即作血液細菌培養
(B)該嬰兒應該立即施打廣效性抗生素
(C)該嬰兒應該送往新生兒加護病房，密切觀察與治療
(D)宜留在嬰兒室，照常餵養，但仍應注意觀察一般狀況
- 66 依《醫宗金鑑》，小兒感冒門傷風證的敘述，下列何者正確？①臨床表現是身體發熱憎寒，頭疼有汗，嚏涕鼻塞聲重，不時咳嗽 ②用金沸草散開通氣逆 ③解外邪用杏蘇散
(A)①② (B)②③ (C)①③ (D)①②③

- 67 依《幼科雜病心法·初生門》，小兒「胎黃」的治療下列何者正確？①治法當滲濕清熱 ②色微黃者用鵝黃散 ③色深黃者用犀角散
(A)①② (B)②③ (C)①③ (D)①②③
- 68 依《醫宗金鑑》，下列有關風寒喘急之敘述，下列何者正確？①因肺主皮毛，一受風寒，內閉肺氣，則氣逆不降，呼吸氣急，故作喘 ②發熱無汗，宜以華蓋散，汗而散之 ③若肺氣本虛，外復被風寒所傷者，宜以紫蘇飲子，補而散之 ④若肺虛外無風寒所傷，內無痰涎壅塞，惟氣逆喘急者，以加減蘇子降氣湯降其逆氣，其喘自癒
(A)①②③ (B)①③④ (C)②③④ (D)①②③④
- 69 依《幼科雜病心法·吐證門》，「神倦凶動睡露睛，自利不渴頻嘔吐」為虛吐，則下列處方何者最適宜？
(A)丁沉四君子湯 (B)香砂六君子湯 (C)附子湯 (D)附子理中湯
- 70 4 歲孩童，有厭食和異嗜症史，症見形體消瘦，面色萎黃，毛髮稀疏，身倦，易發脾氣，大便溏，舌苔薄黃。下列相關敘述，何者正確？①此屬疳氣 ②可選用資生健脾丸 ③治法應以和脾健運為主 ④本病亦稱疳極
(A)①②④ (B)①③④ (C)②③④ (D)①②③
- 71 有關驚風之徵候，下列何者正確？①竄 ②搐 ③張 ④視
(A)①②③ (B)②③④ (C)①②④ (D)①②③④
- 72 3 歲男童，因發燒腹痛 1 天至中醫兒科求診，證見咽紅，畏寒，四肢冰冷，噁心嘔吐，腹痛合併下利，舌質紅苔白，脈數。依《幼科雜病心法·腹痛門》，以下列何方最適宜？
(A)加減理中湯 (B)香砂平胃散 (C)藿香和中湯 (D)芍藥甘草湯
- 73 依《幼科雜病心法·水腫門》，濕水腫「腫在下者因濕起，急宜利水可安然」，治以下列何方最適宜？
(A)越婢加朮湯 (B)外用貼臍法，內服沉香琥珀丸
(C)重用疏鑿飲，輕用茯苓導水湯 (D)大聖瀉川散
- 74 6 歲男童，睡中經常遺尿，多則一夜數次，醒後方覺，神疲乏力，面色蒼白，肢涼怕冷，下肢無力，腰腿痠軟，小便清長，舌質淡。醫者治以《醫宗必讀》菟絲子散，下列何者非其組成？
(A)益智仁 (B)牡蠣 (C)雞內金 (D)肉蓯蓉
- 75 暑溫出現突然發熱，頭痛，項部強急，微惡風，全身灼熱無汗，口渴，常伴有惡心、嘔吐、嗜睡，以及煩躁不安，舌苔薄白或黃、質偏紅、脈多浮數或滑數。用下列何方治療最適宜？
(A)銀花、鮮扁豆花、厚朴、連翹、香薷
(B)蘇葉、白芷、桔梗、白朮、厚朴、藿香、半夏麴、大腹皮、茯苓、陳皮、甘草
(C)半夏、茯苓、杏仁、薏苡仁、白蔻仁、藿香、豬苓、淡豆豉、澤瀉、厚朴
(D)西洋參、麥冬、知母、甘草、竹葉、黃連、石斛、荷梗、鮮西瓜翠衣、粳米
- 76 依《醫宗金鑑》，描述欲吐不吐，欲瀉不瀉，腹中絞痛，煩渴，大飲，應用下列何處方治療？
(A)理中湯 (B)白虎加參湯 (C)桂苓甘露飲 (D)清暑益氣湯
- 77 有關紫癍的敘述，下列何者正確？①皮膚、黏膜可見瘀點、瘀斑，壓之褪色 ②葡萄疫、肌衄、斑毒等病證，與本病有相似之處 ③紫癍可分血熱、氣虛兩類 ④發於遍身，以腹部居多
(A)①②③ (B)①③④ (C)②③④ (D)②③
- 78 依《醫宗金鑑·痘疹心法》，疹毒熱甚上攻喉，腫痛難堪實可憂，裏熱喉痛，治以下列何方？
(A)清咽利膈湯 (B)桔梗湯 (C)玄參升麻湯 (D)涼膈消毒飲
- 79 依《醫宗金鑑·痘疹心法》，麻疹見形證治，熱閉以三黃石膏湯治療，下列何者為三黃石膏湯組成之一？①黃連 ②大黃 ③青黛 ④麻黃
(A)①② (B)①③ (C)②③ (D)①④
- 80 下列有關嬰兒腹部絞痛（Infantile colic）的敘述何者正確？①此症通常發生於 3 週大之新生兒，但 3 個月內之任何時間均可出現 ②其特徵為反覆發作性的腹痛及哭鬧 ③如症狀輕微，且多發於白天，稱之陣發性騷亂（paroxysmal fussing） ④本症預後甚佳，大多在 9-12 週大即自行消失
(A)①②③ (B)①③④ (C)①②④ (D)①②③④