

101年第二次專門職業及技術人員高等考試醫師考試分試考試、中醫師、營養師、心理師、醫事檢驗師、護理師考試暨普通考試護士考試、101年專門職業及技術人員高等考試中醫師（第一試）考試分試考試、法醫師、語言治療師、聽力師、牙體技術師考試試題

代號：6103
頁次：8-1

等 別：高等考試

類 科：中醫師

科 目：中醫臨床醫學(三)（包括中醫外科學、中醫傷科學、中醫五官科學）

考試時間：1 小時 30 分

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆 在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。


(三)禁止使用電子計算器。

- 1 下列何者生膿的速度最快？
(A)漏底風 (B)流痰 (C)腕癰 (D)蛇眼疔
- 2 下列何者的臨床表現是以耳內悶腫出膿為其特徵？
(A)耳疳 (B)耳疔 (C)耳痔 (D)耳菌
- 3 55 歲男性病患，在右足踝內側近關節處，出現堅硬，漫腫，皮色不變，時時隱痛，難於行立者，請問下列診斷何者錯誤？
(A)走緩 (B)鞋帶 (C)腳拐毒 (D)驢眼毒
- 4 有關「走馬牙疳」，下列敘述何者錯誤？
(A)癖積毒火攻牙者，宜服蘆薈消疳飲 (B)疹痘餘毒所中者，宜服清疳解毒湯
(C)苔黃便秘，脈數有力者，宜服涼膈散 (D)如熱久津傷，無實熱證狀者，兼服人參茯苓粥
- 5 1 歲王小弟，在腸胃型感冒後口生白斑，越長越多，啼叫不安，經診察口腔如圖，且咽喉腫起，難於乳哺，此為何證？


- (A)雪口
(B)乳蛾
(C)喉癰
(D)喉菌



- 6 下列何種癰隨處可發生？
(A)厲癰 (B)脇癰 (C)痘癰 (D)黃瓜癰
- 7 各治法雖不雷同，但總以下列何法為主體？
(A)散風發表 (B)清火解毒 (C)和營養陰 (D)瀉熱止痛
- 8 腦疽初起，出現口唇焦紫，大渴、大便結燥，宜服用下列何方？
(A)內疎黃連湯 (B)琥珀膏 (C)仙方活命飲 (D)白虎湯
- 9 有關「鬚疽」，下列敘述何者正確？
(A)生於鬚角，為手足少陽二經所過，最易腐潰
(B)初起宜服柴胡清肝湯
(C)瘡堅痛少，潰而膿微，瘡形散漫不聚者，治以消毒為主，托裏為輔
(D)根盤不開大而聚縮者，乃屬真氣虛而邪氣實
- 10 某患者罹患赤白遊風，皮膚出現病灶起如雲片，浮腫焮熱，痛癢相兼，高壘如粟，色白者，初宜服荊防敗毒散疏解之，次宜服何方治療為佳？
(A)四物消風飲 (B)烏藥順氣散
(C)清胃湯 (D)補中益氣湯加防風、蟬蛻、殭蠶、生何首烏

- 11 下列何種疾病，最常因風寒濕三氣合而為病？
(A)四彎風 (B)白屑風 (C)腎囊風 (D)鶴膝風
- 12 一名就讀國中三年級女學生，最近頭皮出現病灶如附圖所示，毛髮成片脫落，其最可能的診斷為何？
(A)釘腦疔 (B)玉枕疽 (C)髮際瘡 (D)油風
- 
- 13 有關「疥腮」，下列敘述何者正確？
(A)好發於春、冬二季，以老人及體弱人最易染病
(B)可經由飛沫及直接接觸感染病人之唾液而傳染
(C)一般人皆可被感染，感染後通常會再復發
(D)初起病狀雖輕，但極易傳變，很難治癒
- 14 4 歲男童，平日體弱，臀部經常有疔瘡發作，數週前外感，隨之出現高燒、頭痛、大腿外側骨頭壓痛等症狀，根據病情描述，此童可能罹患下列那一種病？
(A)坐板瘡 (B)附骨疽 (C)臀疽 (D)臀癰
- 15 下列敘述，何者最為正確？
(A)「風疽」多生於大腿 (B)「附骨疽」多生於脛骨
(C)「緩疽」多生於足背 (D)「敦疽」多生於足趾
- 16 肉癭的病因與下列何項無直接關係？
(A)腎水不足 (B)憂思鬱怒 (C)肝鬱不達 (D)脾失健運
- 17 下列何方可通治五淋？
(A)五苓散 (B)五淋散 (C)萆薢分清飲 (D)八正散
- 18 有關「疳瘡」，下列敘述何者錯誤？
(A)又名「妬精瘡」
(B)莖上生瘡，外皮腫脹包裹者，名為「袖口疳」
(C)生梅毒時，誤用薰搽藥致腐爛如白者，名為「楊梅內疳」
(D)生於莖之下者，名為「蛀疳」
- 19 有關「陰虱瘡」的證治，下列敘述何者錯誤？
(A)多因性行為而傳染
(B)初起搔癢難忍，抓破色紅，中含紫點
(C)若前陰毛際內形如肉餅，發癢結如蠟皮者，此乃疾將癒也
(D)一般治則，內服宜「蘆柏地黃丸」，外用鍼挑破去虱，擦銀杏無憂散
- 20 有關「奶癬」的證治，下列敘述何者錯誤？
(A)病因多由胎中血熱，出生時落草受風所致
(B)治療時，乾者宜抹「潤肌膏」，濕者宜以嫩黃柏頭末與滑石等分撒之
(C)若熱極皮膚火熱，紅暈成片，遊走狀如火丹，此乃陰不斂陽之徵，治宜收斂，不宜外發
(D)乳母亦需忌食魚腥與辛辣動風發物
- 21 「術者雙手握骨折部，兩拇指按於骨折近端的外側，其他各指抱骨折遠端的內側向外捺正，助手同時在牽拉下內收其上臂即可復位。」上述方法是用於整復下列那一種類型的肱骨外科頸骨折？
(A)裂縫骨折 (B)嵌插骨折 (C)內收型骨折 (D)外展型骨折
- 22 下列何種骨折最不易出現缺血性壞死 (avascular necrosis) 情形？
(A)手腕舟狀骨 (scaphoid) (B)股骨頸 (femoral neck)
(C)橈骨頭 (radial head) (D)月狀骨 (lunate)

- 23 造成肩夾擠症候群（shoulder impingement syndrome）的是下列那一條肌肉的肌腱最常見？
 (A)三角肌（deltoid） (B)棘上肌（supraspinatus）
 (C)小圓肌（teres minor） (D)肱二頭肌（biceps brachii）
- 24 有關「小兒麻痺症」，下列敘述何者錯誤？
 (A)小兒麻痺是由病毒引起的急性傳染病
 (B)病變在中樞神經系統，主要侵犯脊髓後角運動神經細胞，因此可引起肌癱瘓
 (C)從發病到出現肌肉癱瘓約經 2-4 週
 (D)本病發熱之熱型乃初發熱 1-4 天自行消退，經過 3-5 天靜止期，熱度再起，呈雙峰熱型，為本病特徵表現
- 25 25 歲男性患者，因今日騎自行車不慎跌落山谷而無法行走，右髖關節疼痛，且患肢呈現外展外旋，X 光檢查診斷右髖脫位，其手法復位的順序為何？



- (A)④③①② (B)③④②① (C)①③④② (D)③①②④
- 26 有關「膝膕窩囊腫」，下列敘述何者正確？
 (A)屬於結節性囊腫，多發型較多
 (B)原因不明，囊內為水樣物質，清澈不渾濁
 (C)生長緩慢，質軟，觸之有移動感；刺激囊腫會變肥厚、變硬
 (D)會腫大變硬，影響關節活動，X 光片上明顯影響關節結構
- 27 23 歲女性，自訴一年前跌倒以致右膝損傷，右膝酸痛反覆持續至今，上下樓梯時酸痛加重，蹲下困難，膝關節軸位，X 光片如圖示，請問診斷為何？

- (A)股骨髁上骨折
 (B)新鮮髌骨脫位
 (C)股骨髁間骨折
 (D)髌骨習慣性脫位



- 28 下列那一種骨折，可併發「足下垂」的症狀？
 (A)腓骨下端骨折 (B)腓骨上端骨折 (C)脛骨下端骨折 (D)脛骨上端骨折
- 29 骨折的副木外固定最早於何時可以解除，並加強患肢的活動鍛鍊？
 (A)骨折處無壓痛，沿患肢縱軸叩擊才有疼痛時 (B)被動活動患肢時，骨折處還有異常活動
 (C)X 光片顯示骨折線模糊，周圍有連續性骨痂 (D)X 光片顯示骨小樑通過骨折線
- 30 下列那一洗方能專洗跌撲損傷，腫硬疼痛，及一切冷振風濕，筋骨血肉肢體酸痛等？
 (A)五加皮湯 (B)八仙逍遙散 (C)散瘀和傷湯 (D)海桐皮湯

- 31 有關「尺骨鷹嘴骨折」，下列敘述何者錯誤？
(A)尺骨鷹嘴骨折又稱為鵝鼻骨骨折 (B)兒童常見的骨折之一
(C)需與成人骨脈線未閉合進行鑑別診斷 (D)對骨折診斷有懷疑時，可拍攝健側照片對照
- 32 依《醫宗金鑑·正骨心法》有關臂骨骨折，下列敘述何者錯誤？
(A)臂骨者，自肘至腕，有正輔二根
(B)以手法接對端正，貼萬靈膏，竹簾裹之
(C)俟三日後，開簾視之，以手指按其患處，或仍有未平，再揉摩其瘀結之筋，令其復舊
(D)每日午後，服正骨紫金丹
- 33 有關「脫位」，下列敘述何者錯誤？
(A)肩鎖關節脫位是由於肩鎖韌帶及喙鎖韌帶損傷造成
(B)肘關節脫位合併內上髁骨折，病人易有拇指、食指的感覺異常
(C)肩關節脫位的病人出現三角肌感覺異常，是因腋神經損傷
(D)踝關節脫位常合併骨折；因三角韌帶附著關係，造成內踝骨折
- 34 《備急千金要方》中稱「失欠頰車」，在臨床上以何種型態最常見？
(A)前脫位 (B)後脫位 (C)下方脫位 (D)側方脫位
- 35 肱骨幹骨折處在三角肌止點以上時，骨折近端由於肌肉的牽拉，可發生下列那一種典型的移位？
(A)向前、向內移位 (B)向上、向外移位 (C)向外、向前移位 (D)向上移位
- 36 20 歲男性，經常運動，因膝關節疼痛來院檢查，發現半月板損傷，則下列何項檢查最有可能為陽性徵？
(A)抽屜試驗 (Drawer test) (B)迴旋擠壓試驗 (McMurray's test)
(C)拉離試驗 (Apley's Distraction test) (D)浮髌試驗 (Ballotable patella sign)
- 37 下列那一種骨折晚期可出現骨不連接、進行性肘外翻和牽拉性尺神經麻痺？
(A)肱骨髁上骨折 (B)肱骨外髁骨折 (C)橈骨頭骨折 (D)尺骨鷹嘴骨折
- 38 有關 Galeazzi 骨折（蓋氏骨折），下列何者正確？
(A)橈骨上三分之一骨折合併橈骨頭脫位 (B)橈骨下三分之一骨折合併橈尺下關節脫位
(C)尺骨上三分之一骨折合併橈骨頭脫位 (D)尺骨下三分之一骨折合併橈尺下關節脫位
- 39 25 歲男性當把箱子舉高放置上層櫃子時，突然肩部覺疼痛，手臂無力，致箱子掉落，整個肩部無法活動；門診檢查發現其無法做主動或被動關節活動，且肩部有挫傷史，下列何項疾患要優先考慮？
(A)撞擊症候群 (B)鎖骨下動脈撕裂傷 (C)肩關節脫臼 (D)鎖骨骨折
- 40 承上題，此患者有何重要症狀或徵象可供鑑別？
(A)手指冰冷感 (B)皮下瘀紫斑
(C)手臂麻木感 (D)外觀畸形，呈「方肩」狀
- 41 45 歲男性因打撲損傷，敗血流入胃脘，嘔吐黑血，形氣虛者，依《醫宗金鑑·正骨心法》，宜治以下列何方？
(A)百合散 (B)加味芍藥湯 (C)獨參湯 (D)益氣養榮湯
- 42 依《醫宗金鑑·正骨心法》，有關傷損煩躁，下列敘述何者錯誤？
(A)煩躁自汗頭暈，宜用獨參湯 (B)煩躁脅痛，宜用小柴胡湯
(C)煩躁不寐，宜用加味歸脾湯 (D)亡血過多煩躁，宜用聖愈湯
- 43 Finkelstein's Test 呈現陽性，與下列何種疾病有關？
(A)肱骨外上髁炎 (B)腕隧道徵候群 (C)橈骨莖突韌鞘炎 (D)肱二頭肌肌腱炎
- 44 女僕膝（housemaid's knee）多因是過度跪膝工作所造成之炎症現象，其病位為何？
(A)髌骨上滑囊（suprapatellar bursa） (B)深部髌骨下滑囊（deep infrapatellar bursa）
(C)髌骨前滑囊（prepatellar bursa） (D)鵝足滑囊（pes anserine bursa）

- 45 28 歲裝卸工，在扛一木箱時，突發腰部劇痛，腰部俯仰轉側困難，咳嗽、噴嚏使腰痛加劇，疼痛牽涉雙側坐骨神經區，神經系統檢查無異常，最可能是下列何種疾病？
(A)椎管狹窄症 (B)腰椎骨折 (C)急性腰椎間盤突出 (D)急性腰扭傷
- 46 有關「肩關節周圍炎」，下列敘述何者正確？
(A)肩關節疼痛表現多為晝夜疼痛程度相同，只能靠藥物緩解
(B)主動運動範圍可比被動運動大，可能是代償性肩胛胸壁運動所致
(C)症狀表現為關節周圍軟組織炎性症狀，不影響關節囊容積
(D)一般肩關節 X 光檢查可以確診病因
- 47 某高中舞蹈班學生，練習劈腿時造成下肢損傷，下列何者最可能？
(A)股四頭肌起損傷 (B)股內收肌損傷 (C)股骨大轉子滑囊炎 (D)梨狀肌綜合徵
- 48 依《醫宗金鑑·正骨心法》，髌骨外向之凹，其形似臼，以納髌骨之上端如杵者，名稱為何？
(A)環跳 (B)胯骨 (C)髌關 (D)大槌骨
- 49 有關「落枕」，下列敘述何者正確？①晨起後感到項背明顯酸痛 ②病程較短，通常一週左右即可自行痊癒 ③常與職業有密切關係，好發於老年人 ④檢查時，於斜方肌及大小圓肌亦常有壓痛感
(A)①② (B)①③ (C)②④ (D)③④
- 50 有關肘部扭挫傷之診斷治療，下列何者錯誤？
(A)有明顯外傷史，肘關節處於半屈伸位，瀰漫性腫脹、疼痛、功能障礙，有的出現瘀斑
(B)環狀韌帶的斷裂常使橈骨頭脫位併尺骨上段骨折
(C)肘部損傷後功能訓練進行愈快愈好，尤其在恢復期應盡量作被動屈伸來拉開粘連，增加活動度
(D)肘部扭挫傷早期患肢用三角巾懸吊，肘關節置於屈曲 90°的功能位，以限制肘關節的屈伸活動，並督促患者作手指屈伸握拳活動，以利消腫
- 51 有關「腱鞘囊腫」，下列敘述何者錯誤？
(A)古稱「腕筋結」、「腕筋瘤」，實際上不是腫瘤
(B)內含有無色透明或微呈白色、淡黃色的濃稠黏液
(C)腱鞘囊腫患者往往在沒有明顯外傷史情況下發現囊性的腫塊
(D)表面光滑皮色不變，與皮膚相連，局部溫度稍高
- 52 有關「手指傷筋」，下列敘述何者正確？
(A)指間關節扭挫傷多見於老年人 (B)屈指肌腱腱鞘炎又稱「媽媽手」
(C)「錘狀指」為手指屈指肌腱斷裂所致 (D)扳機指嚴重者屈曲後不能自行伸直
- 53 橈骨莖突狹窄性腱鞘炎會侵犯那些肌腱？
(A)外展拇長肌、伸拇短肌 (B)外展拇長肌、伸拇長肌
(C)外展拇短肌、伸拇短肌 (D)外展拇短肌、伸拇長肌
- 54 50 歲男性患者，因搬重物扭傷左脅部已五天，就診時欲以理筋手法治療，則下列何手法最合適？
(A)滾法 (B)拿捏法 (C)擦法 (D)揉法
- 55 有關「繼發性腰椎椎管狹窄症」，下列敘述何者錯誤？
(A)椎間盤退變，椎間隙變寬，韌帶緊繃，腰骶角變小，椎體因此退向後側方而壓迫脊柱
(B)凡是造成解剖關係失常的損傷，均可造成椎管狹窄，如外傷後硬膜外血腫機化或骨折後骨痂突入椎管，均致狹窄
(C)骨移植或脊柱融合術後，椎板增厚或黃韌帶增厚，以及後關節突的膨大或骨質增生，因而使椎管狹窄
(D)硬膜外軟組織變性、椎管內靜脈曲張、軟骨發育不良、畸形性骨炎、骨質疏鬆症等，均可致椎管狹窄

56 下列何種檢查方式，可用來檢查棘上肌肌腱損傷？

(A)



(B)



(C)



(D)



57 有關「跟部滑囊炎」，下列敘述何者錯誤？

- (A) 多有慢性損傷史，多為一側足跟痛，站立過久或劇烈運動後，足跟部疼痛加劇
- (B) 跟腱起點的前、後、前下部，各有微小的滑囊，小腿脛後肌過多的收縮，引起跟部滑囊炎
- (C) 局部輕度腫脹，跟腱止點處壓痛明顯，可摸到捻髮音，應與跟骨骨骺炎、蹠筋膜炎作鑑別診斷
- (D) 部分患者踝關節側位 X 光片可見足跟後方透亮三角區模糊或消失

58 有關「腰椎間盤突出症神經根壓迫」之症候，下列敘述何者錯誤？

- (A) 70-80% 的患者膝、跟腱反射異常，腰 3-4 椎間盤突出多使膝反射改變；腰 4-5 椎間盤突出則跟腱反射異常
- (B) 足背伸肌和伸拇肌力減弱時，是腰 4-5 椎間盤突出；足蹠屈或立位單腿蹠起肌力減弱，則是腰 5 骶 1 椎間盤突出
- (C) 腰 4-5 椎間盤突出，感覺障礙在小腿外側及足背，腰 5 骶 1 椎間盤突出，則感覺障礙在小趾、足外側及小腿後側
- (D) 表現在大腿小腿的肌肉萎縮，兩側比較，肌肉萎縮程度與神經根受壓迫病程長短成正比

59 有關「彈響髖」，下列敘述何者錯誤？

- (A) 一般青年人較多見
- (B) 因髂脛束在股骨大轉子上滑動所致
- (C) 常影響關節活動，造成明顯疼痛、不適感
- (D) 需要與先天性髖關節脫位鑑別

60 42 歲男性患者，從事室內裝潢工作，主訴反覆肩痛已三月餘，疼痛程度尚可忍受，但偶夜間痛醒，外觀無明顯紅腫，經詢問無特殊運動傷害或明顯外傷史，經檢查 Hawkins impingement sign（霍金氏夾擊現象）為陽性，X 光如圖所示。根據上述，初步可以診斷為何種疾病？

- (A) 肩峰鎖骨關節骨刺
- (B) 三角肌勞損
- (C) 棘上肌鈣化
- (D) 肱骨大轉子骨裂



61 依《醫宗金鑑·眼科心法》，下列敘述何者錯誤？


- (A)黑睛屬巽，水廓也 (B)白睛屬乾，天廓也
(C)內眥大眥屬離火，震雷之廓也 (D)外眥小眥屬艮山，兌澤之廓也

62 依《素問·解精微論》，心者，五臟之專精也，何者為其竅也？


- (A)耳 (B)目 (C)鼻 (D)舌

63 腎陰虛火旺可導致何種眼證？

(A)



(B)




(C)



(D)



64 一老婦人，自年輕起眼睛即長年有分泌物，眼痛澀，患者一直未接受治療，求診時如圖箭頭所示，下列敘述何者正確？



- (A)上胞下垂，瞼輪黏合
(B)漏睛症過久，毒邪鬱積，黏合而成
(C)邪毒久鬱，脈絡鬱阻，胞瞼重壅而成
(D)毒邪損及胞瞼與白睛表層，使瞼肉與白睛黏著，阻礙眼睛轉動，為椒瘡之後遺症

65 患者病初起時，出現眼瞼部局部紅腫癢痛，伴有頭痛，發熱，全身不適等症，舌苔薄白，脈浮數，有關其證治，下列敘述何者錯誤？

- (A)本病為緣於風熱外襲之針眼
(B)治宜疏風清熱
(C)方宜銀翹散，以薄荷、豆豉、荊芥、銀花、連翹疏風解表，以石膏、梔子清熱解毒
(D)證偏熱重者，可去荊芥、豆豉，加黃連、黃芩以助清熱解毒

66 60 歲男性勞倦後頭眩眼脹，視物昏朦如山煙籠罩，眼觀燈火有虹暈，視力下降，瞳神散大，眼壓 50 mmHg，眼珠變硬，失眠耳鳴，口燥咽乾，舌絳少苔，脈細數，下列有關患者的治療，何者較正確？

- (A)龍膽瀉肝湯 (B)丹梔逍遙散 (C)黃連溫膽湯 (D)阿膠雞子黃湯

- 67 有關「風輪赤豆」，下列敘述何者錯誤？
(A)多見於小兒 (B)易反覆發作 (C)不影響視力 (D)類似束狀角膜炎
- 68 有關「風牽偏視」，下列敘述何者正確？
(A)《證治準繩·眼門》稱之為瞳神將反 (B)視一為二，為其臨床特徵
(C)風邪中絡，可以補陽還五湯加減主治 (D)絡脈瘀阻，可以小續命湯加減主治
- 69 有關耳鼻喉口齒科癌症，下列敘述何者錯誤？
(A)鼻咽癌：早期症狀不明顯，症狀明顯者，多已出現轉移
(B)咽菌：好發於聲門區與會厭喉側面，常見聲音嘶啞，甚則呼吸困難
(C)舌菌：好發於舌尖邊或舌根，初起舌面易出現增厚斑塊，潰瘍
(D)上頷竇癌：會出現局部疼痛，在患側鼻道流出臭味帶血的膿水
- 70 26 歲男性突然耳聾，下列何者最不可能是導致該患者突然耳聾（暴聾）的病因？
(A)風邪 (B)肝、腎陰虛 (C)疔毒 (D)熱邪
- 71 耳科疾病中有關耳脹耳閉，下列敘述何者錯誤？
(A)病初起，耳內脹而兼痛稱耳脹 (B)病之久者，耳內如物阻隔清竅閉塞，稱為耳閉
(C)與急性、慢性化膿性中耳炎相似 (D)若兼耳鳴，妨礙聽覺屬「卒聾」、「風聾」
- 72 耳朵與五臟的關係密切，下列那二臟開竅於耳，若臟氣平和，則聽覺聰敏而可聞五音矣？
(A)腎心 (B)腎肝 (C)腎脾 (D)腎肺
- 73 「腦漏」是指鼻流濁涕，如泉下滲，量多不止之鼻病，此症狀相當於現代醫學之何種鼻病？
(A)萎縮性鼻竇炎 (B)慢性肥大性鼻炎 (C)過敏性鼻炎 (D)慢性鼻竇炎
- 74 鼻槁，亦稱鼻乾燥，其病因病理，下列敘述何者錯誤？
(A)肺臟虧虛，鼻失養滋所致 (B)脾氣虛弱，濕蘊生熱所致
(C)膽腑虛熱，熱煉津液所致 (D)腎陰虧虛，肺津亦少所致
- 75 咽喉疾患若以聲音為辨證的依據，其聲嘶日久，咽乾不喜飲，多屬何證？
(A)肺腎陰虛，陰精虧損 (B)胃火傷津，邪毒內攻 (C)肺脾氣虛，痰阻中焦 (D)心火上炎，心腎不交
- 76 有關「牙痛」，下列敘述何者錯誤？
(A)多為風、火、蟲、虛所致
(B)若為齲齒牙痛，可以清胃湯加露蜂房、海桐皮內服治之
(C)若為齲齒牙痛，可以龍眼肉、當歸等量煎水漱口
(D)齒為骨之餘，腎主骨，故虛證多腎虛火炎
- 77 鼻衄，因外感風熱或燥熱之邪，犯肺所致，肺經熱盛，內治宜疏風清熱，涼血止血，處方以桑菊飲清熱宣肺，更加何藥涼血止血？
(A)當歸、乳香、沒藥 (B)紅花、赤芍、地榆炭
(C)丹皮、白茅根、山梔炭 (D)桃仁、川芎、黃耆
- 78 喉癰辨證中要如何分辨有膿無膿？
(A)出現痰鳴氣急，喘咳，呼吸困難，喉底一側，紅腫突起，咽壁紅腫，頸部有瘰核，是為膿已成
(B)若腫脹散漫，可用壓舌板輕觸患處，紅腫光亮，高突，四周紅暈緊束，按之軟者，是為膿已成
(C)若腫脹散漫，可用壓舌板輕觸患處，喉底一側，紅腫突起，咽壁紅腫，按之堅硬者，是為膿已成
(D)喉底一側，紅腫突起，咽壁紅腫，頸部有瘰核，按之痛覺散漫，是為膿已成
- 79 鼻塞因邪毒久留氣滯血瘀所致，可選用下列何方加減內服治療？
(A)丹梔逍遙散 (B)養陰清肺湯 (C)當歸龍薈丸 (D)當歸芍藥湯
- 80 火熱上炎，煉津成痰，痰涎結聚於咽喉，最宜用下列何者治療？
(A)瓜蒌、貝母、竹茹、射干 (B)熟地、山萸肉、淮山藥、女貞子
(C)皂角刺、陳皮、半夏、連翹 (D)薄荷、夏枯草、地丁、杭菊