

107年第一次專門職業及技術人員高等考試醫師牙醫師藥師考試分階段考試、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師、職能治療師、呼吸治療師、獸醫師考試、107年專門職業及技術人員高等考試藥師考試
代 號：3312

類科名稱：職能治療師

科目名稱：生理障礙職能治療學

考試時間：1小時

座號：_____

※本科目測驗試題為單一選擇題，請就各選項中選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分！

※注意：本試題禁止使用電子計算器

- 1.治療師注重個案的有目的活動及其生活經驗，以介入輔導其對生理障礙的心理調適，是下述何種理論模式？
 - A.心理動力模式（Psychodynamic Model）
 - B.認知行為模式（Cognitive-Behavioral Model）
 - C.人類職能模式（Model of Human Occupation）
 - D.健康模式（Wellness Model）
- 2.依據生命週期不同的階段，成年期最主要的發展任務包含下列何者？
 - A.同儕接受情形
 - B.身體外觀
 - C.生活獨立
 - D.尋找伴侶
- 3.當治療師在晤談個案時，發覺個案有身體後移退縮情形時，治療師為維持治療關係，不宜採行下列何種方式？
 - A.減少質問
 - B.放鬆姿態
 - C.緩和眼光接觸
 - D.身體前傾靠近個案以示關切
- 4.下列有關輪椅的背靠高度，何者錯誤？
 - A.跟姿勢穩定度有關
 - B.運動員的背靠會較高以提供姿勢穩定，便於運動
 - C.頸髓損傷患者的背靠會較高以提供穩定度
 - D.依個人需求高度不一，一般在肩胛骨下角處
- 5.下列那一個評估工具可同時評估日常生活獨立性以及神經行為損傷形式與嚴重性？
 - A.Canadian Occupational Performance Measure
 - B.Functional Independence Measure
 - C.Arnadottir Occupational Therapy Neurobehavioral Evaluation
 - D.Frenchay Activities Index
- 6.執行工作時，下列何者為錯誤的身體機制（body mechanics）？
 - A.需要長站時，可以將一腳放在低凳子上以降低背部壓力
 - B.在提舉東西時，儘量將東西靠近身體
 - C.執行工作時，儘量少變換姿勢以避免疲勞
 - D.舉物體時，不要扭轉軀幹
- 7.關於美國失能者法案（Americans with Disabilities Act）中規定的無障礙環境，下列敘述何者錯誤？
 - A.走道上的飲水機不得突出牆面

- B.包括消弭溝通障礙，調整訊息傳遞方式確保失能個案能了解
 - C.斜坡需全程有扶手，並與斜坡等長
 - D.需有懸吊式洗手檯，方便坐輪椅者使用
- 8.關於環境控制系統（environmental control unit）常用的控制訊號，下列敘述何者正確？
- A.透過室內電源系統者，大多只提供「開－關」功能
 - B.紅外線訊號傳遞路徑不受物體遮擋
 - C.無線電頻（radio frequency）訊號通常只有單一頻道
 - D.超音波訊號傳送距離比較短，但不被物體阻擋
- 9.魏氏成人智力量表中，常識（information）分測驗，所測量的內容在性質上屬於下列何者？
- A.事件性記憶（episodic memory）
 - B.語意性記憶（semantic memory）
 - C.程序性記憶（procedural memory）
 - D.立即性記憶（immediate memory）
- 10.下列有關羅文史坦職能治療認知評估（Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment, LOTCA）的敘述，何者錯誤？
- A.評估內容包括定向感、注意力及思考操作（thinking operations）
 - B.評估的範圍概念屬職能表現要素（performance components）
 - C.適合用來區辨出正常與輕微認知功能缺損者
 - D.具有常模
- 11.下列何者不是專門設計用於腦傷患者之評量工具？
- A.福格梅爾測試（Fugl-Meyer Motor Assessment）
 - B.伯格氏平衡量表（Berg Balance Scale）
 - C.動作評估量表（Motor Assessment Scale）
 - D.芙蘭切氏活動量表（Frenchay Activity Index）
- 12.將手伸入口袋，從一堆物品中掏出汽車鑰匙；主要應用了那一項感覺功能？
- A.視覺空間（visual spatial）
 - B.圖像覺（graphesthesia）
 - C.身體圖像覺（body scheme）
 - D.實體覺（stereognosis）
- 13.家庭主婦要將廚房用具分門別類收納到櫥櫃裏，需要運用那一項認知功能？
- A.概念形成（concept formation）
 - B.創造功能（creative function）
 - C.推理能力（reasoning）
 - D.問題解決（problem solving）
- 14.依據Warren所提出之視知覺階層（a hierarchy of visual perception），職能治療師評估時下列項目之進行順序為何？①視覺注意力（attention） ②眼球動作控制（oculomotor control） ③視覺掃描（scanning） ④形態再認（pattern recognition）
- A.①②③④
 - B.②①③④
 - C.①②④③

D.③②①④

15.下列何者為運動神經元疾病（motor neuron disease）？

- A.肌萎縮性側索硬化症（amyotrophic lateral sclerosis）
- B.帕金森氏症（Parkinson's disease）
- C.多發性硬化症（multiple sclerosis）
- D.阿茲海默氏症（Alzheimer's disease）

16.下列有關脊髓損傷之損傷部位與關鍵肌肉之配對，何者正確？

- A.C7—finger abductors
- B.L2—hip extensors
- C.L4—knee extensors
- D.L5—long toe extensors

17.下列那些輔具可用於輔助頸髓第六節完全損傷者進食？①活動手臂支撐架 ②萬用套 ③高邊盤 ④防滑墊

- A.僅①②
- B.①②③
- C.②③④
- D.①③④

18.對處於躁動階段腦傷個案的介入方法，下列何者正確？

- A.使用束縛帶限制肢體動作
- B.出現躁動情形時，立刻更換活動
- C.給予細小插棒活動，增加其手功能
- D.在大治療室中進行治療，以便個案模仿其他人的正常行為

19.下列何者是對患有動作失用症（motor apraxia）中風個案的適當介入方法？

- A.帶著個案的患側手做動作
- B.利用侷限－誘發動作治療（constraint-induced movement therapy）
- C.先從細動作開始練習進展到粗動作活動
- D.利用本體神經肌肉誘發術（PNF）治療

20.對患有肌萎縮性側索硬化症（ALS）第五期的個案，下列有關職能治療的介入，何者錯誤？

- A.主動關節活動
- B.處理疼痛問題
- C.預防褥瘡之產生
- D.床及輪椅之擺位

21.關於徒手水腫操作（Manual Edema Mobilization, MEM）之原則及概念，下列敘述何者正確？

- A.是一種藉由靜脈系統運送水腫區域之組織液或蛋白質分子以消除水腫之方法
- B.是提供中至重度的按摩手法，以提供淋巴系統通路之運行
- C.是一種適用於急性期水腫的手法，並不適用於亞急性及慢性之患者上
- D.按摩手法須依循著淋巴系統通路流動之方向進行

22.A先生因傷造成右手食指的掌指關節最大屈曲角度為40度，可完全伸展；近端指間關節最大屈曲角度為90

度，缺少15度至完全伸展；遠端指間關節最大屈曲角度為65度，缺少25度至完全伸展，則右手食指之完全主動動作（total active motion）為多少？

- A.155度

- B.180度
- C.195度
- D.235度

23.針對類風濕性關節炎（RA）及退化性關節炎（OA）的評估，下列敘述何者正確？

- A.RA及OA並不會影響神經功能，故感覺評估的部分除特殊需求外不須執行
- B.進行徒手肌力測試時，可在無疼痛範圍角度給患者阻力
- C.評估主要重點為生理功能障礙產生的影響，心理、社會影響層面評估可不需考慮
- D.評估個案關節活動度時，須先觀察其關節變形之程度，再將脫位之關節復位以測量正常軸向下之關節活動度

24.中段肱骨骨折常合併那條神經損傷？

- A.橈神經
- B.尺神經
- C.正中神經
- D.肌皮神經

25.下列有關Guillain-Barré syndrome的敘述，何者錯誤？

- A.從手部開始出現症狀
- B.因周邊神經去髓鞘化引起
- C.可能會引起臉部肌肉麻痺
- D.會出現姿勢性高血壓及心跳過速

26.下列日常生活活動，在相同從事時間下何者最耗能？

- A.熱水淋浴
- B.由床轉位到椅子
- C.穿褲子
- D.刷牙洗臉

27.當肩部、胸部及腋下遭受燒燙傷時，在治療過程中，肩關節的最適當擺位是下列何者？

- A.外展30—50度，外旋45度
- B.外展50—70度，外旋90度
- C.外展70—90度，外旋90度
- D.外展90—100度，外旋45度

28.關於痙攣（spasticity），下列敘述何者錯誤？

- A.是大腦皮質（cortex）受傷害的結果之一
- B.與「肌肉高張力（hypertonus）」不是同義字
- C.嚴重度的量測，可用肢體被動拉開之阻力大小來衡量，與拉動之速度無關
- D.量測結果容易受到該肢體先前擺位姿勢的影響

29.人類表現生態（ecology of human performance）模式提出職能治療師可以針對病患本人及環境等相關範疇進行介入，並提出五項介入策略，依序為建立（establish／restore）、改變（alter）、調整（adapt／modify）、預防（prevent）和下列何者？

- A.維持（maintain）
- B.創造（create）
- C.學習（learn）
- D.放棄（give up）

- 30.活動分析報告的內容應包含下列那些內容？①活動步驟與所需時間 ②個案所需具備的技巧 ③所需的空間
④社會與文化的要求 ⑤調整與分級的方式
- A.僅①②
B.僅②③④
C.僅①③④⑤
D.①②③④⑤
- 31.職能治療師訪談收集個案職能表現（occupational performance）的資料，了解失能對個案生活的意義，以連結個案目標與治療程序，職能治療師所用的臨床推理屬於下列何種類型？
- A.實用性推理（pragmatic reasoning）
B.敘述性推理（narrative reasoning）
C.科學性推理（scientific reasoning）
D.程序性推理（procedural reasoning）
- 32.下列有關健康管理及維持（health management and maintenance）功能的敘述，何者錯誤？
- A.在評估及介入上不宜讓護理師或醫師參與
B.可歸類為工具性及基本日常生活活動範疇
C.治療師介入時，除了解個案應有適度的生理能力外，也應了解其認知及知覺功能
D.健康管理及維持包含個案了解自我醫療狀況，及作決策以維持健康的能力
- 33.有關各類型個案使用輔具的考量，下列何者正確？
- A.針對類風濕性關節炎之個案，儘可能不建議使用輔具，以促進個案學習用自身能力進行活動，同時增進生理狀態的恢復
B.建議老人使用具有多功能，可調整及重量稍重的輔具，以方便使用並提供強烈的感覺回饋
C.針對早期認知混亂的腦傷個案，建議儘可能及早介入輔具的媒合及建議，以利加速日常功能的恢復
D.針對高位頸髓損傷患者，為維持其在家生活之目標，可考慮看護或送餐服務，不一定要求其購置輔具自行操作煮食活動
- 34.手部功能受限之類風濕性關節炎及脊髓損傷病患在使用旋扭式開關之電器、廚房設備時，建議採用何種輔具？
- A.knob turner
B.extended-handle reacher
C.zim jar opener
D.wand mouth stick
- 35.針對慢性下背痛患者，下列日常生活活動執行之策略，何者為正確的建議？
- A.建議穿著較為緊身之衣物會比較為寬鬆之衣物提供更好的脊椎支撐效果
B.洗澡時，建議於浴缸沐浴會比站著淋浴更為適切
C.穿脫鞋襪時，建議儘可能站著彎腰執行，以避免坐姿時造成神經再次的壓迫
D.建議於穿鞋、洗澡時使用手柄加長之器具，如長柄鞋把、長柄刷
- 36.有關「單人依賴性滑移板轉位（one-person dependent sliding board transfer）」的描述，下列何者正確？
- A.該轉位法適用於個案能維持站姿，並用單側腳做樞軸動作（pivot action）
B.適用於整體功能有較大限制的個案，如較高位的脊髓損傷患者
C.此轉位法是最可以保護治療師免於傷害的方式
D.執行此類轉位法，治療師須儘可能彎曲軀幹、打直雙腳，以維持好的人體力學姿勢

- 37.下列選項有幾項屬於工具性日常生活活動（instrumental activities of daily living, IADLs）？①盥洗沐浴 ②上大號 ③打手機請假 ④量血壓 ⑤準備早餐 ⑥吃自己做的三明治 ⑦早餐後服用藥物 ⑧換衣服 ⑨餵狗吃飯喝水 ⑩使用電動輪椅去購物
- A.5項
B.6項
C.7項
D.8項
- 38.中風個案注意到自己的患手無法拿穩小物品，因此覺得自己的手功能變差而無法自己扣扣子，則此個案是運用何種認知功能而得到的想法？
- A.發散思考（divergent thinking）
B.觀念形成（concept formation）
C.歸納推理（inductive reasoning）
D.推論推理（deductive reasoning）
- 39.下列有關認知動態互動模式（Toglia's Dynamic Interactional Model of Cognition）主張之敘述，何者錯誤？
- A.認知功能的核心是自我覺察能力及處理策略的運用
B.視覺心像（visual imagery）是屬於內在處理策略
C.遠轉移（far transfer）是指改變活動的3～6個表面特質
D.盡量在不同的環境中練習，以增進個案的經驗
- 40.在測試腦傷個案是否患有失用症時，下列何者屬於intransitive gestures？
- A.要個案做出用鑰匙開門的動作
B.要個案做出打棒球的動作
C.要個案做出「再見」的動作
D.要個案用手抓住同側的耳垂
- 41.二點分辨測驗（two-point discrimination）主在測量下列何種功能？
- A.實體感覺
B.輕觸覺之閾值
C.輕觸覺在大腦皮質內的空間表象
D.神經支配密度
- 42.第10節胸髓損傷的個案，其感覺評估的結果為雙腿喪失所有感覺功能，則治療師應對個案雙下肢提供下列何種感覺介入？
- A.拍打雙下肢，力道由小慢慢至大
B.要個案多練習雙腿承重站立
C.給予個案雙腿不同的刺激，如用不同材質的布料擦拭腿部
D.教導個案保護雙腿皮膚的方法，以免受傷
- 43.在視覺處理過程中，用以分類視覺刺激，並辨認刺激物為何者，是下列何者之功能？
- A.視覺皮質
B.膝狀體距束（geniculocalcarine tract）
C.連結視覺皮質到前額區（prefrontal area）的南路徑
D.連結視覺皮質到前額區（prefrontal area）的北路徑
- 44.張同學週末連續花了近10小時玩Wii，周一早晨旋即發現右手手肘內側出現疼痛現象，其手肘經診斷可能因玩

Wii過度而罹患某疾病，下列敘述何者正確？

- A.使用豎腕副木將手腕固定在伸展約30度之角度，可提供受傷部位適當之固定以修復組織
- B.他罹患了俗稱的網球肘（tennis elbow）
- C.最常發生此疾病的肌肉為橈側伸腕短肌（extensor carpi radialis brevis）
- D.他在執行手腕屈曲（wrist flexion）及前臂旋前（forearm pronation）之阻力性活動時會明顯感受疼痛

45.下列何者不是中風患者常見的異常坐姿表現？

- A.骨盆不對稱承重
- B.產生駝背現象
- C.使用健側手維持直立的姿勢
- D.骨盆前傾

46.一位右腦中風病患，最有可能出現的缺失為下列何者？

- A.容易有挫折感
- B.在數量與計量的運算有困難
- C.對於形狀與動作的知覺處理上有困難
- D.文法與字義運用上的困難

47.有關暫時性缺血發作（transient ischemic attacks）的敘述，下列何者錯誤？

- A.通常有三分之一個案不會有後續再發作情形
- B.有暫時性黑矇（amaurosis fugax）症狀，是由於頸動脈－眼動脈系統血流阻礙，造成視網膜缺血所致
- C.定義上症狀持續不超過12小時
- D.屬中風前的徵兆之一

48.病患小明是一位右腦中風病患，在穿T恤時家人請他舉起雙手，病患只能舉起右手，但當要求單獨舉起左手時，病患又可以達到要求，請問下列何者最符合小明的症狀？

- A.allesthesia
- B.hemiakinesia
- C.hemi-inattention
- D.motor extinction

49.以副木將手部固定在抗畸形（anti-deformity）位置時，下列擺位角度何者正確？

- A.掌指關節保持屈曲70～90度
- B.拇指往掌面外展15～20度
- C.手腕保持自然平直位置
- D.指間關節保持稍微屈曲

50.下列有關應用交替溫差浴（contrast baths）來治療手部水腫的敘述，何者錯誤？

- A.冷水及溫水每次浸泡時間各為1分鐘
- B.冷水溫度：18.9℃；溫水溫度：35.6℃
- C.開始與結束都是以溫水浸泡
- D.整體浸泡時間約為20分鐘

51.關於多發性硬化症（multiple sclerosis）的敘述，何者錯誤？

- A.會造成失智現象
- B.好發於20～30歲
- C.病因是中樞神經系統去髓鞘化（demyelination）而造成

D.可能會造成眼球震顫

52.下列何者為肌萎縮性側索硬化症個案較不易喪失的功能？①肌力②眼球功能③大小便控制④吞嚥⑤感覺功能

A.②③⑤

B.②④⑤

C.①②③

D.③④⑤

53.下列何者不是帕金森氏症（Parkinson's disease）的主要症狀之一？

A.僵硬（rigidity）

B.共濟不能（ataxia）

C.動作緩慢（bradykinesia）

D.快速小碎步（festinating gait）

54.傳統感覺動作途徑（traditional sensorimotor approach）中，意動（conation）的意義為何？

A.個案產生動作時的個人目標行為與意念因素

B.個案產生動作時的時間因素

C.個案產生動作時的肌肉張力狀況

D.個案產生動作時的環境因素

55.下列有關脊髓損傷後出現痙攣的敘述，何者錯誤？

A.痙攣的產生是因大腦過度抑制（inhibition）所造成

B.發燒或膀胱感染常是痙攣突然增強的原因

C.傷後一年左右，痙攣強度可能達高原期（plateau）

D.適度的痙攣可以維持病患的肌肉張力與血液循環

56.當副本材料被伸展時出現阻力，傾向回復原狀，此種特性稱為：

A.記憶性（memory）

B.彈性（elasticity）

C.鍵結性（bonding）

D.收邊性（self-finishing edges）

57.一位腦傷病患合併有水腦及嚴重肌肉痙攣，並需藉呼吸器協助呼吸，下列躺床擺位的建議何者適切？①保持

膝關節微彎，可抑制過度伸展張力 ②平躺時儘量墊高頭部，與床面呈45度，以免引發吸入性肺炎 ③肘關

節保持伸直 ④肩關節稍微外展及外轉

A.①②③④

B.僅①②③

C.僅①③④

D.僅②④

58.因應腦傷病人常見的併發症與臨床處置，下列安全禁忌何者錯誤？

A.有腦脊液滲漏的病人不可出力擤鼻涕

B.顱內壓升高的病人不可俯臥

C.有癲癇症狀的病人頭不可被動轉向單側

D.插鼻胃管的病人頭不可低於胃的高度

59.一名腦傷病人明顯缺乏病識感，並且做事衝動無法考慮行為的後果，此病患可能受傷的部位是：

A.前額葉

- B.頂葉
- C.顳葉
- D.枕葉

60.關於腦傷病人常見的複視（**diplopia**）之介入，下列何者錯誤？

- A.以眼罩遮蔽單眼視線為暫時的代償策略
- B.合併外斜視（**exotropia**）者可用稜鏡（**prism glasses**）矯正
- C.視力運動（**vision exercise**）如視覺注意力、追視、跳視能力的訓練，可以改善部分複視問題
- D.急性期個案不適合以眼鏡矯正

61.若發現慢性阻塞性肺炎之患者呼吸困難且氧氣不足時，治療師應以何種擺位增加其氧飽和度？

- A.仰躺
- B.坐姿
- C.站立
- D.俯臥

62.根據職能治療任務導向治療方式（**OT task-oriented approach**）的理念設計治療活動時，下列敘述何者錯誤？

- A.個案在投擲籃球的活動中，主動產生心像的預備活動有助於活動的表現
- B.實際踢球的訓練活動，會較單純只做擺動患側下肢的訓練活動，其訓練效果較佳
- C.相較於只拿取桌上水杯的活動，個案在拿取水杯後並喝水的活動有助於活動表現
- D.由治療師依據理論設計的活動，會比與個案討論後決定的活動，更有助於個案的表現

63.下列有關治療師對於癌症病人易出現疲累症狀，其治療原則何者正確？①多參與靜態娛樂活動，如玩牌以轉移注意力 ②為了節省體力，要休息不可做任何型態的運動 ③避免攝取咖啡因食物，保持穩定的睡眠。

- A.僅①②
- B.僅②③
- C.僅①③
- D.①②③

64.髖關節骨折手術後的病患沐浴時，提供何種輔具最為方便適用？

- A.加長式浴巾
- B.長柄海綿刷
- C.固定於牆上的沐浴巾
- D.噴液式沐浴乳

65.根據Carr及Shepherd的動作控制治療途徑之主張，中風個案患肢肌無力及靈活度不佳等現象，屬於下列何者？

- A.positive features
- B.negative features
- C.degrees of freedom
- D.control parameters

66.教導個案使用記事簿的習慣以減少記憶力下降之影響，此種介入方式屬於下列何種參考架構之主張？

- A.認知知覺
- B.生物力學
- C.神經發展

D.復健

- 67.根據職能功能模式（Occupational Functioning Model, Trombly, 1993）之假說，下列四項能力由上而下（top-down）的排列順序為下列何者？①activities and habits ②abilities and skills ③first-level capacities ④competence in tasks of life roles
- A.④①②③
B.③②①④
C.②③①④
D.④③①②
- 68.某治療師欲利用反向連鎖（backward chaining）協助個案達成活動目標，下列個案及活動之組合，何者最適切？
- A.腦傷個案，穿褲
B.脊髓損傷個案，穿衣
C.截肢個案，穿脫義肢
D.下背痛，抬舉活動
- 69.有關中風感覺功能評估的原則，下列何者錯誤？
- A.病人眼睛睜開的情形下給指導語，並用未受損處作示範
B.刺激給予的方向由近端到遠端，隨機在不同的部位給予
C.若病人無法口語回答刺激的位置，則停止施測
D.利用disk-discriminator評估病人的two-point discrimination
- 70.有關肌萎縮性側索硬化症（ALS）和多發性硬化症（MS）的比較，下列何者正確？
- A.兩者皆是運動神經元病變引起
B.前者無復發、緩解期，後者有
C.兩者皆好發於女性
D.兩者都是晚發性的疾病，平均都在50歲以後
- 71.下列關於帕金森氏症（Parkinson's disease）的治療，何者較不適切？
- A.利用本體神經肌肉誘發的手法（Proprioceptive Neuromuscular Facilitation, PNF），改善個案動作起始問題（initiation）及品質
B.利用阻力提升個案的穩定度，強化軀幹及近端肢體的動作控制
C.利用鏡子提供回饋，改善個案的面部表情，以提升社會互動功能
D.利用輔具及環境改造，代償因症狀造成的功能受限
- 72.脊髓損傷個案的伸腕肌群力量最少要到什麼程度，才比較適合使用短對掌副木（short opponens splint）做手部動作？
- A.P-
B.P
C.P+
D.F+
- 73.有一60歲心臟疾病之出院患者，職能治療師在設計活動時應符合其年齡所能忍受50~85%之最大心跳率（Maximum Age-Adjusted Heart Rate），試問此患者活動時其心跳率應控制在何間距？
- A.50~80 bpm
B.75~95 bpm

C.80~135 bpm

D.135~185 bpm

74.發現肘關節骨折的病患在前臂出現蒼白或泛青的顏色，摸不到橈動脈脈搏，感覺功能也漸漸遲鈍，可能是出現下列何症？

A.柯德曼氏缺血症（Codman's ischemia）

B.安德生氏缺血症（Anderson's ischemia）

C.巴賓斯基缺血症（Barbinski ischemia）

D.佛克曼氏缺血症（Volkmann's ischemia）

75.下列關於前臂骨折（forearm fracture）之敘述，何者正確？

A.前臂骨折並不像上臂骨折會傷及神經而影響感覺狀態，故治療應首重增進關節活動度及肌力訓練

B.如果骨折傷及遠端橈尺關節，則需以石膏或副木限制患者的前臂旋前及旋後動作

C.Colles' fracture發生的原因多為跌倒時手肘伸直及手腕屈曲去撐地所致

D.近端前臂骨折是最常見的上肢肢段骨折發生處，又以Smith's fracture最為常見

76.下列有關因老化而伴隨的視聽覺障礙與問題的敘述，何者錯誤？

A.presbyopia是指看近距離物體的時候，因聚焦困難而看不清楚

B.presbycusis是指年老而致高頻聽力敏銳度逐漸衰降

C.macular degeneration是指眼球黃斑部退化

D.glaucoma是指耳蝸退化失去平衡感

77.義肢裝具含有外鎖肘固定配件（externally locking elbow）適用下列那一種截肢？

A.肩離斷截肢（shoulder disarticulation）

B.短肘上截肢（short above elbow）

C.長肘上截肢（long above elbow）

D.肘離斷截肢（elbow disarticulation）

78.燒傷個案接受補皮後，有關職能治療師的處置，下列敘述何者錯誤？

A.附近部位先暫停運動5至10天

B.防止黏連，術後儘量每天做被動運動

C.可開始做運動時，宜先從輕微的主動關節活動做起

D.供皮部位在3天後就可以做主動運動

79.脊髓損傷個案除了無任何「薦髓機能」現象，動作部分：肘伸肌肌力為4分，大拇指屈肌肌力為2分，指屈與伸肌肌力為2分；感覺部分：C7皮節（dermatome）感覺是正常，但C8(含)以下感覺則完全喪失。病患最可能為那個神經機能部位與ASIA（American Spinal Injury Association）分類？

A.C7 ASIA A

B.C7 ASIA B

C.C8 ASIA A

D.C8 ASIA B

80.承上題，部分保留區域（zone of partial preservation）部位為：

A.C8

B.C7

C.C6

D.C5