

114年第二次專技高考醫師中醫師第一階段考試、牙醫師藥師考試分
階段考試、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師考試、114年專技
高考職能治療師、呼吸治療師、獸醫師、助產師考試

代 號：2317

類科名稱：中醫師(一)

科目名稱：中醫基礎醫學(二)(包括中醫方劑學、中醫藥物學)

考試時間：1小時30分鐘

座號：_____

※注意：本試題禁止使用電子計算器

※本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當答案。

1.關於《溫病條辨》銀翹散與《溫病條辨》桑菊飲之比較，下列何者錯誤？

- A.兩方藥物組成均含有：連翹、甘草、桔梗、薄荷、蘆根
- B.兩方均為辛涼解表劑。其中銀翹散屬於辛涼平劑；桑菊飲屬於辛涼輕劑
- C.銀翹散用於風溫襲肺，肅肺止咳力較強；桑菊飲用於溫病初起，清熱利咽之力較強
- D.銀翹散中的豆豉有開表透邪之功；桑菊飲中的菊花有清上焦風熱之功

2.關於《小兒藥證直訣》敗毒散之敘述，下列何者錯誤？

- A.羌活為本方的組成藥物之一
- B.此方有發散風寒，疏導經絡，行氣和血之功
- C.此方能治風寒濕鬱於肌腠，發為瘡瘍，初起膿未成，外見寒熱無汗者
- D.方加荊芥、防風即與《攝生眾妙方》荊防敗毒散之組成相同

3.75歲男性，主訴大便乾硬一週，兼見小便清長，頭目眩暈，腰膝痠軟。脈沉，舌淡苔白，下列處方何者最適宜？

- A.熟地黃八錢，山藥三錢，山茱萸三錢，澤瀉三錢，牡丹皮三錢，茯苓三錢
- B.麻子仁五錢，白芍二錢半，枳實二錢半，大黃五錢，厚朴二錢半，杏仁二錢半
- C.當歸三錢，牛膝二錢，肉蓯蓉三錢，澤瀉一錢半，升麻五分，枳殼一錢
- D.玄參一兩，麥門冬八錢，生地八錢，大黃三錢，芒硝一錢五分

4.關於《傷寒論》十棗湯之敘述，下列何者錯誤？

- A.可用於治療懸飲
- B.煎煮時，先煮甘遂、大戟、芫花，後加十枚大棗同煮
- C.服藥後出現瀉下，飲稀粥以養胃氣
- D.本方去芫花、大棗加白芥子即與《三因方》控涎丹組成相同

5.下列方劑中，何者不含有玄參？

- A.《先醒齋醫學廣筆記》竹葉柳蒡湯
- B.《傷寒六書》黃龍湯

- C.《溫病條辨》增液承氣湯
- D.《重樓玉鑰》養陰清肺湯
- 6.有關《傷寒論》的方劑組成，下列敘述何者最不適宜？
- A.麻黃湯組成為：麻黃、桂枝、杏仁、炙甘草
- B.麻黃附子細辛湯組成為：麻黃、炮附子、細辛、炙甘草
- C.葛根黃芩黃連湯組成為：葛根、黃芩、黃連、炙甘草
- D.大承氣湯組成為：大黃、芒硝、枳實、厚朴
- 7.《傷寒論》理中丸、《小兒藥證直訣》異功散、《景岳全書》舉元煎，三者共有之藥物有幾個？
- A.1
- B.2
- C.3
- D.4
- 8.關於《脾胃論》補中益氣湯之敘述，下列何者最適宜？
- A.組方主要特點是補氣與升提配用
- B.柴胡、升麻升舉清陽為臣藥
- C.與《濟生方》歸脾湯共有之藥物有四項
- D.組成中含《和劑局方》四君子湯可健脾益氣
- 9.30歲男性，患胃酸逆流已1年，偶有胸悶，無胃痛，壓力大時胃酸加重；又有乾眼症，時輕時重，常口乾舌燥。診其舌脈：舌稍紅少津，苔偏少，脈細。上述病證，治以下列何方最適宜？
- A.《內科摘要》加味逍遙散
- B.《丹溪心法》左金丸
- C.《傷寒論》半夏瀉心湯
- D.《柳州醫話》一貫煎
- 10.下列何者屬於《景岳全書》左歸丸與右歸丸共有的藥物？
- A.杜仲、枸杞
- B.龜板膠、鹿角膠
- C.熟地、菟絲子
- D.當歸、山茱萸
- 11.用於治療虛勞肺痿，乾咳無痰，形瘦氣短，脈虛數之證，下列方劑何者最適宜？
- A.《傷寒論》炙甘草湯
- B.《重樓玉鑰》養陰清肺湯

C.《醫級》麥味地黃丸

D.《小兒藥證直訣》瀉白散

12.關於《傷寒論》白虎湯，下列敘述正確的有幾項？①加蒼朮可治濕熱痹證 ②為治療溫病氣分熱之代表方 ③組成包含石膏、知母 ④脈浮細者，宜加玄參、生地

A.1

B.2

C.3

D.4

13.關於《太平惠民和劑局方》涼膈散，下列敘述正確的有幾項？①方中用量最大的藥物是梔子 ②功用為瀉火通便，清上泄下 ③方中黃芩、薄荷、竹葉可清徹上中之火 ④立方有「以瀉代清」之意

A.1

B.2

C.3

D.4

14.下列關於方劑的組方敘述中，何者錯誤？

A.《脾胃論》補脾胃瀉陰火升陽湯中用柴胡、升麻、羌活以升清。用黃芩、黃連、石膏以瀉火

B.《小兒藥證直訣》瀉黃散中用藿香助防風，以升散脾胃伏火

C.《和劑局方》甘露飲中用桔梗，合茵陳以辛開苦降

D.《蘭室秘藏》清胃散中用升麻，與黃連相伍，以散火解毒

15.《明醫雜著》理中化痰丸，其組成乃是人參、白朮、乾薑、炙甘草，加上下列那一組藥物？

A.陳皮、半夏

B.茯苓、半夏

C.桔梗、貝母

D.貝母、半夏

16.關於《正體類要》參附湯的敘述，下列何者最不適宜？

A.主治陽氣暴脫，手足逆冷，頭暈氣短，汗出脈微

B.亦可用於產後或月經暴行崩注

C.陽氣脫陷者，用藥劑量可斟酌加倍

D.服用本方，俟陽氣來復，病情穩定後，即可再加量服用，以鞏固療效

17.病人若見痰濕中阻，胸膈悶脹，嘔吐酸苦；偶嘔黃涎而黏，呃逆，少陽內熱之證。治療選方以下列何者最適宜？

- A.《傷寒論》半夏瀉心湯
- B.《和劑局方》逍遙散
- C.《重訂通俗傷寒論》蒿芩清膽湯
- D.《傷寒論》四逆散

18.42歲蔡小姐，某次應酬大吃大喝後，便秘腹痛。自己服用軟便劑後，卻變成胃部悶脹，乾嘔，頻頻打嗝，腸鳴，肚子裏有水聲，拉肚子。治療採以下列何方最適宜？

- A.《傷寒論》半夏瀉心湯
- B.《傷寒論》生薑瀉心湯
- C.《金匱要略》瀉心湯
- D.《傷寒論》小陷胸湯

19.32歲邱小姐，罹患沙門氏桿菌痢疾，嚴重下痢每日十餘行，瀉下赤白膿血，裏急後重，肛門灼熱，雖投以抗生素治療，仍反覆發熱攝氏37.5度。此時會診中醫，依辨證論治原理，下列那一組藥物最不适合加入處方中？

- A.當歸、芍藥
- B.木香、檳榔
- C.黃連、黃柏
- D.石榴皮、五味子

20.關於《攝生總要》天王補心丹之方解，下列何者最適宜？

- A.柏子仁、益智仁以寧心益智安神
- B.當歸、熟地黃以補血潤燥
- C.桔梗載藥上行，入心經
- D.丹參清心活血，與玄參配，使諸藥滋而不膩

21.關於《醫學發明》天臺烏藥散之敘述，下列何者錯誤？

- A.製法中先將巴豆微打破，同川楝子用麩炒黑，合餘藥共研為末
- B.可散寒止痛，行氣疏肝
- C.次藥（臣藥）共有小茴香、高良薑、青皮、木香
- D.方中含川楝子，苦寒行氣止痛

22.《內外傷辨惑論》厚朴溫中湯與《金匱要略》半夏厚朴湯之比較，下列敘述何者正確？

- A.二者皆治痰氣鬱結、胃氣上逆
- B.二者皆含厚朴、茯苓、半夏
- C.厚朴溫中湯含有草豆蔻仁、木香

D.半夏厚朴湯含有炙甘草、紫蘇葉

23.關於《金匱要略》黃土湯之敘述，下列何者最不適宜？

A.治脾陽不足，中焦虛寒

B.伏龍肝為主藥

C.白朮、附子、乾薑，溫陽健脾

D.組成有地黃、阿膠、黃芩

24.《金匱要略》溫經湯之敘述，下列何者最不適宜？

A.當歸、川芎、白芍、牡丹皮：共奏活血祛瘀

B.吳茱萸：溫散寒邪，故能散寒止痛；桂枝：溫經散寒，通行血脈

C.生薑、艾草為方中使藥

D.祛瘀養血，溫經散寒

25.下列何者為《醫學發明》復元活血湯方中之組成？

A.乳香、沒藥、枳實根

B.桃仁、紅花、牡丹皮

C.乳香、沒藥、牡丹皮

D.桃仁、紅花、枳實根

26.《丹溪心法》小蓳飲子之敘述，下列何者最不適宜？

A.小蓳、藕節：涼血止血

B.蒲黃、生地、牡丹皮：養血涼血

C.滑石、淡竹葉、木通：清熱利濕

D.當歸：養血和血

27.有關《局方》川芎茶調散之敘述，下列何者最不適宜？

A.此為外感風邪頭痛

B.組成為川芎、荊芥、防風、柴胡、細辛、白芷、羌活、薄荷、甘草、清茶

C.川芎治少陽、厥陰頭痛，白芷治陽明頭痛，羌活治太陽頭痛

D.風寒偏勝，可加祛寒藥，例如生薑

28.關於《雜病證治新義》天麻鉤藤飲，下列何者最不適宜？

A.其中天麻、鉤藤為主要藥物

B.牛膝引血下行

C.益母草安神定志

D.梔子、黃芩清熱瀉火

29.關於平息內風方劑，下列敘述何者錯誤？

- A.天麻鉤藤飲，用於肝陽上亢、肝風上擾證
- B.相較於天麻鉤藤飲，羚角鉤藤湯用於熱象較重，且傷陰、動風較重的病況
- C.相較於天麻鉤藤飲，鎮肝息風湯適用於陽亢較重之情況
- D.大定風珠適用於陽亢更重的情況，以阿膠、雞子黃為主要藥物達到息風效果

30.關於《溫病條辨》桑杏湯的敘述，下列何者最為正確？

- A.其組成為桑葉、杏仁、沙參、象貝、香豉、梔子皮、梨皮
- B.本方用於治療溫燥傷肺，邪在氣分
- C.本方中的香豉味厚，需久煎方能取效
- D.本方加薄荷、連翹即為《溫病條辨》翹荷湯

31.下列方劑中何者不含有白朮？

- A.《傷寒論》豬苓湯
- B.《傷寒論》五苓散
- C.《重訂嚴氏濟生方》實脾散
- D.《傷寒論》真武湯

32.73歲男性，冬日感寒，出現發熱惡寒，肌肉痠痛等症狀。經治療後，發熱惡寒及肌肉痠痛已無，但出現全身水腫，四肢有沉重疼痛感，且見喘促心悸等症，並伴有輕微便溏。統計其一日之小便量，大約500毫升。納可，眠稍差，無腹痛腹脹。候其脈沉遲無力，舌淡胖有齒痕，苔薄白。下列何者最適宜？

- A.《傷寒論》苓桂朮甘湯
- B.《華氏中藏經》五皮散
- C.《朱氏類編集驗醫方》雞鳴散
- D.《傷寒論》真武湯

33.下列那味藥不屬於《內外傷辨惑論》羌活勝濕湯的組成之一？

- A.獨活
- B.藁本
- C.防風
- D.蒼朮

34.關於《備急千金要方》溫膽湯，下列敘述何者最不適宜？

- A.適應證為膽胃不和，痰熱內擾
- B.組成為半夏、陳皮、茯苓、甘草、枳實、膽南星、生薑

- C.虛煩不眠，驚悸不寧，舌苔白膩微黃，脈弦滑者適用
- D.心神不安者，可加酸棗仁、遠志
- 35.關於《醫學心悟》半夏白朮天麻湯之敘述，下列何者最不適宜？
- A.適應證為脾濕生痰，痰阻清陽，肝風內動，風痰上擾清空
- B.半夏：燥濕化痰，降逆止嘔；天麻：平肝息風
- C.蒼朮燥濕與白朮健脾化痰
- D.陰虛陽亢者，禁用
- 36.關於《醫學心悟》止嗽散組成與加減，下列敘述何者正確？
- A.乾咳無痰者，可加半夏、貝母、知母以潤其燥
- B.紫菀、百部為主要藥物，兩藥均入肺經，性溫不熱，潤而不寒，可以止咳化痰，新久咳嗽均適用
- C.外寒初起，頭痛鼻塞較重，可加茯苓、桑白皮
- D.痰涎黏稠者，可加生薑、半夏、紫蘇葉以解表散邪
- 37.45歲男性，有脂肪肝病史，主訴脘腹悶脹，噯氣、泛酸頻繁，食後加重，食慾不佳，大便易泄瀉，舌苔厚膩，脈滑，治以下列何組成最適宜？
- A.半夏、陳皮、茯苓、甘草、枳實、南星、生薑
- B.大黃、枳實、厚朴、芒硝
- C.山楂、半夏、陳皮、茯苓、連翹、萊服子、神麴
- D.人參、白朮、茯苓、蓮子肉、炙甘草、山藥、薏仁、砂仁、桔梗、白扁豆
- 38.23歲女性患者，臉部痤瘡遍佈，壯熱無汗，頭目昏眩，目赤睛痛，口苦口乾，咽喉不利，胸膈痞滿，大便閉結，舌苔黃膩，脈數有力。下列何組成最適宜？
- A.桔梗、甘草、梔子、黃芩、連翹、薄荷
- B.防風、荊芥、麻黃、薄荷、滑石、山梔、大黃、芒硝、川芎、當歸、白芍、石膏、黃芩、桔梗、甘草、連翹
- C.大黃、枳實、芒硝、厚朴
- D.柴胡、半夏、黃芩、生薑、大棗、芍藥、枳實、大黃
- 39.35歲患者，月經不調，形體較肥胖，身熱無汗，頭痛，身疼，項背疼痛，胸滿，納差，嘔吐，腹痛，心腹疼痛，舌淡苔厚膩，脈緩。下列何方最適宜？
- A.《傷寒論》葛根湯
- B.《傷寒論》四逆湯
- C.《和劑局方》五積散
- D.《傷寒論》大承氣湯

40. 45歲男性患者，主訴右下腹疼痛，低燒反覆，略有寒戰感，按之加重而不喜按，局部腫痞，舌苔薄膩而黃，脈滑。下列何組成最適宜？
- A. 半夏、黃連、枳實
 - B. 大黃、桃仁、牡丹皮、冬瓜子、芒硝
 - C. 大黃、芒硝、甘遂
 - D. 黃芩、黃連、連翹、板藍根、馬勃、薄荷、升麻、玄參、陳皮、牛蒡子、甘草、桔梗、僵蠶、柴胡
41. 溫中降逆之要藥，又能溫腎助陽，用於胃腹冷痛、消化不良，且外用煎液能治頭癬、體癬，下列何藥最適宜？
- A. 木香
 - B. 樟腦
 - C. 吳茱萸
 - D. 丁香
42. 能和解退熱，具有升發之性，可用於脫肛及短氣、倦乏等證，下列何藥最適宜？
- A. 木賊
 - B. 枳實
 - C. 柴胡
 - D. 黃芩
43. 能用於風濕痹痛、四肢拘攣，利水消腫，有祛風通絡、利關節作用，亦能用於皮膚濕疹搔癢，下列何藥最適宜？
- A. 徐長卿
 - B. 桑枝
 - C. 威靈仙
 - D. 秦艽
44. 功效「溫中散寒、下氣止痛」，亦能用於散陽明之浮熱，治頭痛，牙痛，鼻淵，下列何藥最適宜？
- A. 柿蒂
 - B. 木香
 - C. 萸茱
 - D. 薤白
45. 具有散寒止痛，疏肝下氣，燥濕的功效，下列何藥最適宜？
- A. 白芷
 - B. 延胡索

C.艾葉

D.吳茱萸

46.下列何組藥物歸屬於辛溫解表藥？

A.防風、荊芥、蔓荊子

B.牛蒡子、藁本、辛夷

C.紫蘇、香薷、白芷

D.白芷、桂枝、葛根

47.下列何藥具有化濕，行氣，溫中，止嘔的功效，並可用於濕溫初起，邪在三焦氣分，身熱不暢，頭痛、身重等證？

A.川楝子

B.甘松香

C.白豆蔻

D.厚朴

48.有關茯苓的功效，下列敘述何者最不適宜？

A.利水滲濕

B.和胃益脾

C.止癢

D.生津止渴

49.下列何者為澤瀉的禁忌症？

A.水腫脹滿，小便不利

B.痰飲上蒙清陽之眩暈

C.腎虛精滑者

D.下焦濕熱諸證

50.下列何藥辛溫，歸脾、胃、肺經，為理氣要藥，能引胃氣上升，進飲食？

A.九香蟲

B.八月札

C.刀豆

D.檀香

51.下列何者具有行氣、理氣止痛的功效；但於脾胃虛寒，最不適宜？

A.五靈脂

B.檀香

C. 香附

D. 川楝子

52. 關於木香的功效應用敘述，下列何者最不適宜？

A. 脾胃氣滯，脘腹痞滿脹痛，噁心嘔吐，食慾不振

B. 行氣止痛，溫中和胃

C. 溫脾益腎，應用於脘腹冷痛、寒疝

D. 大腸濕熱，氣滯不暢，泄痢腹痛，裏急後重

53. 有關黃芩的功效，下列敘述何者最不適宜？

A. 寧心安神

B. 清熱解毒

C. 除熱安胎

D. 涼血止血

54. 有關黃柏的禁忌症，下列何者錯誤？

A. 骨蒸潮熱

B. 脾胃虛寒

C. 脾虛泄瀉

D. 胃弱食少

55. 能瀉下逐水，與檳榔內服還能驅殺蛔蟲，下列何者最適宜？

A. 商陸

B. 牽牛子

C. 紅芽大戟

D. 芫花

56. 根類藥物，通利大、小便；外用消腫散結，下列何藥最適宜？

A. 紅芽大戟

B. 紫草

C. 商陸

D. 拳參

57. 地骨皮的應用，下列何者最不適宜？

A. 骨蒸潮熱，吐血尿血

B. 中焦虛寒，脾虛便溏

C. 肺虛液少，胸痹疼痛

D.五內邪熱，欬嗽消渴

58.龍膽草益何臟而瀉火？

A.腎、膀胱

B.肝、膽

C.脾、胃

D.心、脾

59.藥皆味苦，氣寒而色黃，具清熱燥濕之功效，下列何者最不適宜？

A.黃芩

B.黃連

C.黃柏

D.黃精

60.棕櫚炭收斂性強，應用於止血、止瀉時，下列何者最不適宜？

A.脾胃虛寒者

B.濕熱下痢初起

C.孕婦

D.陰虛血熱者

61.下列何組藥最適宜治療泌尿道結石？

A.金錢草＋王不留行

B.冬瓜皮＋月季花

C.海金沙＋劉寄奴

D.石韋＋凌霄花

62.下列何藥甘溫，炒製後能用於婦女崩漏經多，並見色紫多塊、少腹刺痛的症狀？

A.紅花

B.益母草

C.虎杖

D.五靈脂

63.下列何者性寒瀉熱，可用於血熱生風，周身搔癢？

A.凌霄花

B.月季花

C.玫瑰花

D.番紅花

64.有關蟪蟲的敘述，下列何者最不適宜？

A.破血逐瘀之力與水蛭相近而性較烈

B.又名地鱉蟲

C.用於經閉、產後瘀阻、癥瘕等證

D.能破血逐瘀，續筋接骨

65.有關巴戟天的敘述，下列那些正確？①苦溫純陽 ②入腎經血分 ③用於陽虛有寒濕之證 ④壯元陽，暖丹田 ⑤強陰益精，散風濕

A.①②③

B.②③⑤

C.①③④

D.②④⑤

66.有關甘草之敘述，下列何者最為適宜？

A.味：甘；性：溫。歸心、肺、脾、腎經

B.補肺和胃益氣

C.潤肺止咳祛痰

D.柔肝緩急止痛

67.杜仲主治，下列何者最不適宜？

A.腰膝痠痛

B.陰下濕癢

C.小便餘瀝

D.腸風血痢

68.有關阿膠之敘述，下列何者最不適宜？

A.味：甘；性：平。歸肺、肝、腎經

B.滋陰潤燥，益胃，補血安胎

C.蒲黃炒者，多用於止血

D.虛寒腹痛泄瀉，慎服

69.有關黃耆之敘述，下列何者最不適宜？

A.味：甘；性：平。歸脾、胃、肺經

B.托毒生肌，利水退腫

C.益衛固表

D.皮黃、肉白、堅實者，良

70.有關當歸之敘述，下列何者最不適宜？

A.味：甘、辛；性：溫

B.補血活血，調經止痛

C.勞傷心脾、肺虛內熱

D.大便溏瀉者，不宜服

71.下列何種藥物具安神定驚、清肝明目、消翳、解毒、收斂生肌？

A.珍珠

B.赤石脂

C.代赭石

D.降香

72.下列何者藥物，性味：甘，平，能平肝息風，治諸風眩暈，頭旋眼黑？

A.防風

B.天麻

C.獨活

D.全蠍

73.關於栝蒌的敘述，下列何者最不適宜？

A.全栝蒌用於肺熱咳嗽，大便秘結

B.栝蒌仁用於化痰瀉熱，為治熱痰燥痰之要藥

C.天花粉為栝蒌的根，切片

D.栝蒌皮善於清熱瀉火，生津止渴，排膿消腫

74.川貝母常配伍下列何藥，具養陰潤肺、化痰止咳，適用於陰虛肺燥有熱之乾咳少痰、咯血或咽乾音啞？

A.沙參

B.魚腥草

C.薏苡仁

D.桔梗

75.治療虛煩不眠的常用藥，但不具平肝潛陽、祛痰開竅等功效，下列何者最為適宜？

A.遠志

B.龍骨

C.茯苓

D.酸棗仁

76.有關瓦楞子之敘述，下列何者最適宜？

A.活血逐瘀，消痞塊

B.內服煎湯，宜久煎

C.制酸止痛，宜生用

D.消痰散結，宜煨用

77.有關馬錢子之敘述，下列何者最不適宜？

A.味：苦；性：寒，有毒

B.通絡散結，消腫定痛

C.外用時，研末吹喉或大面積塗敷，唯孕婦及體虛者需注意

D.服用過量時，可引起肢體麻木

78.常山能引吐行水，祛老痰積飲，專治：

A.諸熱

B.諸瘧

C.諸血

D.諸水

79.有關露蜂房之敘述，下列何者最不適宜？

A.味：甘；性：平，有毒

B.歸胃、肝經

C.用於祛風，攻毒，殺蟲

D.主治氣血虛弱

80.半夏對局部有強烈的刺激性，生食時可使舌、咽和口腔產生麻木、腫痛、流涎、張口困難等。關於半夏的炮製，下列何者是降低半夏有毒成分的關鍵輔料？

A.生石灰

B.甘草

C.白礬

D.薑汁