

112年第二次專技高考醫師中醫師考試第一階段考試、牙醫師藥師考試分階段考試、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師考試、112年專技高考職能治療師、呼吸治療師、獸醫師、助產師、心理師考試
代 號：3310

類科名稱：助產師

科目名稱：各科護理學（包括內外科、兒科、精神科與社區衛生護理學）

考試時間：1小時

座號：_____

※注意：本試題禁止使用電子計算器

※本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當答案。

- 1.病人會自動睜眼；人、地定向感清楚，但時間混淆，能遵照指示做出正確的動作，其Glasgow Coma Scale（GCS）昏迷量表評估結果，下列何者正確？
 - A.E3V4M5
 - B.E3V5M5
 - C.E4V4M6
 - D.E4V5M6
- 2.胃癌病人接受全胃切除手術後之護理措施，下列何者錯誤？
 - A.採高蛋白、高熱量、高維生素飲食
 - B.補充維生素C以防惡性貧血
 - C.以少量多餐，清流飲食開始
 - D.術後早期可採半坐臥式減輕腹壓
- 3.陳先生38歲，主訴最近1個月進食後2~3小時上腹部有疼痛感，半夜經常有上腹燒灼感，常有打嗝現象，下列護理措施何者錯誤？
 - A.建議採高纖飲食
 - B.避免暴飲暴食
 - C.避免茶、咖啡等飲料
 - D.戒菸並避免吸入二手菸
- 4.下列何者是全髖關節手術後病人，維持下肢肌力的等長運動？
 - A.股四頭肌收縮運動
 - B.足背屈曲及伸展
 - C.腿伸直抬高放下
 - D.髖關節旋轉
- 5.王先生，85歲，依美國紐約心臟學會評估為第IV級心衰竭病人，下列護理照護何者正確？
 - A.增加液體攝取量，每日約3,000~5,000 c.c.

- B.增加鈉攝取量，每日約10~15公克
- C.主訴呼吸困難時，可協助採取垂頭仰臥式
- D.評估臥床病人皮膚完整性，給與背部護理
- 6.有關降血壓藥物與藥物指導之敘述，下列何者錯誤？
- A.亨利氏環利尿劑furosemide（Lasix）：補充富含鉀的食物
- B.β型阻斷劑propranolol（Inderal）：監測脈搏，注意有無心悸過緩
- C.血管擴張劑hydralazine（Apresoline）：注意有無類似紅斑性狼瘡症狀
- D.鈣離子阻斷劑amlodipine（Norvasc）：應與葡萄柚汁同時服用以加強效果
- 7.視網膜剝離接受玻璃體切除（vitrectomy）術後初期，病人應採取下列何種臥位？
- A.平躺
- B.半坐臥
- C.側臥
- D.俯臥
- 8.有關癌症病人疼痛的給藥原則，下列何者正確？
- A.病人需要時再給與止痛藥
- B.應最先使用靜脈注射途徑給藥
- C.應最先使用強效型麻醉鎮痛劑
- D.相信病人疼痛主訴，不使用安慰劑
- 9.有關後天免疫缺乏症候群（AIDS）的臨床表徵，下列何者錯誤？
- A.持續發燒
- B.血小板增生
- C.夜間盜汗
- D.口腔黏膜白斑
- 10.下列免疫球蛋白何者能通過胎盤，提供新生兒抗體？
- A.IgA
- B.IgE
- C.IgG
- D.IgM
- 11.下列臨床表徵及檢查結果，何者最不可能出現於因感染A型流感引發急性呼吸窘迫症候群（ARDS）的病人？
- A.給與氧氣治療後， $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$ 為100 mmHg

B.心臟肥大且肺微血管楔壓為26 mmHg

C.胸部X光片顯示雙側肺臟呈現白色

D.呼吸加速且在雙側肺部聽到囉音

12.承上題，下列醫療處置及護理措施之敘述，何者不適宜？

A.可在早期提供糖皮質醇，以改善氧合及降低呼吸道壓力

B.給與高潮氣容積之呼吸器設定，以增加肺臟順應性

C.依醫囑記錄輸入輸出量，以免加重肺水腫程度

D.可採用密閉式抽痰，以減少病人與呼吸管路分開時間

13.有關急性腎衰竭病因之敘述，下列何者錯誤？

A.長期嘔吐可能導致腎前性急性腎衰竭

B.良性前列腺肥大可能導致腎後性急性腎衰竭

C.尿路結石可能導致腎後性急性腎衰竭

D.妊娠毒血症可能導致腎前性急性腎衰竭

14.有關電解質不平衡症狀評估之敘述，下列何者錯誤？

A.低血鈉症會致使肌肉軟弱無力

B.低血鈣症常有口鼻麻刺感

C.低血鉀症常有便秘腹脹現象

D.高血鈣症會致使手足抽搐

15.末期腎病變病人面對選擇血液透析（HD）或持續可攜帶式腹膜透析（CAPD）治療時，下列敘述何者錯誤？

A.CAPD需擔負較多的自我照顧活動

B.HD治療需要較嚴格的飲食控制

C.對心臟血管方面的影響，HD較CAPD為大

D.CAPD治療當中，易有透析不平衡症候群

16.有關甲狀腺機能亢進之護理措施，下列何者正確？

A.平日飲食須限制鈉的攝取，採頭部墊高方式入睡，以減輕眼部水腫

B.向病人解釋服用飽和碘化鉀溶液，不可與牛奶一起服用，以免降低效果

C.甲狀腺切除術後，須密切注意體溫有無下降，以及早發現甲狀腺風暴

D.甲狀腺切除術後，出現肌肉抽搐等高血鈣情形，給與calcium gluconate

17.Regular Insulin（RI）注射多久後會達作用的高峰？

A.1小時內

B.2~4小時

C.5~6小時

D.7~8小時

18.為放置氣管內管的病人進行抽痰時，發現病人心跳有下降的情形，應立即採取的護理措施，下列何者正確？

A.繼續抽痰且觀察

B.立即通知醫師處理

C.停止抽痰且立刻給氧

D.注意抽痰是否超過20秒

19.依據Erikson理論，嬰兒期的社會心理發展任務為何？

A.自主對羞恥與懷疑

B.信任感對不信任感

C.主動進取對罪惡感

D.認同對角色混淆

20.進行母乳哺餵的護理指導時，可強調成熟的母乳中含有那一種免疫抗體優於牛乳成分，故建議哺餵母乳？

A.IgA

B.IgE

C.IgG

D.IgM

21.王小妹，早產兒，出生滿1個月，目前體重2,300公克，醫囑可出院，出院前王小妹應接受那一種預防注射？

A.結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV 13）

B.水痘疫苗（Varicella）

C.五合一疫苗（DTaP-Hib-IPV）

D.B型肝炎疫苗（HBV）

22.護理師執行早產兒口胃管灌食的護理措施，下列何者正確？

A.每次餵食前需抽出胃內殘餘量評估消化情形，且應灌回殘餘量

B.灌食時早產兒姿勢宜採平躺姿勢，以利奶水灌入胃內

C.灌食後早產兒姿勢宜採左側臥，以促進消化及避免奶水反流

D.口胃管灌食方法宜使用大小適合的空針，並緩慢推進奶水

23.有關新生兒呼吸窘迫症候群（respiratory distress syndrome, RDS）的臨床症狀，下列敘述何者正確？

A.呼氣喘鳴聲（expiratory wheezing）

B.呼吸過速（tachypnea）

C.吸氣咕嚕聲（inspiratory grunting）

D.呼吸性鹼中毒（respiratory alkalosis）

24.有關預防新生兒胎便吸入症候群（meconium aspiration syndrome, MAS）的護理措施，下列何者正確？

A.在胎頭露出會陰外時，抽吸鼻咽及口腔不可過度刺激引發呼吸運動

B.嬰兒娩出時，可立即給與氧氣袋（ambu bag）加壓，以避免缺氧

C.抽吸前，在呼吸道注入生理食鹽水，以利於胎便的稀釋及排出

D.嬰兒娩出後，立即給與100%氧氣，以預防呼吸性鹼中毒

25.有關新生兒壞死性腸炎的敘述，下列何者正確？

A.最常見為革蘭氏陽性細菌

B.延遲餵食是引發原因之一

C.糞便中有潛血是臨床表徵之一

D.哺餵配方奶是預防方法之一

26.下列何種情況可能會造成紅血球大量破壞而引起高膽紅素血症？

A.Rh(-)的母親產下Rh(-)的新生兒時

B.新生兒出生後持續採純母乳哺餵

C.O型的母親產下A型或B型的新生兒時

D.新生兒葡萄糖-六-磷酸鹽去氫酶過高時

27.新生兒核黃疸會造成神經病變，下列何者不是其初期症狀？

A.肌肉張力減低

B.嗜睡

C.手指徐動症

D.吸吮力差

28.丁小妹，1歲半，體重11公斤，因持續發燒三天，每天腹瀉多次，體重降至9.5公斤，下列敘述何者正確？

A.屬中度脫水，可採口服補充液治療，並觀察有無代謝性鹼中毒之徵象

B.屬中度脫水，應由靜脈輸液補充水分，並觀察有無代謝性酸中毒之徵象

C.屬重度脫水，應由靜脈輸液補充水分，並觀察有無代謝性酸中毒之徵象

D.屬重度脫水，應由靜脈輸液補充水分，並觀察有無代謝性鹼中毒之徵象

29.新生兒先天性髖脫位之檢查，不包括下列何者？

A.歐式徵象（Ortolani's sign）

B.巴羅氏徵象（Barlow's sign）

C.艾利司徵象（Allis's sign）

D.特倫伯氏徵象（Trendelenburg's sign）

30.有關先天性異常新生兒的健康問題與其臨床表徵的敘述，下列何者正確？

- A.食道閉鎖新生兒因無法吞嚥口水而有大量唾液
- B.肥厚性幽門狹窄新生兒的嘔吐物常含有黃色膽汁
- C.膽道閉鎖新生兒大便的顏色為深黃色
- D.肛門閉鎖新生兒主要症狀為24小時後才解胎便

31.下列何者是唇顎裂新生兒較少出現的健康問題？

- A.餵食困難導致營養不良
- B.口腔無法閉合導致呼吸功能障礙
- C.發音困難導致語言學習障礙
- D.中耳積水導致聽力障礙

32.小智，8個月大，日前因血尿而求醫，醫師發現他的右腹部明顯隆起，詳細檢查後診斷為威爾姆氏腫瘤（Wilm's tumor）第II期，腫瘤已有10×8公分，下列處置何者錯誤？

- A.傾聽父母對孩子疾病診斷的感受
- B.每日固定進行腹部觸診並記錄腹圍
- C.說明腎臟切除為必要之治療方式
- D.協助抗癌藥物化學治療之進行

33.護理師評估腦性麻痺兒童時，以下何者是各類型皆會出現的特徵？

- A.人際關係疏離
- B.智能障礙
- C.動作發展受限
- D.知覺統合異常

34.小君，3歲，協助其吃藥的護理措施，下列何項最合適？

- A.「小君乖乖吃藥喔！一點都不會苦喔！」，以增加自主性
- B.「該吃藥了！有甚麼問題嗎？」，並讓其了解藥物作用
- C.把藥加入小君喜愛的食物中，以治療性遊戲分散其注意力並讓他服下
- D.「要自己服藥或讓阿姨幫你餵藥？」，服藥後給予讚美

35.小恩，1歲，在正常狀況下，下列何者較符合其語言發展的現象？

- A.會學貓咪喵喵叫
- B.會說：「你幫我」
- C.會說出自己的名字

D.會數數到十

36.陳太太為38週的初產婦，患有妊娠高血壓，近日因為血壓控制不穩入院觀察後，擬定明日進行剖腹產，她提到對此項手術的擔心與害怕，此時護理師最合宜的回應為何？

A.「走，我們先去聽個音樂，轉移一下注意力」

B.「我覺得為了明天的體力，你現在應該要多休息」

C.「別擔心，你已經在這裡我們會照顧你」

D.「針對你的狀況，你能再多說些擔心的事嗎？」

37.一位懷孕六週的王小姐表示：「睡醒後仍然感到想睡，而且感覺一直在做夢，目前工作狀況尚穩定，但是男友最近表示不想要有這個小孩。」護理師首先應評估王小姐的睡眠問題與下列何種因素有關？

A.意識

B.語言

C.行為

D.情緒

38.有關佛洛伊德（Sigmund Freud）之人格結構之敘述，下列何者最適切？

A.自我是問題解決者和現實測試者

B.嬰兒之人格結構已完成本我、自我及超我的發展

C.自我為人類本能的行為表現，如性驅力或攻擊等

D.超我是構遵循享樂及需求原則

39.蔡小姐罹患產後憂鬱症剛住院，表示：「我的存在造成了家人的困擾、沒有好好照顧我的寶寶」、「有什麼方法可以解脫」、「吃安眠藥會死嗎？」。此時優先的護理措施何者最適當？

A.陪伴病人散步，避談難過的心情

B.瞭解病人出現自殺意念的頻率及強度

C.與病人進行深入的治療性會談

D.給病人獨處時間，並請她想想她的寶寶

40.有關選擇性血清素回收抑制劑（selective serotonin reuptake inhibitor, SSRI），下列敘述何者正確？

A.不適合用於治療重鬱症病人

B.其副作用產生與療程有關，與劑量無關

C.屬多巴胺（dopamine）的神經介質

D.服用一段時間後，突然停藥可能會產生頭暈等停斷症狀（discontinuation symptoms）

41.吳女士，38歲，下列何者為其可以使用的全民健保預防保健篩檢項目？

A.子宮頸抹片檢查

B.乳房攝影檢查

C.定量免疫法糞便潛血反應

D.口腔黏膜檢查

42.夢想村2011年各年齡層年中人口數為0~14歲1,000人，15~64歲 3,500人，65歲以上500人。請問該村的依賴人口指數約為：

A.10

B.20

C.28.6

D.42.9

43.有關卡介苗疫苗的敘述，下列何者正確？

A.注射方式為肌肉注射

B.發燒或體重低於2,500公克之嬰兒不宜注射

C.接種時間為出生二十四小時內

D.屬於非活性疫苗

44.發生率（incidence rate）可用來作為：

A.鼓勵生育的依據

B.預測疾病的治癒率

C.了解疾病的之致死能力

D.探討致病因子

45.有關「出生率降低及人口減少」之人口年齡結構圖，下列何者正確？

A.「葫蘆形」

B.「金字塔形」

C.「壺型」

D.「星型」

46.依據「第二期國家癌症防治計畫-癌症篩檢（99~102年）」，各縣市衛生局所全力推動下列那四種癌症的篩檢？

A.口腔癌、子宮頸癌、結直腸癌、肝癌

B.口腔癌、乳癌、結直腸癌、子宮頸癌

C.口腔癌、乳癌、前列腺癌、肺癌

D.口腔癌、結直腸癌、肺癌、肝癌

47.國小護理師對於轉出學生的健康檢查及疾病檢查結果資料之處理，下列何者較恰當？

- A.併隨學籍轉移
- B.立即銷毀
- C.保留三年後銷毀
- D.交由衛生所保管

48.有關社區評估的方法和技巧，下列敘述何者錯誤？

- A.社區的客觀資料收集遠比主觀資料有價值
- B.參與社區活動收集資料為參與式的觀察法
- C.社會指標資料可從地方機關或圖書館收集
- D.訪談社區重要人物可了解不同角度的看法

49.某社區因有愛滋病病友居住，因此社區將愛滋病防治訂為最優先需要處理的建康問題，此乃依據下列何項原則訂定？

- A.健康政策與目標
- B.預防問題的效果
- C.社區解決問題的動機
- D.解決問題可利用的資源

50.嬰兒添加副食品的原則為何？①由少量開始，慢慢加到適量 ②應同時添加多種新的食物以均衡營養 ③發現食物引起的過敏反應時，應立即停食 ④出生後3個月可以開始添加 ⑤需觀察嬰幼兒大便情形 ⑥可立刻斷奶

- A.①②③
- B.④⑤⑥
- C.①③⑤
- D.②④⑥