

103年第二次專門職業及技術人員高等考試醫師中醫師考試
分階段考試、中醫師、營養師、心理師、護理師、社會
工作師考試、103年專門職業及技術人員高等考試法醫師、
語言治療師、聽力師、牙體技術師考試試題

等 別：高等考試

類 科：臨床心理師

科 目：臨床心理學總論（一）（包括偏差行為的定義與描述、偏差行為的成因）

考試時間：2 小時

座號：_____

※注意：禁止使用電子計算器。

甲、申論題部分：（50 分）

(一)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在申論試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

(二)請以黑色鋼筆或原子筆在申論試卷上作答。

一、學者研究發現心理病態（psychopathy）者缺乏焦慮感、無法從錯誤回饋學習抑制反社會行為，請你列舉兩項支持此觀點的實證研究，並說明這些研究在臨床上的意義。

（15 分）

二、流行病學資料顯示罹患重鬱症（major depressive disorder, MDD）比例女性是男性兩倍（如 Kessler 等人, 2005），請問學者們研究發現 MDD 患者性別差異可能與那些因素有關，而臨床心理師在獲得這些性別差異的資料後可以如何應用，請詳細說明之。（15 分）

三、請以心因性暴食症（Bulimia Nervosa）病因為例，說明學者強調整合性派典（paradigm）的重要性及其意義。（20 分）

乙、測驗題部分：（50 分）

代號：2107

(一)本測驗試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)共 40 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題或申論試卷上作答者，不予計分。

- 以統計上的少數或偏離社會常模來定義偏差行為，其優點是？①診斷信度較高 ②有客觀的切截點 ③個案本身有較強的治療動機 ④不考慮文化的影響
(A)①③ (B)②④ (C)①② (D)③④
- 以功能失調來定義偏差行為時，最大的問題為何？
(A)會給病患貼標籤 (B)對於功能的判斷沒有絕對性的標準
(C)過於強調負性的面向 (D)利用維度（dimension）的概念有問題
- 下列關於 prosopagnosia 的描述，何者錯誤？
(A) prosopagnosia 意指個體無法辨識熟悉的人臉
(B) prosopagnosia 意指個體無法辨識所有人臉和其個別特徵
(C) prosopagnosia 時常伴隨 visual object agnosia 出現
(D)許多研究發現 prosopagnosia 與雙側枕葉損傷有關
- 某研究發現，臺灣某個社區內的犯罪人數與其學校數量呈現正相關，下列對於該現象的解釋，何者最為可能？
(A)純屬巧合 (B)學校教育導致犯罪
(C)該社區的警察單位執法較嚴所導致的 (D)存在同時影響犯罪人數和學校數量的因素

- 5 在某一段時間內，所產生的某種疾病新案例（new cases）的比率，稱為：
(A)發生率（incidence） (B)分配性（distribution） (C)流行率（prevalence） (D)風險性（risk）
- 6 下列何種狀況的發生，是多重基準線設計（multiple baseline designs）所希望獲得的結果？
(A)目標行為改變發生在導入預操弄的獨變項之前
(B)目標行為改變發生在導入預操弄的獨變項之後
(C)目標行為改變發生在一開始進行基準線測量時
(D)目標行為改變發生在最後基準線測量結束前
- 7 有關「類擬實驗法」（analogue experiment）之敘述，下列何者正確？
(A)該法具有良好的外部效度（external validity）
(B)該法欠缺內部效度（internal validity）
(C)該法的優點多於縱貫研究法（longitudinal study）
(D)該法也可透過動物實驗來了解人類行為
- 8 為了解不同年齡青少年參與同人誌（Cosplay）的發展差異與發展變化，最好採取下列那種研究設計？
(A)橫斷設計（cross-sectional design） (B)縱貫設計（longitudinal design）
(C)系列設計（sequential design） (D)回溯法（retrospective method）
- 9 若確認某種治療介入確實有其治療效果，顯示此類療效研究具有下列何者特性？
(A)內部效度 (B)外部效度 (C)假藥效果 (D)模擬效果
- 10 根據 S. Freud 的理論，超我（superego）是由什麼發展而來？
(A)本我（id） (B)自我（ego）
(C)防衛機制（defense mechanism） (D)伊底帕斯衝突（Oedipus conflict）
- 11 研究參與者的權益與研究成果何者較重要？
(A)研究參與者的權益比研究成果重要 (B)研究成果比研究參與者的權益重要
(C)兩者同樣重要 (D)看情形，決定於研究成果的貢獻性
- 12 可能會影響實驗內部效度（internal validity）的因素有很多，當實驗結果因實驗情境過於新奇（novel）而影響了參與者的表現時，此現象通常稱為：
(A)痕跡效應（carryover effect） (B)實驗者的預期（experimenter expectancies）
(C)反應性（reactivity） (D)抽樣偏誤（sampling bias）
- 13 有關自我精神分析家（ego analyst）的敘述，下列何者正確？
(A)強調幻想的重要性 (B)重視當下情境因素甚於早期的創傷經驗
(C)運用古典制約方法建立治療策略 (D)使用暴露法作為治療策略之一
- 14 有關非系統式觀察法（unsystematic observation）的敘述，下列何者錯誤？
(A)所觀察到的資料較難提供強而有力的知識基礎
(B)所觀察到的資料可以協助研究人員形成研究假設，並嘗試加以驗證
(C)是以隨意或無事先計畫方式進行觀察
(D)屬於自然情境觀察法（naturalistic observation）中的一種
- 15 陳同學最近親眼目睹一件死亡車禍，當下他感到非常害怕與無助，幾分鐘後他在主觀上感覺麻木、頭昏眼花、無法回想起所看到的車禍細節，回家後雖然腦中不想去想這件事，但是這件事還是常常不自主的瞬間再現，因此陳同學的注意力難以集中，外出時也儘量迴避目睹車禍的地點，這種情形已經持續了兩個月，已經嚴重影響他在學校的學習活動。請問依據精神疾病診斷準則手冊，陳同學目前最可能的診斷為下列何者？
(A)伴隨懼曠症的恐慌性疾患（Panic Disorder with Agoraphobia）
(B)未伴隨懼曠症的恐慌性疾患（Panic Disorder without Agoraphobia）
(C)創傷後壓力疾患（Posttraumatic Stress Disorder）
(D)急性壓力疾患（Acute Stress Disorder）

- 16 肚子餓得嘔哩咕嚕叫，生物線索勾起吸吮母乳或飽啖美食之意象，暫時止住飢餓感。這種現象稱為：
(A)幻想 (fantasy) (B)現實原則 (reality principles)
(C)問題解決 (problem solving) (D)妄想
- 17 供給腦部重要構造-胼胝體 (Corpus callosum) 血流的主要血管是：
(A)前大腦動脈 (Anterior cerebral artery) (B)中大腦動脈 (Middle cerebral artery)
(C)後大腦動脈 (Posterior cerebral artery) (D)後交通動脈 (Posterior communicating artery)
- 18 創傷後壓力症候群 (PTSD) 透過壓力賀爾蒙影響腦部構造，其中受影響最明顯的是：
(A) The amygdala (B) The prefrontal cortex (C) The hippocampus (D) The anterior cingulate
- 19 下列何者與腦中 GABA (γ -丁氨基酪酸) 含量過低關係最密切？
(A)降低焦慮 (B)增加憂鬱 (C)增加焦慮 (D)減少憂鬱
- 20 研究顯示思覺失調症 (原稱精神分裂症) 的前額葉異常與那些表現有關？①抑制能力受損 ②工作記憶受損 ③聽覺過於敏感 ④空間辨認異常
(A)①② (B)②③ (C)①④ (D)②④
- 21 下列那一個腦構造不屬於海馬迴系統 (Hippocampal System) ？
(A)穹窿 (Fornix) (B)蒼白球 (Globus Pallidus)
(C)腦鉤 (Uncus) (D)側海馬迴 (Parahippocampal Gyrus)
- 22 第一位使用「鐵棒傳導動物磁力 (procedure for transmitting animal magnetism, by iron rod)」的方法以治療歇斯底里症病患，並被視為現代催眠治療之先驅的是：
(A) Jean Martin Charcot (B) Josef Breuer (C) Thomas Sydenham (D) Franz Anton Mesmer
- 23 某位臨床心理師運用認知與行為的運作歷程來描述不同的精神疾病，依據 Harvey 等人 (2004) 的論點，下列何者並非使用這種方法的主要優點？
(A)有助於共病現象 (comorbidity) 的解釋 (B)有助於不同精神疾病的理論與治療進展相互移轉
(C)有助於解釋對精神疾病臨床治療的結果 (D)有助於解釋不同精神疾病的正確病因
- 24 依據 A. Harvey 等人之理論，在跨診斷取向的確定歷程 (definite transdiagnostic processes) 中，下列何種推理歷程尚未被證實？
(A)解釋偏誤 (interpretational bias) (B)期待偏誤 (expectancy bias)
(C)歸因 (attributions) (D)情緒推理 (emotional reasoning)
- 25 根據 Harvey 等人 (2004) 對推理功能的心理病理學實徵研究整理，認為慮病疾患的何種推理歷程較少被關注？
(A)共變偏誤 (Covariation bias) (B)詮釋偏誤 (Interpretational bias)
(C)歸因偏誤 (Attribution bias) (D)期望偏誤 (Expectancy bias)
- 26 根據 Harvey 等人 (2004) 對思考功能心理病理學實徵研究的整理，PTSD 患者的何種思考歷程較少被關注？
(A)重複思考 (Recurrent thinking)
(B)思考壓抑的矛盾效果 (Paradoxical effect of thought suppression)
(C)後設認知的信念 (Metacognitive belief)
(D)現實／來源的監控 (Reality/source monitoring)
- 27 「social selectivity」在進行老年人的心理病理研究中，指的是下列何者？
(A)年紀大了，選擇的朋友圈不再是新鮮，而是深交、常在身邊的朋友
(B)年紀大了，選擇的朋友圈還是喜歡新鮮，不是深交的朋友
(C)年紀大了，體力不夠了，選擇的社會活動變小了
(D)年紀大了，體力雖然不夠了，選擇的社會活動仍不至於變小
- 28 特殊恐懼症與社交恐懼症對於患者關注 (concern-related) 刺激均出現較差的記憶能力，根據 Mogg 等人 (1987) 的警覺逃避假說 (vigilance-avoidance hypothesis)，可解釋為：
(A)過度類化記憶的結果 (B)對威脅刺激記憶的提取困難
(C)對威脅刺激感到不舒服的逃避結果 (D)記憶歷程的儲存失敗

- 29 有關「妄想性人格疾患」的敘述，下列何者正確？
(A)對於他人的讚美、批評、意見皆漠不關心
(B)往往會出現怪異的想法
(C)與「妄想型精神分裂症」的不同，在於「妄想性人格疾患」患者並未出現幻覺經驗
(D)與「妄想型精神分裂症」的不同，在於「妄想性人格疾患」患者出現有認知能力的下降
- 30 下列何種類型的人格疾患患者在 30 歲之後，症狀會逐漸改善？
(A)反社會型人格疾患（Antisocial personality disorder）
(B)邊緣型人格疾患（Borderline personality disorder）
(C)自戀型人格疾患（Narcissistic personality disorder）
(D)類分裂型人格疾患（Schizoid personality disorder）
- 31 在 Linehan（2006）的觀點中，下列何者是發展出邊緣性人格疾患的原因？
(A)個體具有情緒調節不良的氣質（emotional dysregulation）
(B)家庭環境無法有效的確認（invalidate）個體的情緒
(C)個體具有情緒調節不良的氣質，再加上家庭環境無法有效的確認個體的情緒
(D)個體具有情緒調節不良的氣質，再加上在童年早期遭受到虐待
- 32 在心理發展階段中，依據 psychosexual stages 約從三至六歲，性器官成為滿足的首要來源之階段為：
(A)口腔期（oral stage）
(B)潛伏期（pregenital stage）
(C)肛門期（anal stage）
(D)性器期（phallic stage）
- 33 空椅法（empty chair）是那一個學派常用的技巧？
(A)認知治療
(B)個人中心治療
(C)行為治療
(D)完形治療
- 34 精神分析師對病人「指出其行為的意涵」，此種技巧為：
(A)自由聯想
(B)投射
(C)詮釋
(D)修通
- 35 下列何者被視為自我分析師（ego analyst）？
(A) Sigmund Freud
(B) Anna Freud
(C) Melanie Klein
(D) Aaron Beck
- 36 依附理論是嬰幼兒發展中重要的心理學概念，有關不安全依附阻抗型之敘述，下列何者正確？
(A)後來可能會發展出品行疾患
(B)後來可能會發展出焦慮疾患
(C)後來可能會發展出心身症
(D)與後來發展特定疾患的關連尚難定論
- 37 鑑別失智症與譫妄症狀，下列何者正確？①失智症是近期記憶退化，譫妄是遠期記憶退化 ②失智症是逐漸退化，譫妄是急速認知改變 ③失智症通常與憂鬱情緒有關，譫妄則無情緒困擾 ④失智症較少伴隨急性醫學狀況，譫妄通常伴隨其他醫學狀況產生
(A)①②
(B)②④
(C)①④
(D)③④
- 38 反應模式誤差（response biases）是許多研究老年人的學者所指出在研究法上的限制。此限制可能影響那些研究結果？
(A)發現選擇死亡率（selective mortality）過高
(B)反映出其社會預期與價值觀系統（social prediction and value systems）的偏差
(C)重複討論代間因素（cohort effects）的重要性
(D)發現老年人的精神疾病（如焦慮、情緒疾患等）之流行率低於中年人
- 39 某研究者發現「在第一與第二孕程感冒的母親，孩子在未來罹患思覺失調症的比例高於一般人群」。此研究結果支持下列何種致病因素？
(A)素質
(B)環境
(C)壓力
(D)心理
- 40 有關素質－壓力模式（diathesis-stress paradigm）之敘述，下列何者正確？
(A)先天遺傳屬於「素質」因素
(B)先天遺傳屬於「壓力」因素
(C)後天教養屬於「壓力」因素
(D)天災、車禍等創傷事件屬於「素質」因素