

103年第二次專門職業及技術人員高等考試醫師中醫師考試  
分階段考試、中醫師、營養師、心理師、護理師、社會  
工作師考試、103年專門職業及技術人員高等考試法醫師、  
語言治療師、聽力師、牙體技術師考試試題

等 別：高等考試

類 科：臨床心理師

科 目：臨床心理學特論（二）（包括心智功能不全疾病之心理衡鑑與心理治療、精神官病之心理衡鑑與心理治療、兒童與青少年發展障礙之心理衡鑑與心理治療）

考試時間：2 小時

座號：\_\_\_\_\_

※注意：禁止使用電子計算器。

甲、申論題部分：（50 分）

- (一)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在申論試卷上，於本試題上作答者，不予計分。  
(二)請以黑色鋼筆或原子筆在申論試卷上作答。

- 一、請問 DSM-IV 的失智症 (dementia) 與 DSM-5 的神經認知疾患 (neurocognitive disorders) 有何差異？DSM-5 列舉出來的認知領域有那些？請就你認為最重要的領域，說明症狀或可觀察的行為表現是甚麼？可使用的評估方式是甚麼？（15 分）
- 二、在疾病分類架構上，請問 DSM-IV 與 DSM-5 對雙極疾患 (bipolar disorder) 有何不同？請說明躁症症狀與鬱症症狀。請從素質壓力模式 (diathesis-stress model) 與認知行為治療 (cognitive-behavioral therapy)，闡述雙極疾患的心理治療。（15 分）
- 三、請試述 ASD (Autism Spectrum Disorder) 的臨床特徵。如果你接到一個心理治療轉介單，轉介理由是社會焦慮症 (social anxiety)，這個 4 歲 7 個月的小男孩，每次父母帶他到不太熟悉的親戚家都會哭鬧不休，需父母抱整天直到回家為止；並且，這個小男孩碰到家裡有小朋友訪客時，都會躲到門後偷看，如果小朋友看他，他就會跑回房間。請問如何進行 ASD 與社會焦慮症的鑑別診斷。如果鑑別診斷的結果是 ASD，並且媽媽可以成為治療同盟者，請問你會如何擬定心理治療計畫。（20 分）

乙、測驗題部分：（50 分）

代號：5107

- (一)本測驗試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。  
(二)共 40 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題或申論試卷上作答者，不予計分。

- 1 您準備對晚期 Alzheimer's Disease 患者與家屬進行心理諮商，下列何者是最合適的方式？
  - (A)給予事先準備的失智症衛教手冊來解釋完整病程
  - (B)進行家庭情緒支持，詢問是否有轉介長照評估之需求
  - (C)進行完整之神經心理衡鑑，以確定其記憶功能狀態
  - (D)處理患者之憂鬱情緒與妄想症狀
- 2 患者 84 歲，衣物整齊，由夫人推著輪椅進入接受衡鑑。患者抱怨不舒服，很累，不太肯回答問題。夫人一直拜託趕快結束測驗，說是家中有事，老人家心中很著急，一直強調請多幫忙等字眼。這時比較好的做法為何？
  - (A)告知這分數會影響藥物之給與，如果不接受施測，就無法領藥
  - (B)請醫師和護理人員進來幫忙，協助說服
  - (C)趕快進行 MMSE，不能回答之處，以零分計
  - (D)告知這是重要的大腦功能檢查，若今天狀況不適合，可以改天再約

- 3 王爺爺於 4 年前被診斷疑有 Alzheimer's Disease，但因獨子在外國定居，所以獨自與外勞住在鄉下老家。過年時，被發現經常半夜在田間走動，而且數日不歸，回家時常常衣物髒髒的或身上帶有傷口。下列何者測驗評估最不適宜？  
(A)老年人憂鬱情緒量表 (B)簡式智能量表 (C)柯氏性格量表 (D)魏氏記憶力測驗
- 4 下列何者不是巴金森氏症常見的症狀？  
(A)肢體靜止時顫抖 (B)動作遲緩 (C)昏眩 (D)記憶提取困難
- 5 有關譫妄患者之敘述，下列何者錯誤？  
(A)起伏不定的性格問題 (B)起伏不定的認知功能問題  
(C)起伏不定的情緒問題 (D)起伏不定的行為問題
- 6 有關譫妄病程的敘述，下列何者正確？  
(A)譫妄的急躁情緒症狀通常在晚上較為緩解  
(B)若能找到譫妄的病因並給予妥善治療，譫妄經常可以很快復原  
(C)年輕人較少發生譫妄，但若發生，通常比較容易有殘留的認知損傷  
(D)藥物所引起的譫妄與較高的死亡率有關
- 7 暫時性全面失憶症 (Transient global amnesia, TGA) 的患者，最常在下列何種神經心理測驗表現異常？  
(A)事件記憶 (B)知覺記憶 (C)語意記憶 (D)程序記憶
- 8 關於失憶性疾患 (Amnesic disorders) 之敘述，下列何者錯誤？  
(A)患者具明顯的記憶損傷但無其他認知功能缺損  
(B)該疾患患者有可能因為心理創傷所造成  
(C)該疾患患者有可能因為一般醫學狀況所造成  
(D)該疾患患者有可能因為物質使用所引起 (Substance-Induced)
- 9 有關失憶性疾患 (Amnesic Disorders) 與解離性失憶 (Dissociative Amnesia) 鑑別診斷的敘述，下列何者正確？  
(A)失憶性疾患較有立即記憶的問題，而解離性失憶沒有這方面的問題  
(B)失憶性疾患較有短期記憶的問題，而解離性失憶沒有這方面的問題  
(C)解離性失憶較有近期記憶的問題，而失憶性疾患沒有這方面的問題  
(D)兩者的記憶問題型態相似，而嚴重度不同
- 10 關於腦震盪後疾患 (Postconcussional disorder) 的敘述，下列何者錯誤？  
(A)診斷時要釐清患者是否有腦傷  
(B)患者的認知功能顯著比受傷前差  
(C)患者的社會職業功能不見得一定受到影響  
(D)若已達失智 (dementia) 之診斷，則不考慮此一診斷
- 11 依照 Petersen 提出對「輕度認知障礙」(Mild Cognitive Impairment, MCI) 的診斷流程，如果臨床上遇到一位患者僅有執行功能缺損的抱怨，但沒有明顯記憶力困擾，且沒有伴隨其他認知功能缺損。這位患者可能屬於那一類型的 MCI？  
(A)單一面向非失憶型 MCI (B)多重面向失憶型 MCI  
(C)單一面向失憶型 MCI (D)多重面向非失憶型 MCI
- 12 有關興奮劑類藥物 (stimulant medication) 的敘述，下列何者正確？  
(A) Paroxetine (Paxil<sup>TM</sup>) 是屬此類藥物  
(B) methylphenidate (Ritalin<sup>TM</sup>) 是屬此類藥物  
(C)雖然可分成不同種類，但皆為長效型藥物  
(D)主要改變多巴胺在大腦枕葉的活動
- 13 Frick et al. (1993) 將品行問題 (conduct problems) 分成兩個向度，分別為：  
(A)外顯—內隱向度 (overt-covert dimension) 和破壞—非破壞向度 (destructive-nondestructive dimension)  
(B)外顯—內隱向度 (overt-covert dimension) 和過度反應—含蓄反應向度 (overactive-underactive dimension)  
(C)衝動—非衝動向度 (impulsive-non-impulsive dimension) 和過度反應—含蓄反應向度 (overactive-underactive dimension)  
(D)衝動—非衝動向度 (impulsive-non-impulsive dimension) 和破壞—非破壞向度 (destructive-nondestructive dimension)
- 14 ADHD 兒童的自我調節能力困難，常與大腦啟動、整合和處理其他區域功能的認知過程有關，此過程為：  
(A)執行功能 (B)訊息登錄功能 (C)適應功能 (D)語音轉錄功能

- 15 ADHD 兒童在一段短時間內可記得和注意到的訊息量，通常與常人無明顯差異。此能力是指下列何者？  
(A)警覺度 (vigilance) (B)持續注意力 (sustained attention)  
(C)選擇性注意力 (selective attention) (D)注意力的容量 (attentional capacity)
- 16 根據 Frick et al. (1993) 在品性問題 (conduct problems) 上的分類，對動物身體殘忍和縱火是屬於下列何種問題？  
(A)衝動性行為問題 (B)過度反應行為問題 (C)外顯性行為問題 (D)破壞性行為問題
- 17 有關尼古丁與 ADHD 的關聯性，下列何者正確？  
(A)父親在母親懷孕時抽菸是主要導致小孩注意力缺陷的問題  
(B)母親懷孕時抽菸是造成小孩過動的危險因子  
(C)尼古丁會減少利他能 (Ritalin) 的副作用  
(D)利他能 (Ritalin) 和尼古丁的組合會導致危險
- 18 關於自閉症兒童會出現重複性刻板行為的可能原因，下列何者錯誤？  
(A)重複拍手或搖晃身體，是一種自我刺激行為  
(B)兒童體內刺激不足，透過重複行為以激發體內的神經系統  
(C)環境中刺激過多，兒童透過投入重複行為以阻斷外界干擾  
(D)環境中的刺激不足，使得兒童持續表現重複刻板行為
- 19 關於胎兒酒精症候群 (fetal alcohol syndrome) 之敘述，下列何者錯誤？  
(A)因母親酗酒而導致胎兒的中樞神經受損 (B)兒童的智力落在輕度智能不足範圍  
(C)容易出現注意力缺陷、過動衝動症狀 (D)不容易從外觀辨識其與一般兒童之差異
- 20 DSM-5 中，下列何者是溝通疾患 (communication disorders) 的診斷？  
(A)接收型語言疾患 (receptive language disorder)  
(B)表達型語言疾患 (expressive language disorder)  
(C)接收與表達混合型疾患 (mixed receptive-expressive disorder)  
(D)口吃 (childhood-onset fluency disorder or stuttering)
- 21 關於學習障礙的缺陷敘述，下列何者錯誤？  
(A)數學障礙的核心缺陷是數學運算與數學推理困難  
(B)閱讀障礙的兒童常見的缺陷與手眼協調能力有關  
(C)書寫障礙的兒童通常也欠缺自我監控、自我修正能力  
(D)書寫障礙通常合併閱讀障礙或數學障礙
- 22 相對於 Reading Disorder，有關非語文學習障礙 (nonverbal learning disabilities) 的敘述，下列何者正確？  
(A)患者的障礙被認為是在左側腦的障礙 (B)患者出現的數學障礙現象多於閱讀障礙現象  
(C)患者的社交技巧缺陷較少見 (D)患者的動作協調與判斷能力尚可
- 23 在 MR 的基因研究中，有關 Fragile X Syndrome 患者的敘述，下列何者正確？  
(A)大多數女性患者會出現社交、溝通行為的異常反應  
(B)約 3/4 的比例可能會被診斷為自閉症  
(C)大多數男性患者與 1/3 女性患者可能會出現自閉症行為  
(D)不論男性或女性，在外觀的異常程度比 Down syndrome 更易辨別

請依下文回答第 24 題至第 26 題

小華是正常發展的男生，最近上學生活中開始出現很多身體上的疼痛，抱怨頭痛、睡不好，又很容易生氣，只要一不高興，事事都想爭辯的樣子。小華最近體重明顯下降，也常不想上課，不想寫作業，自我意象及自我價值感都明顯低落。小華這個樣子，已經超過一個月了，學校老師來家訪過，看到憂心忡忡的家長，建議家長該帶去給醫生看看。

- 24 你認為小華主要是患了何項疾患？  
(A)憂鬱症 (B)焦慮症 (C)拒學症 (D)對立反抗性疾患
- 25 小華若要進行心理衡鑑，以下何項工具最適當？  
(A)威斯康辛卡片分類測驗，班達測驗 (Wisconsin Card Sorting Test, B-G test)  
(B)貝氏憂鬱量表 (BDI)，貝氏焦慮量表 (BAI)  
(C)嵌入圖形測驗，注意力不足過動量表中文版 (Embedded Figure Test, SNAP)  
(D)文蘭適應量表，自閉症診斷會談量表修訂版 (Vineland Adaptive Scale, ADI-R)
- 26 此疾患的患者，男女的比率大概為何？  
(A)女多於男 (B)男多於女 (C)相同 (D)不確定
- 27 兒童及青少年憂鬱症的男女比率，幾歲開始就有明顯差異？  
(A) 6 歲 (B) 9 歲 (C) 11 歲 (D) 15 歲

- 28 兒童及青少年憂鬱性疾患與那些神經化學物質異常有關？①正腎上腺素（norepinephrine）②血清素（serotonin）③乙醯膽鹼（acetylcholine）④多巴胺（dopamine）  
(A)①③④ (B)②③④ (C)①②③ (D)①②④
- 29 思覺失調症（原稱精神分裂症）患者海馬迴（hippocampus）的體積往往比非思覺失調患者小。下列何者不是導致此結構過小的可能因素？  
(A)下視丘－腦垂腺－腎上腺軸（hypothalamic-pituitary-adrenal axis, HPA）受損  
(B)思覺失調症（原稱精神分裂症）患者的壓力比一般人多  
(C)思覺失調症（原稱精神分裂症）患者對壓力有過度的反應  
(D)遺傳
- 30 根據北美前趨期縱貫式研究（North American Prodrome Longitudinal Study, NAPLS）的結果，下列何者是預測日後罹患精神病患的因素（Psychotic disorders）？①語文能力差 ②社交功能缺損 ③正性症狀較嚴重 ④血親中有人罹患思覺失調症（原稱精神分裂症） ⑤動作技巧差  
(A)①②③ (B)②③⑤ (C)①④⑤ (D)②③④
- 31 對思覺失調症（原稱精神分裂症）患者進行認知提升治療（Cognitive enhancement therapy）最主要的目標為何？  
(A)教導患者賦予其妄想信念新的或更健康的意義  
(B)挑戰與動機貧乏（avolition）有關的信念  
(C)減少妄想發生的頻率  
(D)試圖將各種基本的認知歷程（例如，注意力與記憶力）正常化（normalize）
- 32 部分思覺失調症（原稱精神分裂症）患者有攻擊或暴力傾向，但此傾向與下列何者最無關聯？  
(A)患者性別 (B)服藥順從性差 (C)過度物質使用 (D)住院期間較長
- 33 有關思覺失調症（原稱精神分裂症）與自閉症的鑑別診斷，除了妄想與幻覺症狀之外，還須確認下列何者？  
(A)是否有刻板化的行為 (B)異常行為的初發年齡  
(C)是否有口語與溝通的障礙 (D)是否有智能不足的現象
- 34 「缺少正常行為」是指思覺失調症（原稱精神分裂症）的：  
(A)正性症狀 (B)負性症狀 (C)良性症狀 (D)惡性症狀
- 35 針對家庭高情緒表達的思覺失調症（原稱精神分裂症）患者，其家庭治療通常著重下列何者？  
(A)支持家屬及減輕家屬的罪惡感 (B)經由家屬協助病患獨立生活  
(C)改變病患的家庭結構 (D)有計畫地教導家屬表達情緒及解決衝突的方法
- 36 有關第二型雙極性疾患（Bipolar II Disorder）的臨床病程特徵之敘述，下列何者正確？  
(A)病程中至少有一次輕躁狂發作（Hypomanic Episode），且有一次或多次混合發作（Mixed Episode）  
(B)病程中至少有一次輕躁狂發作（Hypomanic Episode），且有一次或多次重鬱發作（Major Depressive Episode）  
(C)病程中至少有一次輕躁狂發作（Hypomanic Episode），並有多次時期出現憂鬱症狀，但不符合重鬱發作（Major Depressive Episode）準則  
(D)有此診斷之患者，可以同時診斷為分裂情感性疾患（Schizoaffective Disorder）
- 37 有關第一型雙極性疾患（Bipolar I Disorder）的性別研究發現，下列何者錯誤？  
(A)罹患此病的女性與男性比率相當  
(B)在第一次發作上，男性較為重鬱發作（Major Depressive Episode），而女性則較為躁狂發作（Manic Episode）  
(C)男性躁狂發作（Manic Episode）的次數相等或多於重鬱發作（Major Depressive Episode）的次數，女性重鬱發作多於躁狂發作的次數  
(D)女性比男性更多出現快速週期（Rapid-Cycling）
- 38 家庭焦點治療（Family-focused treatment；FFT）是防止雙極症患者再發病的重要治療。下列何者可以說明家庭焦點治療的內涵？①教導患者自我肯定技巧 ②教育家人有關雙極性疾患的知識 ③增進家庭成員的溝通 ④發展問題解決技巧  
(A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④
- 39 有關妄想性疾患（delusional disorder）的敘述，下列何者錯誤？  
(A)患者的症狀不可符合思覺失調症（原稱精神分裂症）活躍期準則中的特徵性症狀  
(B)患者可出現相對於此疾患總時期而言甚為短暫的情感性發作  
(C)患者可出現與妄想主題相關聯的觸幻覺或嗅幻覺  
(D)此疾患不可與妄想性人格疾患（paranoid personality disorder）同時做診斷
- 40 根據 DSM-5，短期精神病性疾患（Brief Psychotic Disorder）的病程時間是：  
(A)2 個月 (B)1 天至 1 個月 (C)3 個月 (D)2 個星期至 2 個月