

109年第二次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段考試、營養師、心理師、護理師、社會工作師考試、109年專門職業及技術人員高等考試法醫師、語言治療師、聽力師、牙體技術師考試、高等暨普通考試驗光人員考試試題

代號：3102
頁次：11-1

等 別：高等考試

類 科：中醫師（二）

科 目：中醫臨床醫學（三）（包括中醫外科學、中醫傷科學、中醫五官科學）

考試時間：1小時30分

座號：_____

※注意：（一）本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

（二）本科目共80題，每題1.25分，須用2B鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。


（三）禁止使用電子計算器。

- 1 根據《中醫外科講義》的用藥之法，下列藥物何者可同時用於舒筋祛風以及通乳導散？
(A)桑寄生 (B)赤芍藥 (C)蒲公英 (D)絲瓜絡
- 2 根據《中醫外科講義》辨經理論，瘡瘍生於體表那一條經絡範圍，痊癒較慢？
(A)足少陽膽經 (B)足陽明胃經
(C)手厥陰心包絡經 (D)足太陽膀胱經
- 3 有關「上中下發背」之敘述，下列何者錯誤？
(A)均生於背部中間脊椎骨上，俱屬督脈
(B)皆因火毒而生
(C)初起治法，不論虛實，即宜當瘡點破，隨用托法為之
(D)此三證，無論老少，以高腫紅活焮痛為順，漫腫焦枯塌陷為逆
- 4 下列敘述何者正確？
(A)疔疽銳毒生於耳後高骨之後，較諸瘡疼痛倍增
(B)腦後發生於風池穴
(C)百脈疽生於肺經太淵穴，潰深則大洩肺氣，最為險候
(D)蠱疽生於缺盆穴，若潰後經年不愈者，必成穿心冷癰難治
- 5 有關下肢癰的敘述，下列何者正確？
(A)肚門癰主要長於小腿肚 (B)箕門癰主要生於小腿脛骨前
(C)腓脛發主要長於大腿股內近膝 (D)委中毒主要生於臑窩之委中穴
- 6 有關顏面疔的敘述，下列何者錯誤？
(A)鎖口疔生於嘴角，係肝腎二經所屬
(B)承漿疔生於下唇之唇稜下陷中，係任脈所經之處
(C)人中疔又稱龍泉疔，生於上唇溝中，人中穴，乃督脈經行之地
(D)虎鬚疔，生於人中兩旁，係陽明經行之處
- 7 有關疔之外治，下列敘述何者錯誤？
(A)紅絲疔宜砭其絲頭以止其遊 (B)初起瘡頭可用紫金錠合如意金黃散用蜜水調敷
(C)頭面之疔宜用刀針 (D)手指患者可刺其患指之末節，以止其竄

- 8 依《中醫外科講義》，有關白駁風的敘述，下列何者錯誤？
(A)自面頸項，肉色忽然變白，狀類斑點，並不癢痛
(B)初服浮萍丸，次服蒼耳膏
(C)施治宜早，若因循日久，甚者延及遍身
(D)由濕邪相搏於皮膚，致令氣血失和
- 9 赤白遊風發於肌膚，遊走無定，多因下列何臟腑燥熱，兼表虛風邪襲入，與熱相搏而成？
(A)肝腎 (B)心肺 (C)心腎 (D)脾肺
- 10 下列何種皮膚病的傳染途徑不屬於接觸性傳染？
(A)禿瘡 (B)疥瘡 (C)痘風瘡 (D)陰虱瘡
- 11 下列何種疾病其症狀為「皮紅光亮，癢如蟲行，毛髮乾焦，成片脫落」？
(A)白屑風 (B)面遊風 (C)白駁風 (D)油風
- 12 面遊風多因平素血燥，過食辛辣厚味，以致下列何經濕熱受風而成？
(A)陽明大腸經 (B)少陽膽經 (C)少陽三焦經 (D)陽明胃經
- 13 有關脫髮鬼剃頭的敘述，下列何者正確？
(A)臨床表現常見頭皮突然出現不痛不癢，皮色不變，成片脫髮
(B)因剃頭感傳，風邪襲入而成
(C)又名肥瘡
(D)又名髮際瘡
- 14 有關白疔的證治敘述，下列何者錯誤？
(A)相當於現代醫學的乾癬 (Psoriasis) (B)本病起因多因風邪客於皮膚，血燥不能榮養所致
(C)形如疹疥，色赤而癢，搔起白皮，日漸蔓延 (D)又名蛇皮癬
- 15 下列皆生於上肢，何者除外？
(A)臈癰 (B)肩風毒 (C)肚門癰 (D)藕包毒
- 16 一位中年男士，主訴日前以刮鬚刀剃鬚鬚時，不慎刮破下巴皮膚，因初起只有稍微刺癢感故不以為意，未料局部皮膚慢慢出現紅疹，熱癢微痛，甚至出現膿胞，滲出黃色分泌物。本病症的臨床診斷，下列何者最適當？
(A)肥瘡 (B)濕瘡 (C)燕窩瘡 (D)漆瘡
- 17 某日，年輕母親抱來一位8個月大男嬰至門診求診，男嬰左右眉端與兩側鼻翼布滿淡黃色油性皮屑，兩頰皮膚泛紅，患兒神情稍顯焦躁，時時以手指搔抓患部。此皮膚病的臨床診斷以下列何者最適當？
(A)桃花癬 (B)胎癬 (C)胎風 (D)黃水瘡
- 18 因胎中受毒，生於小兒頭部，尤以後腦居多。其瘡腫勢雖小，而根則堅硬，潰破後雖出膿水，而堅硬不退，瘡口雖收斂，惟仍復發，本毒未罷，他處又生，甚屬纏綿難斂者，此症診斷為下列何者除外？
(A)貉貓 (B)橫痃 (C)拱頭 (D)蟪拱頭

- 19 有關燒傷創面處理之敘述，下列何者最不適宜？
(A)初期創面清潔後可用萬應膏外搽
(B)中期創面有感染者可用黃連膏外敷
(C)中期創面滲液多者可用銀花甘草液濕敷
(D)後期腐脫生新時可用生肌白玉膏摻生肌散外敷
- 20 患者結喉正中附近單個腫塊，呈半球形，表面光滑，肉色不變，可隨吞嚥動作而上下移動，按之不覺疼痛，略有顫動感。伴有手部震顫，能食善飢，體重減輕，形容消瘦，神疲乏力等現象。此症診斷為下列何病名最適宜？
(A)氣瘰 (B)肉瘰 (C)石瘰 (D)筋瘰
- 21 有關傷筋分類的敘述，下列選項何者錯誤？①挫傷是由於旋轉、牽拉或肌肉猛烈而不協調的收縮影響到關節周圍的軟組織所引起的 ②碾挫傷是推移擠壓與旋轉擠壓之外力作用於肢體所引起的 ③急性傷筋，通常具有明顯的外傷史，疼痛、腫脹、血腫及瘀血斑等特點 ④慢性傷筋，不一定有明顯外傷史，但與七情、六淫、勞累關係密切
(A)②③ (B)僅① (C)③④ (D)僅④
- 22 有關傷筋的併發症敘述，下列選項何者正確？①急性扭傷沿骨關節緣的關節囊、韌帶、肌腱及血腫出現骨化，多見於腕關節、膝關節、髖關節等部位 ②關節內游離體臨床表現為陣發性疼痛或持續性疼痛，且有交鎖症狀或伴有關節腫脹、跛行 ③創傷性關節炎，可因扭力間接作用或傷筋後的氣血循環障礙而造成 ④傷筋後期的併發症有痺證、肌肉萎縮、關節僵直
(A)②④ (B)①③ (C)①④ (D)③④
- 23 有關棘上肌肌腱斷裂，下列敘述何者正確？患者會①聳肩旋轉肩胛骨，然後側彎扭轉身體使上臂外展 ②上臂被動外展幅度大於主動外展幅度 ③可併見垂腕症 ④可見Popeye's lump現象
(A)①④ (B)①② (C)②③ (D)③④
- 24 有關臑窩囊腫，下列敘述何者錯誤？
(A)損傷或勞損是誘發因素 (B)囊腫生長緩慢，初期多無明顯症狀
(C)俗稱主婦膝，又稱賀氏囊腫 (D)治療分擠壓法及手術治療兩種
- 25 有關肱骨外上髁炎之診斷治療，下列何者錯誤？
(A)多因長期勞累，屈腕肌起點反覆受到牽拉刺激，引起部分撕裂和慢性炎症
(B)肘外側疼痛，如提熱水瓶、扭毛巾，甚至掃地等動作均感疼痛乏力，疼痛甚至可向上臂及前臂放散
(C)作抗阻力的腕關節背伸和前臂旋後動作可引起患處的疼痛
(D)術者將患者前臂旋前、伸肘、屈腕動作時，可引起患處疼痛

26 將患者腳掌擦上石膏粉或墨，然後踏印於地面或紙上，根據下圖印跡，主要檢查下肢何處有無異常？



- (A)足頂角 (B)足舟骨 (C)跟腱 (D)足弓

27 依《醫宗金鑑·正骨心法要旨》，有關脛腓骨之敘述，「在前者名成骨，又名胛骨，其形粗；在後者名輔骨，其形細」，其中輔骨的俗名為何？

- (A)足附骨 (B)勞堂骨 (C)大槓骨 (D)竹節骨

28 觸摸內踝後方和跟腱之間的軟組織凹陷處，有數個重要的軟組織構造。其排列順序由前至後：①脛骨後肌肌腱 ②屈趾長肌肌腱 ③脛後動脈和脛神經 ④屈踇長肌肌腱

- (A)①②③④ (B)①③②④ (C)③①②④ (D)③④②①

29 74歲男性患者，主訴106年1月跌倒後無法久走久站，久走後右小腿痠痛，麻痺感已1年，大便秘，腹部仍略脹氣，大便2天1行，服軟便劑，小便頻較困難，懷疑攝護腺腫大，夜尿3~4次，106年12月左大腿外側麻痺感，小便頻，食慾稍增，經常口乾口破，核磁共振影像（MRI）如下圖，下列診斷何者最適當？



- (A)腰椎薦椎化 (B)梨狀肌症候群 (C)腰部扭傷 (D)腰椎退化性關節炎

- 30 男性患者因搬重物後右腰臀痛伴有放射性疼痛至腳，醫師準備給他做理學檢查並給予診斷，下列敘述何者錯誤？
- (A)直腿抬高試驗（SLRT），如為陽性，考慮腰椎間盤突出症（HIVD）、梨狀肌症候群、腰椎退化性關節炎椎間孔狹窄等症
- (B)環跳附近壓痛且SLRT小於60度陽性（+）；大於60度陰性（-），則考慮與梨狀肌症候群有關
- (C)SLRT 30~70度陽性（+）且病患年紀較輕（約小於50歲），則考慮與腰椎間盤突出症有關
- (D)SLRT陽性（+）且病患年紀較大（約大於50歲），則考慮股骨頭缺血性骨壞死有關
- 31 有關痹痛型頸椎病變（Cervical spondylosis），那些頸椎發病率較其餘頸椎關節為高，下列選項何者正確？①C4C5 ②C5C6 ③C6C7 ④C7T1
- (A)①② (B)②③ (C)③④ (D)①④
- 32 立位時，有關小圓肌與大圓肌之敘述，下列何者正確？
- (A)小圓肌終于肱骨大結節，作用是將肩關節外旋
- (B)小圓肌在下方，屬腋神經支配
- (C)大圓肌在上方，屬腋神經支配
- (D)大圓肌終于肱骨小結節，作用是將肩關節外旋
- 33 由高處摔下造成急性腰部韌帶損傷機轉的敘述，下列選項何者正確？①高處摔下，下肢處於伸展或坐位，容易造成下腰部韌帶損傷 ②高處摔下，下肢處於曲屈，容易造成下腰部韌帶損傷 ③兩側股後肌緊張收縮時，容易造成下腰部韌帶損傷 ④兩側股後肌放鬆時，容易造成下腰部韌帶損傷 ⑤骨盆向前旋轉，容易造成下腰部韌帶損傷 ⑥骨盆向後旋轉，容易造成下腰部韌帶損傷
- (A)①④⑥ (B)②③⑤ (C)②④⑤ (D)①③⑥
- 34 關於梨狀肌之敘述，下列何者錯誤？
- (A)梨狀肌起自骶骨前面側部，出坐骨大孔，止於股骨大轉子的後內側面
- (B)髂後上棘至尾骨間做一連線，距離髂後上棘2公分處的連線上做一標點，該點到股骨大轉子的連線，就是梨狀肌的表面投影
- (C)下肢在外旋外展時局部及坐骨神經疼痛加劇，是梨狀肌試驗陽性的體徵
- (D)梨狀肌損傷的可能症狀，患者會自覺患肢稍短，輕度跛行，有時大腿後側及小腿外側有放射性疼痛
- 35 有關腹膜後腔血腫（Retroperitoneal Haematoma），其證治下列選項何者正確？①瘀血熱證，血府逐瘀湯治之 ②毒邪熱證，仙方活命飲治之 ③瘀阻陽明，桃仁承氣湯治之 ④陰虛血熱證，吳茱萸湯治之
- (A)僅①② (B)僅②③ (C)①②③ (D)①③④
- 36 有關踝關節脫位，下列敘述何者錯誤？
- (A)多為間接暴力引起 (B)過度內翻內旋動作可引起
- (C)內脫位時有可能造成外踝下高突起表現 (D)外脫位時有可能造成下脛腓聯合分離

- 37 關於臀中肌無力的鑑別診斷，下列何種試驗最適當？
- (A)Trendelenburg試驗 (B)Ober試驗
(C)Ortolani 卡搭試驗 (D)Telescoping套疊試驗
- 38 關於傷科的內治法，下列敘述何者錯誤？
- (A)以早、中、晚三期辨證，部位辨證為方法 (B)初期治法以「攻」、「消」二法為主
(C)中期治法以「溫」、「清」法為基礎 (D)後期治法則以「補」法為主
- 39 有關膝部傷筋，下列敘述何者錯誤？
- (A)膝關節中醫叫膝髁 (B)膝髁有筋之府之稱
(C)臨床上膝部傷筋以側副韌帶為多見 (D)側副韌帶中以外側副韌帶損傷為最多
- 40 有關傷科損傷分類的敘述，下列何者錯誤？
- (A)損傷的分類：外損包含傷氣，傷骨 (B)長期姿勢不良導致手傷屬於慢性勞損
(C)強力負重損傷常常外皮無損，內傷及血 (D)內傷多提及傷血，但其實傷氣也很常見
- 41 依據《醫宗金鑑·正骨心法要旨》有關胸腹痛悶，下列敘述何者正確？
- (A)胸腹喜手摸者，肝火傷胃也 (B)畏手摸者，脾經血滯也
(C)胸脅悶痛，發熱晡熱，肝經血傷也 (D)胸脅悶痛，飲食少思，肝脾氣滯也
- 42 有關損傷後發熱，下列何者正確？
- (A)氣血瘀滯後鬱久會發熱 (B)使用和解少陽可解血虛發熱
(C)瘀血發熱多為實證，體溫常見攝氏40度以上 (D)發熱多在清晨
- 43 在《醫宗金鑑·正骨心法要旨》中記載王好古對於外傷所造成心腹胸中瘀血停積不散的治療方藥，下列敘述何者正確？
- (A)瘀在下部者，宜桃仁承氣湯 (B)瘀在上部者，宜犀角地黃湯
(C)虛人不可下者，宜四君子湯加穿山甲 (D)可加用童便、醋一同煎服
- 44 熊先生不幸從高處墜落，導致多處部位骨折及出血，受傷後食慾減低而體重大減。有關受傷後食慾不振的敘述，下列何者錯誤？
- (A)可能因為受傷過重，敗血歸肝，脾胃氣機阻滯而食慾不振
(B)可能為了加強清熱消腫止痛效果，給予大劑量寒涼藥物導致食慾不振
(C)有可能因為失血過多，出現口咽乾燥、嘈雜似飢、噁心時作等症狀
(D)依《醫宗金鑑·正骨心法要旨》，傷損若胸脅悶痛，飲食少思，是肝脾氣傷，宜用加味歸脾湯

- 45 受傷之後煩躁、自汗、頭暈。依《醫宗金鑑·正骨心法要旨》，可選用那個方藥處理？
(A)獨參湯 (B)柴胡四物湯 (C)當歸補血湯 (D)血府逐瘀湯
- 46 下列何種損傷最可能導致胸部X光肋膈角消失？
(A)心包填塞 (B)張力性氣胸 (C)血胸 (D)胸脅挫傷
- 47 67歲男性患有頸椎退化性疾患，右臂經常麻木疼痛，嚴重時痿軟無力，平時少氣懶言，乏力自汗，面色蒼白，舌淡，脈細弱。治療時當選用下列何種方劑最適宜？
(A)小活絡丹 (B)人參養榮湯 (C)桂枝芍藥知母湯 (D)身痛逐瘀湯
- 48 病人傷損，依《醫宗金鑑·正骨心法要旨》大腸秘結因腸胃氣虛者，宜處以下列何方？
(A)六君子湯 (B)補中益氣湯 (C)八珍湯 (D)四君子湯加川芎、當歸
- 49 內傷後期治法以「補法」為主，《和劑局方》中提到可治損傷後期氣血受損，脾失健運，納差泄瀉者，為下列何種臨床常用方劑？
(A)大補陰丸 (B)六味地黃丸 (C)真武湯 (D)參苓白朮散
- 50 有關肱骨外科頸骨折，下列何者錯誤？
(A)外展型骨折上臂在外展位跌倒，骨折近段受棘上肌、棘下肌牽拉，呈輕度外展、外旋移位
(B)無位移骨折，應以L型夾板固定四至五週，避免過早活動，以免產生位移
(C)如兒童骨折有向前20~40度成角，或15度以內的內收成角，或30度以內的外展成角，最終不影響肩關節功能
(D)外展型骨折，夾板維持在內收位，避免骨折發生再移位
- 51 有關肱骨外髁骨折之敘述，下列何者錯誤？
(A)肱骨滑車端骨折塊受前臂伸肌群的牽拉，骨折面易轉向外上方
(B)常常合併血管神經損傷
(C)復位不佳，可引起肘外翻等併發症
(D)屬兒童肘部常見骨折，可呈肱骨小頭骨骺分離骨折
- 52 有關股骨頸骨折之敘述，下列何者錯誤？
(A)頭下骨折屬囊內骨折，易造成缺血性骨壞死之後遺症
(B)轉子間骨折血循良好，預後較股骨頸骨折好
(C)股骨頸骨折時失血量可達1000毫升，可能發生休克
(D)股骨頸基底部骨折屬囊外骨折，由於血液供應充分，容易癒合，預後良好
- 53 骨折固定墊的使用原則，下列何者錯誤？
(A)有輕度矯正殘餘移位之作用，所以可以依賴固定墊來代替手法整復
(B)其形狀原則上應與肢體相符合，以保持壓力平衡
(C)若厚而小，易引起壓迫性潰瘍
(D)薄而大，作用力過小

- 54 跟骨骨折矯正復位時，跟骨結節關節角（Bohler's Angle）的矯正對足踝功能很重要。下圖之跟骨骨折，理想之跟骨結節關節角矯正後約幾度？



- (A)5 (B)10 (C)40 (D)80

- 55 50歲男性，文書工作，偶有小跑步運動，右膝疼痛數月之久，無明顯受傷病史，X光正面向顯示如下圖。下列處置何者最合適？



- (A)安排手術內固定 (B)徒手復位，夾板固定
(C)徒手復位，抱膝固定 (D)照左膝X光做比較

- 56 有關肩關節脫位的敘述，下列何者錯誤？

- (A)具明顯外傷史或過往有習慣性脫位史受外力作用
(B)出現方肩畸形表現
(C)患側屈肘90度，肘尖貼緊胸壁時手掌仍可搭在健側肩部
(D)朱橐在《普濟方》曾載明復位手法

- 57 關於腕舟狀骨骨折的敘述，下列共幾項正確？①常伴隨移位，須及時整復 ②骨折可發生在腰部、近端或結節部，其中以腰部多見 ③陽谿穴部位鼻煙窩腫脹壓痛常見 ④以結節部骨折癒合最差，易發生缺血性骨壞死

- (A)1 (B)2 (C)3 (D)4

58 左腕關節脫位後，畸形姿勢不能改變，呈彈性固定，腕關節後上方脫位的畸形圖，下列何者正確？



59 下列何者有利於骨折癒合之因素？

- (A)感染 (B)斷端形成巨大血腫者
(C)軟組織嵌入骨折端間 (D)鬆質骨部骨折

60 14歲男童，嬉戲追逐時跌倒造成肘部骨折，右手肘腫脹、疼痛，肘部呈靴形畸形，但肘後肱骨內、外上髁和鷹嘴三點關係仍保持正常，初步診斷發生骨折的部位，下列何者正確？

- (A)肱骨髁上 (B)肱骨內上髁 (C)肱骨外髁 (D)尺骨鷹嘴突

61 下列何者為火邪導致眼病的特點？

- (A)善行數變，易於犯上 (B)其性上炎，易於侵目，眼病多見
(C)其性開泄，易傷津液 (D)其性開泄，易於流行

62 有關五輪學說之敘述，下列何者正確？

- (A)臟屬標，輪屬本 (B)為從眼局部進行臟腑辨證的方法
(C)不需結合八綱、氣血津液等辨證 (D)臉弦紅赤濕爛，證屬肺金乘肝木

63 關於癘氣所致眼病的敘述，下列何者錯誤？

- (A)癘氣指來勢急驟，能引起廣泛流行，具有較強傳染性的外來致病因素
(B)癘氣所引起的眼病表現與風火在白睛、黑睛引起的眼症相似
(C)一年四季都可以發生，春天多見
(D)天行赤眼為一種癘氣引發的眼病

64 下列何典籍是記載有割治目瘤的最早文獻？

- (A)《史記》 (B)《漢書》 (C)《晉書》 (D)《淮南子》

65 患者胞瞼頻頻眨動，乾澀灼癢，白睛淡紅，伴有口咽乾燥，舌紅少津，脈細等，其證治之敘述，下列何者正確？

- (A)脾虛氣血不足，目失所養而乾澀灼癢，頻頻眨動，白睛淡紅
(B)當以養陰清熱潤燥為主
(C)可用桑葉、石膏清脾熱
(D)可用木香、豆蔻理氣健脾

66 漏睛瘡之發病部位為何？

- (A)白睛 (B)胞瞼 (C)大眦 (D)小眦

- 67 患者胞瞼皮色正常，可捫到核狀硬結，與皮膚不黏連，按之不痛，下列相關敘述何者錯誤？
- (A)此為土疳，類似西醫學之麥粒腫
(B)此症乃因痰濕阻滯胞瞼脈絡所致
(C)阻滯日久，硬結越大，有礙胞瞼開合，患者會自覺胞瞼有重墜感
(D)此症對白睛不會造成影響
- 68 患者自覺眼睛澀痛，畏光，淚熱眦結，白睛上可見小泡樣顆粒隆起，且周圍赤脈怒張，伴有口渴鼻乾，小便赤，大便秘，舌紅苔黃，脈數有力，其最可能之診斷為何？
- (A)椒瘡 (B)赤脈傳睛 (C)金疳 (D)火疳
- 69 承上題，有關其證治之敘述，下列何者正確？
- (A)證屬肺經燥熱，內治宜瀉肺湯加減
(B)證屬風濕熱邪攻目，內治宜散風除濕活血湯加減
(C)證屬脾胃熱盛，內治宜除風清脾飲加減
(D)證屬心經實火，內治宜瀉心湯合導赤散加減
- 70 有關瞳神縮小之敘述，下列何者正確？
- (A)風輪反為窄窄一周，甚則一周如線 (B)宜用清腎抑陽丸，壯水以制陽
(C)乃因淫慾勞傷精血，虧損脾胃二經所致 (D)其視物甚昏，不覺羞明隱澀
- 71 下述敘述何者為「中樞性眼球震顫」的表現？
- (A)眼球很快地向各方向顫動，可存在數年，常伴頭暈，當眼睛閉合或停止凝視時，頭暈就消失或減輕
(B)重度的眼球震顫，震顫的方向不一，可能為水平、垂直、旋轉或傾斜等，可存在數年或數月
(C)眼球震顫為水平或旋轉性，具有快相和慢相。病變較輕時眼球震顫多向患側，病變嚴重時眼球震顫多向健側
(D)眼球震顫的快相與身體傾倒或偏過定位試驗偏向一定相同
- 72 耳鳴者係肝火上擾，宜清肝泄熱，開鬱通竅，若肝氣鬱結而火熱尚輕者，宜疏肝解鬱通竅，用逍遙散加何藥治之為宜？
- (A)蔓荊子、石菖蒲 (B)木通、元胡 (C)大黃、蘆薈 (D)青黛、黃芩
- 73 有關慢喉瘡之生活護理，下列何者錯誤？
- (A)生活有規律，以防勞累傷陰，導致虛火上炎
(B)避免恣意大聲呼叫，但可長時間發聲
(C)禁食煎炒炙燂
(D)禁忌菸酒刺激

- 74 一患者自述全身發熱、口乾帶苦味，小便短、色黃；耳部疼痛劇烈，甚則痛引腮腦，耳前淋巴結腫大、堵塞耳道，致使聽力減退。經檢查耳道腫塊頂部見黃色膿點，周圍肌膚紅赤，破後有少許膿血流出。舌象色紅，苔黃膩。上述病症屬於耳癰何種證型、適用何方劑？
- (A)風熱邪毒外侵，方用五味消毒飲 (B)肝膽濕熱上蒸，方用銀花解毒湯
(C)血虛生風化燥，方用地黃飲子 (D)風熱邪毒外侵，方用銀翹散加減
- 75 在中醫文獻中，對於鼻疔病因及症狀記載很多。如《醫宗金鑑·外科心法要訣》說「鼻疔生在鼻孔內，鼻竅腫塞、脹痛引腦門，甚則唇腮俱作浮腫等症」，是由何經火毒凝結而成？
- (A)肝 (B)心 (C)脾 (D)肺
- 76 下列敘述何者錯誤？
- (A)不內外因引起之眼疾，均為外障較易判斷
(B)有因飲食不節，傷飽失飢，勞傷過度，也可成眼疾
(C)肉之精為上下胞瞼，血之精為二眦
(D)氣之精為白睛，筋之精為黑睛
- 77 鼻塞時輕時重，或雙側鼻竅交替堵塞，反覆發生，經久不癒，甚至嗅覺失靈者，此為下列何者？
- (A)鼻淵 (B)鼻塞 (C)鼻鼽 (D)鼻槁
- 78 自覺咽中不適，微痛，乾癢，灼熱感，異物感，常有吭喀的動作，因咽癢咳嗽，易受刺激而引起噁心乾嘔，午後及入夜加重，此為下列何者？
- (A)邪毒喉痹 (B)風熱喉痹 (C)風寒喉痹 (D)虛火喉痹
- 79 有關牙癰外治法敘述，下列那些正確？①未成膿者，局部可擦冰硼散，有清熱解毒止痛作用 ②若紅腫波及腮頰、下頷者，可用龍眼白鹽方貼痛處 ③已成膿者可施膿腫切開術。等待腫痛消退後，應徹底治療，必要時拔除患牙，以免再發 ④針刺治療可選合谷、下關、頰車等穴，以疏通經絡，瀉熱消腫止痛
- (A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④
- 80 牙齒之保健有揩齒，叩齒之導引法，下列相關的敘述，何者錯誤？
- (A)早晚用手或牙刷按摩牙槽2~3分鐘，又每天對合叩齒30~50下
(B)夫齒者，摧伏諸穀，號為玉池，揩理灌漱，叩琢引導，務要令諸疾不生也
(C)每旦以一捻鹽內口中，以暖水含，揩齒及叩齒百遍，為之不絕
(D)每夜以冰硼散揩齒及叩齒以使津液榮流，滌除腐氣，令牙齒堅牢，斷槽固密